



جيلينيا® (فينچوليمود):

بطاقة تذكير لمتلقيّة العلاج بشأن الحمل

التبليغ عن الأعراض الجانبية

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال:

<https://sideeffects.health.gov.il>

من الممكن أيضا تبليغ صاحب التسجيل، نوفارتيس إسرائيل م.ض.:

[safetydesk.israel@novartis.com](mailto:safetydesk.israel@novartis.com)

تم تحديد هذا المستند من قبل وزارة الصحة، وقد تم فحص مضمونه والمصادقة عليه في آب 2021

 NOVARTIS

شارع توتسيرت هآرتس 6، ص.ب. 7126، تل أبيب هاتف: 03-9201111، فاكس: 03-9229230

RMP 2021-009-ARB

## قبل بدء العلاج بجيلينيا

قبل تناول جيلينيا، أعلمي طبيبك إذا كنت حاملا أو تخططين للحمل.

من الممكن أن يسبب جيلينيا الضرر للجنين.

في بداية العلاج وبعد ذلك بصورة دائمة، سيبلغك طبيبك بالخطورة والخطوات الواجب اتباعها للحد من هذه الخطورة.

يجب إجراء فحص حمل.

سيبلغك طبيبك عن الحاجة لوسيلة منع حمل ناجعة خلال فترة العلاج ولمدة شهرين بعد وقته. تحدّثي مع طبيبك حول وسائل منع الحمل الأكثر نجاعة والمتاحة لك.

اقرأ دليل متلقي ومقدّم العلاج بواسطة جيلينيا، الذي حصلت عليه من طبيبك.

## خلال فترة تناول جيلينيا

خلال فترة العلاج، يجب على النساء الامتناع عن الحمل.

يجب على متلقيات العلاج استخدام وسائل منع حمل ناجعة خلال فترة العلاج بجيلينيا.

يجب على النساء الامتناع عن الحمل خلال فترة العلاج ولمدة شهرين بعد وقف العلاج.

يجب إعادة إجراء فحص الحمل بفوارق زمنية ملائمة.

سيوفر لك طبيبك استشارة دائمة بشأن مخاطر جيلينيا الشديدة على الجنين.

إذا حملت أو إذا كنت ترغبين بالحمل، تحدّثي عن هذا الأمر مع طبيبك، لأنه سيتوجّب عليك وقف العلاج بجيلينيا.

## خلال فترة تناول جيلينيا

في حال حصول الحمل، سيقدّم لك طبيبك الاستشارة.

سيقدم لك طبيبك الاستشارة بشأن تأثيرات جيلينيا الضارّة على الجنين، وسيقدّم لك تقديرا بشأن النتيجة المتوقّعة.

يجب إجراء فحص أولتراساوند (أمواج فوق صوتية)، ومن الممكن أن يتم وقف العلاج بجيلينيا.

## بعد التوقف عن العلاج بجيلينيا

عليك تبليغ طبيبك فوراً إذا كنت تعتقدين أن إصابتك بمرض التصلب المتعدد قد تفاقمت (مثل ضعف أو تغيير في الرؤية) أو إذا لاحظت أعراضاً جديدة بعد التوقف عن العلاج بجيلينيا في أعقاب الحمل.

هنالك حاجة لاستخدام وسائل منع حمل ناجعة لمدة شهرين بعد التوقف عن العلاج بجيلينيا، لأن هذه الفترة اللازمة لخروج جيلينيا من الجسم.

لمعلومات إضافية، اقرئي نشرة المستهلك قبل استخدام المستحضر.

