

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986

يُسوق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

أومّقُو 100 ملخ

محلول للحقن ضمن قلم جاهز للاستعمال

المادة الفعالة وتركيزها:

يحتوي كل 1 مل على 100 ملخ ميريكيزوماب (mirikizumab).

يحتوي كل قلم جاهز للاستعمال على 100 ملخ ميريكيزوماب (mirikizumab) في 1 مل محلول.

مواد غير فعالة ومثيرة للحساسية في المستحضر: انظر الفصل 2 البند "معلومات مهمة عن قسم من مرکبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

هذا الدواء وصف لعلاج مرضك. لا تعطه للأخرين؛ لأنّه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

1. لم أعد هذا الدواء؟

أومّقُو معد لعلاج البالغين الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي (ulcerative colitis) النشط المتوسط حتى الشديد، والذين لديهم استجابة غير كافية، عدم استجابة، أو لديهم عدم تحمل للعلاج العادي أو العلاج البيولوجي.

المجموعة العلاجية: أدوية كابته لجهاز المناعة، مثبطات إنترلوكين.

يحتوي أومّقُو على المادة الفعالة ميريكيزوماب، ضد وحيد النسيلة. الأضداد وحيدة النسيلة هي بروتينات تتعرف وترتبط بصورة موجّهة لبروتينات مستهدفة معينة في الجسم. يعمل أومّقُو عن طريق الاقتران وحجب بروتين موجود في الجسم يُسمى IL-23 (إنترلوكين-23)، الذي يشارك في الالتهاب. عن طريق حجب نشاط IL-23، يقلل أومّقُو من الالتهاب وكذلك من الأعراض الأخرى المرتبطة بالتهاب القولون التقرحي.

التهاب القولون التقرحي هو مرض التهابي مزمن يصيب القولون. إذا كنت تعاني من التهاب القولون التقرحي، فسوف تلتقي أولاً بأدوية أخرى. إذا لم تستجب إليها بشكل جيد بما فيه الكفاية أو لا يمكنك تحمل هذه الأدوية، فقد يتم إعطاؤك أومّقُو لتقليل علامات وأعراض التهاب القولون التقرحي مثل الإسهال، ألم البطن، نزف شرجي والاحراج للتبرّز.

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية (أرجحة) للمادة الفعالة (ميريكيزوماب) أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (المفصلة في الفصل 6). إذا كنت تعتقد أنك قد تكون لديك حساسية، استشر الطبيب قبل استعمال أومّقُو.
- كانت لديك حالات عدوى نشطة كبيرة (سل نشط).

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

- تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء.

- سيقوم الطبيب بالتحقق من وضعك الصحي قبل أن تلتقي العلاج.

- احرص على إخبار الطبيب عن أي مرض لديك قبل العلاج.

- حالات عدوى**
- قد يسبب أو يمُّض حالت عدوى خطيرة. يُمنع بدء العلاج بـ أو مُمْض إذا كانت لديك عدوى نشطة، حتى تختفي العدوى.
 - بعد بدء العلاج، توجه فوراً إلى الطبيب إذا كانت لديك أية أعراض للعدوى مثل:

<input type="radio"/> ضيق تنفس <input type="radio"/> رشح <input type="radio"/> ألم الحنجرة <input type="radio"/> ألم عند التبول	<input type="radio"/> سخونة <input type="radio"/> قشعريرة <input type="radio"/> آلام في العضلات <input type="radio"/> سعال
--	---

 - كذلك، أخبر الطبيب إذا مكثت مؤخراً بالقرب من شخص قد يكون مريضاً بالسل.
 - سيقوم الطبيب بفحصك وربما يجري لك فحص السل قبل أن تلتقي أو مُمْض.
 - إذا اعتقد الطبيب أنك معرض لخطر الإصابة بسل نشط، فقد يتم إعطاؤك أدوية لعلاجه.

اللَّفَاحَات

سيقوم الطبيب بالفحص مما إذا كنت بحاجة للتلقي أي لفاحات قبل بدء العلاج. أخبر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة إذا كنت قد تلقيت مؤخراً لفاحاً أو من المفترض أن تلتقي لفاحاً. هناك أنواع معينة من اللفاحات (لفاحات حية) يُمنع إعطاؤها أثناء استعمال أو مُمْض.

رِدُودِ فَعْلِ تَحْسِسِيَّة

- قد يسبب أو يمُّض ردود فعل تحسسية شديدة.
- توقف عن استعمال أو مُمْض وتوجه فوراً للتلقي علاج طبي عاجل إذا تطورت لديك أي من الأعراض التالية لرد فعل تحسسي شديد:

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> ضغط دم منخفض
<input type="radio"/> انتفاخ الوجه، الشفتين، الفم، اللسان أو الحنجرة،
صعوبة في التنفس.
<input type="radio"/> الشعور بتقلص في الحنجرة أو ضغط في الصدر | <input type="radio"/> طفح
<input type="radio"/> اغماء
<input type="radio"/> دوار |
|--|--|

فصص دم للكبد

سيقوم الطبيب بإجراء فحوصات الدم قبل وأثناء العلاج بـ أو مُمْض، وذلك من أجل معرفة ما إذا كان كبدك يعمل بشكل سليم. إذا لم تكن فحوصات الدم سليمة، فقد يقوم الطبيب بإيقاف العلاج بـ أو مُمْض وإجراء فحوصات إضافية للكبد، وذلك لتحديد السبب.

الأطفال والراهقون

أو مُمْض ليس معداً للأطفال والراهقين دون عمر 18 سنة، لأنه لم يتم دراسته في هذه الفئة العمرية.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

- إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكمّلات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.
- أخبر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة:
- إذا كنت تتناول، تناولت مؤخراً أو من شأنك أن تتناول أدوية أخرى.
 - إذا كنت قد تلقيت مؤخراً أو من المفترض أن تلتقي لفاحاً. هناك أنواع معينة من اللفاحات (لفاحات حية) التي يُمنع إعطاؤها أثناء تناول أو مُمْض.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً، تعتقدين أنك حامل، أو تخططين للحمل، استشيري الطبيب قبل استعمال هذا الدواء. يُفضل تجنب استعمال أومفوك خلال فترة الحمل. إن تأثيرات أومفوك على النساء الحوامل غير معروفة. إذا كنت امرأة في سن الخصوبة، يُوصى تجنب حصول حمل ويجب عليك استعمال وسائل ناجعة لمنع الحمل أثناء استعمال أومفوك ولمدة 10 أسابيع على الأقل بعد المقدار الدوائي الأخير من أومفوك.

إذا كنت مريضة أو تخططين للإرضاع، توجهي إلى الطبيب قبل استعمال هذا الدواء. سيقرر الطبيب معك فيما إذا كنت ستتوقفين عن الإرضاع أو التوقف/الامتناع عن العلاج بـ أومفوك، مع الأخذ بعين الاعتبار فائدة الإرضاع للرضيع وفائدة العلاج للمرأة.

السيارة واستعمال الماكينات

لا يوجد لـ أومفوك تأثير أو أنه ذو تأثير ضئيل على قدرتك على السيارة أو استعمال الماكينات.

**معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء
يحتوي أومفوك على الصوديوم**

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليمول (mmol) صوديوم (23 ملخ) لكل مقدار دوائي، لذلك فهو عملياً "خالي من الصوديوم".

يحتوي أومفوك على بوليسوربات

يحتوي هذا الدواء على 0.3 ملخ/مل من بوليسوربات 80 في كل قلم جاهز للاستعمال، وهي كمية تعادل 0.6 ملخ في المقدار الدوائي الداعم لعلاج التهاب القولون التقرحي. قد يسبب بوليسوربات ردود فعل تحسسية. تحدث مع الطبيب إذا كانت لديك أي حساسيات معروفة.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال الدواء دائمًا حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً فيما يتعلق بالمقدار الدوائي وبطريقة استعمال الدواء. المقدار الدوائي وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط. سيتم البدء بالعلاج بمستحضر أومفوك بإرشاد وإشراف طبيب ذو خبرة في تشخيص وعلاج التهاب القولون التقرحي.

المقدار الدوائي المُتبع من أومفوك ولأي فترة زمنية يتم إعطاؤه

سيقرر الطبيب مقدار أومفوك الذي ستحتاج تناوله ولأي فترة زمنية. أومفوك هو علاج طويل الأمد. سيقوم الطبيب أو الممرضة بمتابعة حالتك الطبية بشكل منتظم للتحقق من أن العلاج يحقق التأثير المطلوب.

- بداية العلاج: المقدار الدوائي الأول من أومفوك هو 300 ملخ وسيتم إعطاؤه من قبل الطبيب بالتسريب داخل الوريد (بالتنقيط داخل الوريد في الذراع) لمدة 30 دقيقة على الأقل. بعد 4 أسابيع من المقدار الدوائي الأول، سوف تنتهي مقدار دوائي إضافي من أومفوك قدره 300 ملخ ومرة أخرى بعد 4 أسابيع إضافية.

إذا لم تكن لديك استجابة علاجية مرضية بعد هذه التسريبات الثلاث، فقد يفكر الطبيب في الاستمرار بالتسريبات داخل الوريد في الأسابيع 12، 16 و-20.

- العلاج الداعم: بعد 4 أسابيع من التسريب الوريدي الأخير، سيتم إعطاء مقدار دوائي داعم قدره 200 ملخ من أومفوك بالحقن تحت الجلد ("تحت الجلد")، وبعد ذلك كل 4 أسابيع. سيتم إعطاء مقدار دوائي داعم قدره 200 ملخ عن طريق إعطاء حقنتين تحتوي كل واحدة منها على 100 ملخ من أومفوك.

إذا توقفت عن الاستجابة بعد تلقي المقدار الدوائي الداعم من أومفوك، فقد يقرر الطبيب إعطاءك 3 مقدار دوائي من أومفوك عن طريق التسريب داخل الوريد.

سيخبرك الطبيب أو الممرضة متى عليك التبديل إلى الحقن تحت الجلد.

خلال فترة العلاج الداعم، سوف تقرر مع الطبيب أو الممرضة ما إذا كان بإمكانك حقن أومفُو بنفسك بعد التمرين على تقنية الحقن تحت الجلد. من المهم لا تحاول حقن نفسك حتى تلتقي إرشادًا من قبل الطبيب أو الممرضة. سيقدم الطبيب أو الممرضة الإرشاد المطلوب.

قد يعطيك المعالج أيضًا حقنة أومفُو بعد الإرشاد المناسب.

استخدم طريقة تذكرة مثل تدوين الملاحظات في التقويم السنوي أو المفكرة لمساعدتك على تذكر موعد تناول المقدار الدوائي التالي الخاص بك وبذلك تتجنب تفويت أو تلقي مقادير دوائية مضاعفة.

يُمنع تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، مقدارًا دوائياً أعلى

إذا تلقيت أومفُو أكثر مما تحتاج إليه أو تم إعطاء المقدار الدوائي في وقت أبكر مما كان من المفترض أن تلتقاء، أخبر الطبيب بذلك.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت حقن مقدار دوائي من أومفُو، احقن في أسرع وقت ممكن. بعد ذلك، استمر بالمقدار الدوائي كل 4 أسابيع.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا تتوقف عن تناول أومفُو دون التحدث مع الطبيب أولاً. إذا توقفت عن العلاج، فقد تعود أعراض التهاب القولون التقرحي.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تتحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أي أسلمة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء، استشر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

4. الأعراض الجانبية

كمبيع الأدوية، قد يسبب استعمال أومفُو أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تندهن عن قراءة قائمة الأعراض الجانبية من المحتمل ألا تعاني من أي منها.

أعراض جانبية شائعة جداً (قد تؤثر على أكثر من مستعمل 1 من بين 10):

- ردود فعل في منطقة الحقن (مثل احرار في الجلد، ألم)

أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر على مستعمل 1 من بين 10):

- حالات عدوى في الطرق التنفسية العلوية (حالات عدوى في الأنف والحنجرة)
- ألم في المفاصل
- صداع
- طفح

أعراض جانبية غير شائعة (قد تؤثر على مستعمل 1 من بين 100):

- القوباء المنطقية
- ردود فعل تحسسية المرتبطة بالتسريب (مثلاً حكة، شرى/urticaria)

- ارتفاع في مستويات انزيمات الكبد في الدم.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبى غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية
من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استماراة عبر الإنترن特 للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومحال رؤية الأولاد وأو الأطفال، وهكذا تتجنب التسمم. لا تسبّب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على الملصقة والعبوة الخارجية. تاريخ انتهاء الصلاحية يناسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

يجب التخزين في الثلاجة ما بين 2°C-8°C. يُمنع التجميد.
لا تسخن الأقلام في الميكروويف، لا تسكب الماء الساخن عليها ولا تتركها تحت أشعة الشمس المباشرة.
لا تهز القلم الجاهز للاستعمال.

يجب التخزين في العبوة الأصلية للحماية من الضوء.

يمكن تخزين أومقو بدون تبريد لمدة تصل إلى أسبوعين في درجة حرارة لا تزيد عن 30°C. إذا كان هناك شدود عن هذه الشروط، فيجب التخلص من أومقو.

لا تستعمل هذا الدواء إذا لاحظت أن القلم الجاهز للاستعمال معطوب، أو إذا كان الدواء يبدو عكرًا، ذو لونبني بشكل واضح أو يحتوي على جزيئات.

الدواء معد للاستعمال مرة واحدة فقط.

يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو سلة المهملات في البيت. قم باستشارة الطبيب أو الصيدلي بالنسبة إلى كيفية التخلص من الدواء. هذه الوسائل ستساعد في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضًا على:

Sodium chloride; sodium citrate dihydrate; citric acid, anhydrous; polysorbate 80; water for injection.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة

أومقو هو محلول في داخل خرطوشة زجاجية شفافة معيناً ضمن قلم أحادي الاستعمال. محلول رائق حتى ساطع، قد يختلف لونه من عديم اللون إلى الأصفر قليلاً حتىبني قليلاً وهو بدون جزيئات.

تحتوي كل عبوة على قلمين جاهزين للاستعمال.

اسم صاحب التسجيل وعنوانه:

إيلي ليلي إسرائيل م.ض.، شارع هشيزاف 4، ص.ب. 4246، رعنانا 4366411.

اسم المنتج وعنوانه:

إيلي ليلي، إنديانابوليس، إنديانا، الولايات المتحدة.

تم تحريرها في آذار 2025.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

174-95-37706-00

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكر. مع هذا فالدواء معد لكلا الجنسين.

تعليمات الاستعمال

أومفو® 100 ملغ محلول للحقن ضمن قلم جاهز للاستعمال

ميريكيزوماب

قلمان جاهزان للاستعمال: قلم 1 من 100 ملغ وقلم 1 من 100 ملغ



اقرأ هذه التعليمات قبل أن تقوم بحقن أومفو. اتبع جميع التعليمات خطوة بخطوة.

- يتطلب حقنتين من أومفو للحصول المقدار الدوائي الكامل لعلاج التهاب القولون التقرحي.
- يجب حقن قلم أومفو واحد وبعدة مباشرة قلم أومفو الآخر.


ذلك يجب أن تذكر:

- يجب أن يوضح لك أحد أفراد الطاقم الطبي كيفية الاستعداد وكيفية حقن أومفو بواسطة القلم. لا تحقن نفسك أو أي شخص آخر حتى يتم التوضيح لك كيفية حقن أومفو.
- كل قلم من أقلام أومفو معزّل للاستعمال لمرة واحدة فقط. لا تشارك القلم أو تعيد استعماله. قد تنتقل العدوى أو تصاب بها.
- قد يساعدك أحد أفراد الطاقم الطبي في تحديد مكان حقن المقدار الدوائي في جسمك. يمكنك أيضًا قراءة البند "اختر منطقة الحقن" في هذه التعليمات لمساعدتك في اختيار المنطقة الأفضل بالنسبة لك.
- إذا كانت لديك مشاكل في الرؤية أو السمع، لا تستعمل قلم أومفو دون مساعدة المعالج.
- احتفظ بتعليمات الاستعمال وراجعها بتمنع عند الحاجة.

قبل استعمال أقلام أومفُو، اقرأ التعليمات واتبعها خطوة بخطوة بدقة.

أجزاء قلم أومفُو

القسم العلوي



100 ملغ + 100 ملغ = مقدار دوائي واحد كامل

مهم:

- يتطلب حقنتين للحصول على المقدار الدوائي الكامل لعلاج التهاب القولون التقرحي.
- يجب حقن قلم واحد وبعد ذلك حقن قلم آخر.

استعد لحقن أومفُو أخرج الأقلام من الثلاجة

أخرج قلمي أومفُو من داخل الثلاجة.

ابقِ أغطية القاعدة الرمادية حتى تكون جاهزاً للحقن.

اترك الأقلام في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة قبل الحقن.

لا تسخّن الأقلام في الميكروويف، لا تنصب عليها ماء ساخناً ولا تتركها تحت أشعة الشمس المباشرة.

لا تستعمل الأقلام إذا كان الدواء مجمداً.

لا تهرّ.


جمع المعدات**المعدات المطلوبة:**

- 2 منديل كحولي
- 2 كرة قطنية أو قطع من ضمادة شاش.
- 1 حاوية للنفايات الحادة (انظر "التخلص من أقلام أو مفرو")
- تأكد من حصولك على الدواء المناسب. يجب أن يكون الدواء الموجود في الداخل رائعاً. قد يكون عديم اللون إلى أصفر قليلاً حتى بني قليلاً.

افحص الأقلام والدواء

لا تستعمل القلم، ويجب التخلص منه حسب توجيهات أحد أفراد الطاقم الطبي إذا:

- بدا تالفاً
- كان الدواء عكراً، تغير لونه، أو يحتوي على جزيئات
- انقضى تاريخ انتهاء الصلاحية المطبوع على الملصق
- كان الدواء متجمداً


**استعد للحقن
اختر منطقة الحقن**

اغسل يديك بالماء والصابون قبل حقن أو مفرو.

يمكن لأحد أعضاء الطاقم الطبي مساعدتك في اختيار أفضل منطقة للحقن بالنسبة لك.

- يمكنك أنت أو أي شخص آخر حقن الدواء في منطقة البطن.
- لا تحقن في نطاق 5 سم من منطقة السرة.
- يمكنك أنت أو أي شخص آخر حقن الدواء في الجزء الأمامي من الفخذين. يجب أن تكون هذه المنطقة على الأقل 5 سنتيمترات فوق الركبة و- 5 سنتيمترات تحت الفخذ.
- يمكن لشخص آخر أن يقوم بحقنك في الجزء الخلفي من أعلى الذراع.
- لا تحقن في نفس المكان بالضبط في كل مرة. على سبيل المثال، إذا كانت الحقنة الأولى في البطن، فإن الحقنة الثانية - لإكمال المقدار الدوائي الكامل - يمكن أن تكون في مكان آخر في البطن.
- لا تحقن في المناطق التي يكون فيها جلدك حساساً، فيه كدمة، أحمرأً أو صلباً.

نظف منطقة الحقن بواسطة منديل كحولي. دع مكان الحقن حتى يجف قبل أن تحقن الدواء.



حقن أومفون

1

انزع غطاء القلم

تأكد من أن القلم مغلقاترك غطاء القاعدة الرمادي حتى تكون
جاهزاً للحقن.


- قم بلف غطاء القاعدة الرمادي وتخليص منه في سلة المهملات المنزلية.
- لا تبعد غطاء القاعدة الرمادي - فقد يؤدي ذلك إلى نضرر الإبرة.
- لا تلمس الإبرة.

موقع وافتتح القفل

2

- ضع القاعدة الشفافة بشكل مسطح وثابت مقابل الجلد.

أمسك القاعدة على الجلد وقم بتدوير حلقة القفل إلى حالة الفتح.




اضغط وأمسك لمدة تصل إلى 10 ثوانٍ

3

- اضغط وأمسك زر الحقن الأزرق.
سوف تسمع نقرة قوية (بدأ الحقن).

استمر في إمساك القاعدة الشفافة بقوة مقابل الجلد.. سوف تسمع نقرة قوية ثانية خلال حوالي 10 ثوانٍ بعد الأولى (اكتتمل الحقن).



- ستعرف أن عملية الحقن قد اكتملت عندما تتمكن من رؤية المكبس الرمادي.

- انزع القلم من الجلد.
- إذا نزفت في منطقة الحقن، فاضغط بواسطة كرة قطنية أو قطعة شاش.
- لا تفرك منطقة الحقن.



يُطلب حقنتين للحصول على المقدار الدوائي الكامل. يجب حقن قلم واحد وبعد مباشرة القلم الآخر.

التخلص من قلم أو مقو تخلص من الأقلام المستعملة

- وضع القلم المستعمل في حاوية تجميع النفايات الحادة مباشرة بعد الاستعمال. لا ترمي القلم مباشرة في سلة المهملات المنزلية.



- إذا لم يكن لديك حاوية للتخلص من الأدوات الحادة، فيمكنك استعمال حاوية منزلية بحيث تكون:

- مصنوعة من البلاستيك المقاوم
- يمكن إغلاقه بعضاً محكم، مقاوم للثقب، دون امكانية لخروج النفايات الحادة للخارج
- ثابت ويتم وضعه بشكل مستقيم أثناء الاستعمال
- مقاومة للتسربات
- معلم بشكل ملائم بتحذير حول النفايات الخطيرة التي في داخل الحاوية

- عندما تكون حاوية الأدوات الحادة ممتلئة تقريباً، ستحتاج إلى اتباع التعليمات المحلية حول الطريقة الصحيحة للتخلص من حاوية النفايات الحادة. قد تكون هناك قوانين محلية تنص على كيفية التخلص من الإبر والأقلام.
- لا تقم بإعادة تدوير حاوية النفايات الحادة المستعملة.
- لمزيد من المعلومات حول التخلص الصحيح من الحاوية، اتصل بالطاقم الطبي بخصوص الخيارات المتاحة في منطقتك.

الأسئلة الشائعة

س. ماذا أفعل لو تركت الأقلام تسخن لأكثر من 30 دقيقة قبل الحقن؟

ج. يمكنك ترك القلم في درجة حرارة الغرفة حتى 30°C لمدة تصل إلى أسبوعين.

س. ماذا لو رأيت فقاعات الهواء داخل القلم؟

ج. فقاعات الهواء الموجودة داخل القلم هو أمر سليم. لن تضرك أو تؤثر على المقدار الدوائي.

س. ماذا لو كانت هناك قطرة من السائل على طرف الإبرة عندما أقوم ب拔掉 غطاء القاعدة الرمادي؟

ج. لا بأس أن ترى قطرة من السائل على طرف الإبرة. لن تضرك أو تؤثر على المقدار الدوائي.

س. ماذا أفعل لو قمت بفتح قفل القلم وضغطت على زر الحقن الأزرق حتى اكتمال الحقن؟

ج. لا تنزع قاعدة الغطاء الرمادي. لا تستعمل القلم. توجه إلى الطبيب أو الصيدلي للحصول على قلم جديد.

س. هل أحتاج إلى الضغط باستمرار على زر الحقن الأزرق حتى اكتمال الحقن؟

ج. لا تحتاج إلى الضغط باستمرار على زر الحقن للأسف، لكن ذلك قد يساعدك على إبقاء القلم ثابتاً وقوياً مقابل جلدك.

س. ماذا تفعل إذا لم ترجع الإبرة بعد الحقن؟

ج. لا تلمس الإبرة ولا تُعد غطاء القاعدة الرمادي. قم بتخزين القلم في مكان آمن لتجنب وخز القلم عن طريق الخطأ وتوجه إلى الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

س. ماذا أفعل إذا كانت هناك قطرة سائل أو دم على الجلد بعد الحقن؟

ج. هذا شيء طبيعي. اضغط بكرة قطنية أو قطعة شاش على مكان الحقن. لا تفرك منطقة الحقن.

س. ماذا أفعل إذا سمعت أكثر من نقرتين أثناء الحقن - نقرتان قويتان ونقرة ضعيفة. هل حصلت على الحقنة كاملة؟

ج. قد يسمع بعض الأشخاص نقرة خافتة مباشرة قبل النقرة القوية الثانية. هذا هو العمل الاعتيادي للقلم. لا تنزع القلم من الجلد حتى تسمع النقرة القوية الثانية.

س. كيف أعرف أن عملية الحقن قد اكتملت؟

ج. بعد الضغط على زر الحقن الأزرق، ستسمع نقرتين قويتين. النقرة القوية الثانية تعني اكتمال الحقن. سترى أيضًا المكبس الرمادي في القسم العلوي من القاعدة الشفافة.

اقرأ النشرة الكاملة لمستهلك الخاصة بـ أومفو الموجودة داخل هذه اللعبة لمعرفة المزيد عن الدواء الخاص بك.