

### (3) רשימת תיוג עבור הרופא לצורך התחלת הטיפול ברבלימיד\*/תלידומיד סלג'ן/אימנוביד\* בילדה / אשה פוריה

ילדה פוריה = מתחת לגיל 18 אשר החלה לקבל וסת. המידע יימסר להורה/ אפטרופוס

שם התרופה:  רבלימיד

תלידומיד סלג'ן

אימנוביד

שם המטופלת: \_\_\_\_\_ תאריך לידה: \_\_\_\_\_

סמן ✓ או לא ידוע	ייעוץ
	נמסר מידע על הסיכון הטרטוגני האפשרי לעובר.
	נמסר מידע לגבי הצורך בשימוש ב-2 אמצעי מניעה בו זמנית 4 שבועות לפני תחילת הטיפול, במהלך הפסקות בטיפול, במהלך הטיפול כולו ובמשך 4 שבועות לאחר סיום הטיפול; לחליפין: הימנעות מוחלטת ורציפה מיחסי מין.
	נמסר מידע לגבי הצורך לפעול על פי הייעוץ בנושא אמצעי מניעה גם במקרה של היעדר וסת. אושר שהמטופלת מסוגלת לציית להמלצות הנוגעות לאמצעי המניעה
	נמסר מידע לגבי ההשלכות האפשריות של היריון והצורך בהפסקת הטיפול ובייעוץ מיידי במקרה שיש סיכוי להיריון.
	אושר שהמטופלת מסכימה לעבור בדיקות היריון כל 4 שבועות (עד 3 ימים טרם קבלת המרשם).
	נמסר מידע לגבי הסיכונים ואמצעי הזהירות ההכרחיים הקשורים לשימוש בתרופה.
	נמסר מידע לגבי האיסור על שיתוף תרופות.
	נמסר מידע לגבי החזרת התרופה שלא נצרכה לרוקח / משרד הרופא.
	נמסר מידע לגבי האיסור לתרום דם בעת נטילת התרופה ובמשך 4 שבועות לאחר הפסקת נטילת רבלימיד / תלידומיד סלג'ן / אימנוביד.
	<b>המלצה לאמצעי מניעה</b>
	נדרשת המלצה לאמצעי מניעה.
	ניתנה המלצה לאמצעי מניעה.
	הושלם הייעוץ בנושא אמצעי מניעה.
	<b>מניעת היריון</b>
	במשך 4 שבועות לפחות טרם התחלת הטיפול, במהלך הטיפול כולו, ובמשך 4 שבועות לאחר סיום הטיפול, המטופלת תשתמש בו זמנית בשיטת מניעת היריון אחת יעילה במיוחד ושיטה חוסמת יעילה אחת:
	שיטות יעילות במיוחד למניעת היריון:
	התקן תוך רחמי (IUD)
	טיפול הורמונלי [הזרקת הורמונים, שתל הורמונלי, גלולות מונעות ביוץ המכילות פרוגסטרון בלבד, כגון desogestrel, מערכת לשחרור תוך רחמי של לבונורגסטרל (IUS)]
	קשירת החצוצרות
	כריתת צינור הזרע של בן הזוג
	* שיטות יעילות חוסמות
	קונדום
	דיאפרגמה
	כובעון צווארי
	<b>הימנעות (על פי החלטת המטופלת)</b>
	המטופלת התחייבה להתנזר באופן מוחלט ומלא.
	<b>בדיקת היריון</b>
	תוצאה שלילית אחת בבדיקת היריון, 4 שבועות לפני תחילת הטיפול.

לא ניתן להתחיל בטיפול כל עוד המטופלת לא בחרה שיטה אחת יעילה במיוחד למניעת היריון ושיטה יעילה חוסמת אחת ומשתמשת בהן כבר 4 שבועות או התחייבה להימנעות מוחלטת ורציפה מיחסי מין, ובדיקת ההיריון שלילית.

\* רבלימיד / תלידומיד סלג'ן / אימנוביד אינם מתווים לטיפול בילדים ולפיכך, מחייבים באישור 29 ג'