

1. لأى غرض مخصوص هذا الدواء؟

الدواء مخصوص للتخفيف من أعراض الزكام والاحتقان الأنف

المصحوبين بالحمى والألام - للعلاج في الليل.

الفضيلة العلاجية:

باراسيتامول - مسكن للألام وخافض للحرارة.

سيبودو إيدروكواريد - مخفف لاحتقان الأنف.

كلورفينيرامين مالات - مضاد للهيستامين.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال هذا الدواء:

إذا علمت بوجود حساسية لباراسيتامول، ليسوبودو إيدروين

الدواء الأخرى (انظر البند 6) أو لمضاد للهيستامين عدا

كلورفينيرامين.

إذا كنت تعاني من ضغط دم مرتفع جداً (فرط ضغط الدم

الخطير) من فرط ضغط الدم غير الخاضع للسيطرة

بواسطة الأدوية، أو من مرض في القلب أو الأوعية الدموية،

أو كانت لديك سيرة مضطربة من السكتة الدماغية.

إذا كنت تعاني من السكري.

إذا كنت تعاني من ورم القوام (ورم نادر في الغدة فوق

الكلوية، يوثر على ضغط الدم ونظم القلب).

إذا كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية (ثيرويد).

إذا كنت تعاني من ضغط مرتفع داخل العين (جلاوكوما -

زرق).

إذا وجد لديك مرض كولي حاد (فجائي) أو مزمن (طويل

الآمد) أو قصور الكلينين.

إذا كنت تعاني في نفس الوقت علاجاً بادوية إضافية للزكام

والسعال أو مستحضرات أخرى تؤدي على باراسيتامول.

إذا كنت تعاني من ضغط الدم بالدوية من فضيلة حاصرات بيتا

ضغط المرآء.

إذا كنت تعاني في نفس الوقت علاجاً بادوية لعلاج الاكتان

من فضيلة مثبطات الأوكسيداز أحدى الأمين (MAO) أو بالأدوية المبنية للأوكسيداز أحدى الأمين العكوسية

(RIMAS) أو RIMAS (اللاتاط على الأعراض انظر البند 4).

إذا كنت تستعمل أدوية فاتحة أو كابك الشفيفية، أو لدواء لعلاج

الاحتقان والربو (الأدوية المحاكية للودية).

إذا كنت ولذا عمرك دون 12 عاماً.

لا تستعمل الدواء إذا كنت جاماً أو مريضاً.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

تم الإبلاغ عن حالات من ملازمة الاعتلال الدماغي الخلقي

الاعكالي (PRES) ومتلازمة تضيق الأوعية الدموية الماغية

الاعكالي (RCVS) في أغلب استعمال أدوية تؤدي إلى

سيبودو إيدروين. RCVS - PRES مما حالت ناردين

يمكن أن تؤدي بزبودي ميري تزويدي ميري تزويدي ميري تزويدي فوري عن

استعمال أكمول تصينون ليكوجيل للنهار بالدمج مع أكمول

أكمول تصينون ليكوجيل للليل ينبع تناول جرعة دوائية من 8 كبسولات

بالمجموع الكلي خلال 24 ساعة. يجب استبدال جرعة من أكمول

تصينون ليكوجيل للنهار بجرعة من أكمول تصينون ليكوجيل للليل،

و عدم تناولها كاضافة للجرعة الدوائية المصوبي بها على علاج

أكمول تصينون ليكوجيل للليل.

عند استعمال أكمول تصينون ليكوجيل للنهار بالدمج مع أكمول

تصينون ليكوجيل للليل ينبع تناول جرعة دوائية من 8 كبسولات

بالمجموع الكلي خلال 24 ساعة. يجب استبدال جرعة من أكمول

تصينون ليكوجيل للنهار بجرعة من أكمول تصينون ليكوجيل للليل،

و عدم تناولها كاضافة للجرعة الدوائية المصوبي بها على علاج

أكمول تصينون ليكوجيل للليل.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 60 عاماً من العمر

استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء لأنهم قد يكونون حساسين

لبعض تأثيرات هذا النوع.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصي بها.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

كيفية الاستعمال

لا يجوز تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو

إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 5 أيام على الرغم من

استعمال الدواء.

عندما ينبع تناول الدواء قبل النوم.

يجب على المرضى الذين يبلغون أكثر من 3 أيام أو