

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

إليكويكس TM 5 ملغ
أقراص مطلية
أبيكسابان 5 ملغ Apixaban 5 mg

إليكويكس TM 2.5 ملغ
أقراص مطلية
أبيكسابان 2.5 ملغ Apixaban 2.5 mg

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية: انظر البند 2 تحت عنوان "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه.

بالإضافة للنشرة، لمستحضر إليكويكس هناك بطاقة معلومات السلامة لمتلقي العلاج. تحتوي هذه البطاقة على معلومات هامة عن السلامة، عليك معرفتها قبل وأثناء العلاج بـ إليكويكس والعمل بموجبها. تحتوي البطاقة على معلومات مخصصة لمتلقي العلاج وللطاقم الطبي. توفر هذه المعلومات إرشاداً لمتلقي العلاج حول كيفية تقليل الخطورة لحدوث نزف ناتج عن العلاج بكل مستحضر من المستحضرات المضادة للتخثر. كذلك، تحتوي البطاقة على بيانات متلقي العلاج الشخصية ومعلومات عن المستحضر إليكويكس. أبرز هذه البطاقة لكل فرد من الطاقم الطبي الذي يشارك في علاجك. يجب مراجعة بطاقة معلومات السلامة لمتلقي العلاج والنشرة للمستهلك قبل بدء استعمال المستحضر. يجب حفظ البطاقة للاطلاع عليها مجدداً عند الحاجة.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

إليكويكس 2.5 ملغ

لمنع حوادث الجلطة الوريدية لدى مرضى كبار بعد عملية جراحية إختيارية لإستبدال مفصل الركبة أو الورك. لمنع السكتة الدماغية والإنصمامات الجهازية لدى مرضى الرجفان الأذيني البالغين (التي منشؤها ليس من صمامات القلب) ولديهم عامل خطورة واحد على الأقل، مثل: سكتة دماغية أو حادث إقفاري عابر سابق، عمر 75 سنة وما فوق، ضغط دم مرتفع، سكري، قصور قلب عرضي. لعلاج الخثرات الدموية في أوردة الرجلين (جلطة في الأوردة الدموية العميقة) والأوعية الدموية في الرئتين (إنصمام رئوي)، ولمنع تكرار حدوث خثرات دموية في هذه الأوعية الدموية.

إليكويكس 5 ملغ

لمنع السكتة الدماغية والإنصمامات الجهازية لدى مرضى الرجفان الأذيني البالغين (التي منشؤها ليس من صمامات القلب) ولديهم عامل خطورة واحد على الأقل، مثل: سكتة دماغية أو حادث إقفاري عابر سابق، عمر 75 سنة وما فوق، ضغط دم مرتفع، سكري، قصور قلب عرضي. لعلاج الخثرات الدموية في أوردة الرجلين (جلطة في الأوردة الدموية العميقة) والأوعية الدموية في الرئتين (إنصمام رئوي).

الفصلية العلاجية:

مضاد للتخثر

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجياً) للمادة الفعالة أو لأي مركب من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في البند 6).
- كنت تعاني من نزيف نشط ملحوظ.
- كنت تعاني من إصابة أو من حالة طبية في عضو في الجسم تزيد خطورة النزيف الشديد (مثل: قرحة نشطة في المعدة أو في الأمعاء أو حدثت مؤخراً، نزيف في الدماغ حدث مؤخراً).
- كنت تعاني من مرض كبد يسهب خطورة زائدة للنزيف (hepatic coagulopathy).
- كنت تتناول أدوية مضادة للتخثر (مثل: وارفارين، ريفاروكسابان، دابيغاتران أو هيبارين)، عدا في حالات تغيير العلاج المضاد للتخثر، عندما يكون هناك قنطار مركب داخل الوريد أو داخل الشريان والذي يحتاج إلى إعطاء هيبارين عن

طريقه لأجل إبقائه مفتوحاً، أو إذا تم إدخال قثطار للأوعية الدموية (بالكي أو بواسطة قثطار) لأجل علاج نبض القلب غير المنتظم (اضطرابات النظم).

تحذيرات خاصة تتعلق باستخدام الدواء

قبل العلاج باليكويس، إحك للطبيب إذا:

- كنت تعاني من خطورة زائدة للنزيف، مثل:
 - اضطرابات النزف، بما في ذلك الحالات التي تسبب نقص نشاط الصفائح الدموية
 - ضغط دم مرتفع جداً، غير مسيطر عليه بواسطة العلاج الطبي
 - كان عمرك فوق 75 عاماً
 - كان وزنك 60 كغم أو أقل.
 - كنت تعاني من مرض كلوي خطير أو كنت تتلقى العلاج بغسل الكلى.
 - كنت تعاني من مشكلة في الكبد أو تاريخ من مشاكل الكبد. يتم إعطاء هذا الدواء بحذر لمتلقي العلاج الذين لديهم علامات لخلل في أداء الكبد.
 - تم إدخال قثطار (كتاتر) لك أو تلقيت حقنة داخل العمود الفقري (لإجراء التخدير أو لتسكين الآلام)، سيوجهك الطبيب لتناول الدواء بعد 5 ساعات أو أكثر من إخراج القثطار.
 - لديك صمام قلب صناعي.
 - قرر الطبيب أن ضغط دمك غير مستقر أو أنه من المخطط علاج آخر أو إجراء جراحي لاستئصال خثرة دموية من الرئتين. يجب اتباع المزيد من الحذر مع الإيكويس
 - إذا كنت تعلم بأنك تعاني من مرض يُسمى متلازمة أضداد الفوسفوليبيد (اضطراب في الجهاز المناعي يزيد خطورة حصول الخثرات الدموية). يجب إبلاغ الطبيب، والذي سيقدر ما إذا كانت هناك حاجة لتغيير العلاج.
- إذا كنت على وشك جراحة أو إجراء قد يسبب نزيفاً، قد يطلب منك الطبيب التوقف مؤقتاً عن تناول الدواء لمدة قصيرة. إذا لم تكن متأكد ما إذا كان إجراء معين قد يسبب النزيف، يجب استشارة الطبيب.

الأطفال والمراهقون

هذا الدواء ليس مخصصاً لعلاج الأطفال والمراهقين دون عمر 18 عاماً.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب، الصيدلي أو للممرضة عن ذلك.

قد تزيد بعض الأدوية من تأثير الإيكويس، وقد يقلل البعض الآخر تأثيراته. سيقدر الطبيب ما إذا كان عليك تلقي العلاج بـ الإيكويس أثناء تناول هذه الأدوية، وبمقدار متابعتك.

- قد تزيد الأدوية التالية من تأثير الإيكويس وأن تزيد من احتمال حدوث نزف غير مرغوب:
 - أدوية معينة التي تستعمل لعلاج تلوث فطري (مثل: كيتوكونازول وما شابه).
 - أدوية معينة التي تستعمل لعلاج متلازمة العوز المناعي المكتسب (HIV/أيدز) (مثل: ريتونافير).
 - أدوية إضافية التي تستعمل لتقليل تشكل الخثرات الدموية (مثل: إينوكساپارين وما شابه).
 - أدوية مضادة للإلتهاب أو مسكنة للألام (مثل: أسبيرين أو ناپروكسين)، خاصة إذا تجاوزت عمر 75 سنة وتتناول أسبيرين فأنت معرض لاحتفال كبير للإصابة بحالات نزيف.
 - أدوية تستعمل لعلاج إرتفاع ضغط الدم أو مشاكل القلب (مثل: ديلتيازم).
 - أدوية مضادة للإكتئاب من فصيلة مثبطات إنقائية لإعادة إمتصاص السيروتونين (SSRI) أو مثبطات لإعادة إمتصاص السيروتونين نورإيبينفرين (SNRI).
- الأدوية التالية قد تقلل من قدرة الإيكويس على المساعدة في منع تشكل الخثرات الدموية:
 - أدوية لمنع الصرع أو الاختلاجات (مثل: فينيتوين وما شابه).
 - العرن المثقوب - St. John's Wort (مكمل نباتي يستعمل لعلاج الاكتئاب).
 - أدوية لعلاج السل أو حالات العدوى الأخرى (مثلاً، ريفامبين).

استعمال الدواء والطعام

يمكن تناول الدواء مع أو بدون طعام.

الحمل والإرضاع

يجب استشارة الطبيب قبل بدء العلاج بأي دواء، إذا كنت حاملاً أو مرضعة، هنالك شك بأنك حامل أو تخططين للحمل.

إن تأثيرات الإيكويس على الحمل أو على الجنين غير معروفة. لا يجوز استعمال الإيكويس إذا كنت في فترة الحمل. إذا أصبحت حاملاً أثناء فترة استعمال الدواء، إتصلي بطبيبك بشكل فوري. إذا كنت في فترة الإرضاع يجب استشارة الطبيب، الصيدلي أو الممرضة قبل استعمال الإيكويس. من غير المعروف فيما إذا كان الإيكويس ينتقل إلى حليب الأم. يوصيك الطاقم الطبي فيما إذا يجب التوقف عن الإرضاع أو التوقف/عدم بدء العلاج بـ إيكويس.

السياقة واستعمال الماكينات

لم يُشاهد أن الإيكويس يمس بقدرتك على السياقة أو استعمال الماكينات.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي القرص على لاكتوز (نوع من السكر). إذا قيل لك من قبل الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، توجه للطبيب لتلقي استشارة قبل تناول هذا الدواء. يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليمول (23 ملغ) من الصوديوم في كل قرص، أي إنه يعتبر "خالياً من الصوديوم".

3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب استعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب دائماً. عليك الاستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

- الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.
- حاول تناول الأقراص في أوقات ثابتة في كل يوم لأجل تحقيق أفضل تأثير للعلاج.
- طريقة التناول: يجب بلع الدواء مع الماء.
- إذا كان من الصعب عليك بلع القرص بشكله الكامل تحدث مع الطبيب حول طرق التناول الإضافية الممكنة لـ إيكويس. بالإمكان سحق القرص وخلطه مع الماء، 5% جلوكوز مع ماء، عصير تفاح أو تفاح مهروس حالاً قبل التناول. تعليمات للسحق:
- إسحق القرص بواسطة مهراس ومدقة.
- أنقل كل المسحوق بحذر إلى داخل وعاء مناسب واخلط مع القليل من السائل حوالي 30 مل (ملعقتين كبيرتين) من الماء أو مع أحد السوائل الأخرى المذكورة أعلاه.
- إبلع الخليط.
- اغسل المهراس والمدقة التي استعنت بهما لسحق القرص مع القليل من الماء أو مع أحد السوائل الأخرى (30 مل) داخل الوعاء الذي احتوى على الخليط وابلع سائل الغسل.

عند الحاجة قد يعطيك الطبيب الإيكويس بواسطة أنبوب أنفي معدي.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

- علاج بغية منع حوادث الجلطة الوريدية لدى مرضى كبار بعد عملية جراحية إختيارية لاستبدال مفصل الركبة أو الورك:
الجرعة الدوائية الموصى بها هي قرص واحد من إيكويس 2.5 ملغ مرتين في اليوم. مثلاً، قرص واحد في الصباح وقرص إضافي في المساء. حاول تناول الدواء في أوقات محددة كل يوم، وذلك من أجل الحصول على التأثير الأمثل للعلاج. يجب البدء بتناول الدواء ما يقارب 12-24 ساعة بعد العملية الجراحية. إذا خضعت لعملية جراحية كبيرة في الورك، بالعادة ستتناول الأقراص لمدة 32 حتى 38 يوماً. إذا خضعت لعملية جراحية كبيرة في الركبة، بالعادة ستتناول الأقراص لمدة 10 حتى 14 يوماً.
- علاج لمنع السكتة والإنصمامات الجهازية لدى مرضى بالغين لديهم رجفان أذيني (الذي منشؤها ليس في صمامات القلب) وعامل خطورة واحد على الأقل، مثل: سكتة دماغية أو حادث إقفاري عابر سابق، عمر 75 سنة وما فوق، ضغط دم مرتفع، سكري، قصور قلبي عرضي:
الجرعة الدوائية الموصى بها هي قرص واحد من إيكويس 5 ملغ مرتين في اليوم. تُخفض الجرعة الدوائية الموصى بها لـ 2.5 ملغ مرتين في اليوم، إذا:
 - كنت تعاني من إنخفاض شديد في الأداء الوظيفي للكلية.
 - تحقق إثنتين من المعايير التالية على الأقل:
 - تشير فحوصات الدم إلى أداء وظيفي كلوي متدني (قيمة كرياتينين في المصل 1.5 ملغ/ديسيلتر (133 ميكرومول/لتر) أو أكثر).

- عمرك 80 سنة أو متقدماً أكثر في السن.
 - وزنك 60 كغ أو أقل من ذلك.
- الجرعة الدوائية الموصى بها هي قرص واحد مرتين في اليوم. مثلاً، قرص واحد في الصباح وقرص إضافي في المساء. يقرر الطبيب الفترة الزمنية لإستمرارك بالعلاج.
- **علاج الخثرات الدموية في أوردة الرجلين والأوعية الدموية في الرئتين:**
الجرعة الدوائية الموصى بها هي قرصان من إيكويس 5 ملغ مرتين في اليوم لمدة 7 أيام الأولى، مثلاً: قرصان في الصباح وقرصان في المساء.
بعد مرور 7 أيام العلاج الأولى، الجرعة الدوائية الموصى بها هي قرص واحد من إيكويس 5 ملغ مرتين في اليوم، مثلاً: قرص واحد في الصباح وقرص إضافي في المساء. حاول تناول الدواء في أوقات محددة كل يوم، من أجل الحصول على التأثير الأمثل للعلاج.
 - **منع تكرار حدوث خثرات دموية بعد إتمام 6 أشهر من العلاج:**
الجرعة الدوائية الموصى بها هي قرص واحد من إيكويس 2.5 ملغ مرتين في اليوم.
مثلاً، قرص واحد في الصباح وقرص إضافي في المساء. حاول تناول الدواء في أوقات محددة كل يوم، من أجل الحصول على التأثير الأمثل للعلاج.
يقرر الطبيب بخصوص الفترة الزمنية لإستمرارك بالعلاج.
- من شأن الطبيب إصدار تعليمات بخصوص التغييرات التالية بالعلاج المضاد للتخثر الذي تتلقاه:
- الانتقال من علاج بـ إيكويس إلى علاج بمستحضرات أخرى مضادة للتخثر:
يجب التوقف عن تناول إيكويس وبدء العلاج بمستحضر آخر مضاد للتخثر (مثل: هيبارين) في وقت الجرعة الدوائية التالية من إيكويس الذي كنت تتناوله.
 - الانتقال من علاج بمستحضر آخر مضاد للتخثر إلى العلاج بـ إيكويس:
يجب التوقف عن العلاج بالمستحضر المضاد للتخثر وبدء العلاج بـ إيكويس في وقت الجرعة الدوائية التالية للمستحضر المضاد للتخثر الذي كنت تتناوله. ولاحقاً، يجب الإستمرار وفقاً للجرعة الدوائية الموصى بها.
 - الانتقال من علاج بمستحضرات مضادة لفيتامين K (مثل: وارفارين) إلى علاج بـ إيكويس:
يجب التوقف عن العلاج بمضادات فيتامين K. يتوجب على الطبيب إجراء فحوصات الدم وإرشادك بخصوص موعد بدء العلاج بـ إيكويس.
 - الانتقال من العلاج بـ إيكويس إلى العلاج بمستحضرات مضادة لفيتامين K (مثل: وارفارين):
إذا أرشدك الطبيب ببدء العلاج بمستحضرات مضادة لفيتامين K (مثل: وارفارين)، يجب مواصلة تناول إيكويس لمدة يومين إضافيين على الأقل بعد تناول الجرعة الدوائية الأولى من مضاد فيتامين K. يتوجب على الطبيب إجراء فحوصات الدم وإرشادك بخصوص موعد إنتهاء العلاج بـ إيكويس.
- متعالجون يخضعون لتقويم نظم القلب**
- عند الحاجة لتقويم دقات قلبك غير المنتظمة للحالة المنتظمة من خلال إجراء طبي يسمى تقويم نظم القلب (cardioversion)، يجب تناول إيكويس حسب الأوقات التي يشير عليك الطبيب بها، لمنع خثرات دم في الأوعية الدموية في الدماغ وفي أوعية دموية أخرى في جسمك.
- إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك، حتى لو لم تتبق أقراص.
- إذا تناولت أكثر من الجرعة الموصى بها، فقد تكون لديك خطورة زائدة لحالات النزيف. إذا حصل نزيف، فقد تكون هناك حاجة لجراحة، تسريب دم عبر الوريد أو علاجات أخرى قد تعكس فاعلية مضاد العامل Xa.
- إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، يجب تناول الجرعة في أسرع وقت ممكن في نفس اليوم والاستمرار في تناول الدواء مرتين في اليوم (ليس أكثر من ذلك). يُمنع مضاعفة الجرعة للتعويض عن الجرعة المنسية.
- إذا لم تكن واثقاً بخصوص كيفية التصرف أو في حال فوت أكثر من جرعة دوائية واحدة عليك إستشارة الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.
- يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.
- لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.
- لا يجوز التوقف عن استعمال هذا الدواء دون استشارة الطبيب أولاً، نظراً لأن التوقف عن العلاج في وقت أبكر من اللازم قد يزيد خطورة تشكل الخثرات الدموية.

لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال الإيكويس قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية، من الجائز ألا تعاني أياً منها. الأعراض الجانبية وشيوعها يمكن أن تختلف من إستطباب وآخر وهي مفصلة لاحقاً بخصوص كل إستطباب. العرض الجانبي الأكثر شيوعاً لـ الإيكويس هو النزف، الذي قد يشكل خطراً على الحياة والذي يتطلب مراجعة فورية للطبيب.

أعراض جانبية مميزة لإعطاء الإيكويس لعلاج منع حوادث الجلطة الوريدية لدى مرضى كبار بعد عملية جراحية إختيارية لاستبدال مفصل الركبة أو الورك:

أعراض جانبية شائعة (من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من بين 10 أشخاص):

- فقر الدم الذي قد يؤدي إلى إرهاق وشحوب.
- نزف الذي يشمل كدمات وإنتفاخ.
- غثيان (الشعور بوعكة).

أعراض جانبية غير شائعة (من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من بين 100 شخص):

- إنخفاض في عدد الصفيحات في الدم (قد يؤثر على التخثر).
- نزف الذي يشمل: نزف إثر عمليات جراحية، بما في ذلك كدمات وإنتفاخ، إفراز دم أو سوائل من الجرح أو من مكان الحقن.
- نزف في المعدة، في المعى أو ظهور دم بلون أحمر/فاتح في البراز، دم في البول، رعاف، نزف من المهبل.
- إنخفاض في ضغط الدم الذي قد يؤدي إلى الشعور بالإغماء أو إلى تسارع النبض.
- تغيرات في فحوصات الدم التي من الجائز أن تظهر: نتائج شاذة لوظائف الكبد، إرتفاع في إنزيمات الكبد، إرتفاع البيليروبين
- نتائج تفكك خلايا دم حمراء الذي يتجلى بإصفرار الجلد والعينين.
- حكة.

أعراض جانبية نادرة (قد تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 شخص):

- رد فعل تحسسي (فرط حساسية) الذي قد يؤدي إلى إنتفاخ في الوجه، في الشفتين، في الفم، في اللسان و/أو في الحنجرة وصعوبات في التنفس. يجب التوجه حالاً للطبيب إذا كنت تقاسي من إحدى هذه الأعراض.
- نزف إلى داخل العضل، نزف في العين، نزف من اللثة وسعال دموي، نزف من فتحة الشرج، تساقط الشعر.

أعراض جانبية شيعها غير معروف (لا يمكن تقييم الشيوع من المعلومات المتوفرة):

- نزف الذي يشمل: نزف دماغي، نزف في العمود الفقري، نزف في الرئتين أو في الحنجرة، نزف في الفم، نزف في تجويف البطن أو نزف داخل الحيز الموجود خلف تجويف البطن، نزف من اليواسير، فحوص التي تبين وجود دم في البراز أو البول.
- طفح جلدي قد يسبب بثور تبدو مثل أهداف صغيرة (بقعة مركزية داكنة محاطة بمساحة أكثر شحوباً، مع حلقة داكنة حول الحواشي) (حمامى متعددة الأشكال erythema multiforme).
- التهاب في الأوعية الدموية (التهاب وعائي) قد يؤدي إلى طفح جلدي أو لبقع حادة، مسطحة، حمراء ومستديرة تحت الجلد أو لكدمات.
- نزيف في الكلية، مع وجود دم في البول أحياناً يؤدي إلى عدم قدرة الكلى على العمل كما يجب (اعتلال كلوي مرتبط بمضادات التخثر).

أعراض جانبية مميزة لإعطاء الإيكويس لعلاج منع السكتة والإنصمامات الجهازية لدى مرضى كبار لديهم رجفان أذيني (منشوها ليس في صمامات القلب) وعامل خطورة واحد إضافي على الأقل:

أعراض جانبية شائعة (من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من بين 10 أشخاص):

- نزف الذي يشمل: نزف في العينين، نزف في المعدة أو في المعى، نزف في فتحة الشرج، دم في البول، رعاف، نزف من اللثة، كدمات وإنتفاخ.
- فقر دم الذي قد يؤدي إلى إرهاق أو شحوب.
- إنخفاض ضغط الدم الذي قد يؤدي إلى الشعور بإغماء أو لتسارع النبض.
- غثيان (الشعور بوعكة).
- فحوص الدم التي من الجائز أن تبين إرتفاع في جاما جلوتاميل ترانسفيراز (GGT).

أعراض جانبية غير شائعة (من شأنها أن تظهر لدى 1 من بين 100 شخص):

- نزف الذي يشمل: نزف في الدماغ، نزف في العمود الفقري، نزف من الفم، سعال دموي، نزف لداخل تجويف البطن، نزف من المهبل، دم فاتح اللون/أحمر في البراز، نزف إثر عمليات جراحية، بما في ذلك كدمات وإنتفاخ، إفراز دم أو سوائل من الجرح أو من مكان الحقن، نزف من البواسير، فحوصات التي تبين دم في البراز أو في البول.
- انخفاض في عدد الصفيحات في الدم (قد يؤثر على التخثر).
- تغيرات في فحوص الدم التي من الجائز أن تبين: شذوذ في نتائج وظائف الكبد، ارتفاع في إنزيمات الكبد، ارتفاع البيليروبين ناتج لتفكك خلايا دم حمراء والذي يتجلى بإصفرار الجلد والعينين.
- طفح جلدي.
- حكة.
- تساقط الشعر.
- رد فعل تحسسي (فرط حساسية) الذي قد يؤدي إلى إنتفاخ في الوجه، في الشفتين، في الفم، في اللسان و/أو في الحنجرة وصعوبات في التنفس. يجب التوجه حالاً للطبيب إذا كنت تقاسي من إحدى هذه الأعراض.

أعراض جانبية نادرة (من شأنها أن تظهر لدى 1 من بين 1,000 شخص):

- نزف في الرئتين أو في الحنجرة، نزف في الفجوة الموجودة خلف تجويف البطن، نزف داخل العضل.

أعراض جانبية نادرة للغاية (من شأنها أن تظهر لدى 1 من بين 10,000 شخص):

- طفح في الجلد قد يسبب بثور تبدو مثل أهداف صغيرة (بقعة مركزية داكنة محاطة بمساحة أكثر شحوباً، مع حلقة داكنة حول الحواشي) (حمامى متعددة الأشكال *erythema multiforme*).

أعراض جانبية شيعوها غير معروف (لا يمكن تقييم الشيع من المعلومات المتوفرة):

- التهاب في الأوعية الدموية (التهاب وعائي) قد يؤدي إلى طفح جلدي أو لبقع حادة، مسطحة، حمراء ومستديرة تحت الجلد أو لكدمات.
- نزيف في الكلية، مع وجود دم في البول أحياناً يؤدي إلى عدم قدرة الكلى على العمل كما يجب (اعتلال كلوي مرتبط بمضادات التخثر).

الأعراض الجانبية التالية هي معروفة إذا كنت تتناول إيكويس لعلاج أو لمنع تكرار حدوث خثرات دموية في أوردة الرجلين أو في الأوعية الدموية في الرئتين:

أعراض جانبية شائعة (من شأنها أن تظهر لدى 1 من بين 10 أشخاص):

- نزف الذي يشمل: رعاف، نزف من اللثة، دم في البول، كدمات وإنتفاخ، نزف في البطن، نزف في المعى ونزف في فتحة الشرج، نزف في الفم، نزف من المهبل.
- فقر دم الذي قد يؤدي إلى إرهاق أو شحوب.
- انخفاض في عدد الصفيحات في الدم (قد يؤثر على التخثر).
- غثيان (الشعور بوعكة).
- طفح جلدي.
- فحوص دم من الجائز أن تبين ارتفاعاً في جاما جلوتاميل ترانسفيراز (GGT) أو ألانين أمينوترانسفيراز (ALT).

أعراض جانبية غير شائعة (من شأنها أن تظهر لدى 1 من بين 100 شخص):

- ضغط دم منخفض الذي قد يؤدي إلى الشعور بإغماء أو لتسارع النبض.
- نزف الذي يشمل: نزف في العينين، نزف في الفم أو سعال دموي، دم بلون أحمر/فاتح في البراز، فحوص التي تبين دم في البراز أو في البول، نزف جراء عمليات جراحية، بما في ذلك كدمات وإنتفاخ، إفراز دم أو سوائل من الجرح أو من مكان الحقن، نزف من البواسير، نزف لداخل العضل.
- حكة.
- تساقط الشعر.
- رد فعل تحسسي (فرط حساسية) الذي قد يؤدي إلى إنتفاخ في الوجه، في الشفتين، في الفم، في اللسان و/أو في الحنجرة وصعوبات في التنفس. يجب التوجه حالاً للطبيب إذا كنت تقاسي من إحدى تلك الأعراض.
- تغيرات في فحوص الدم التي من الجائز أن تبين: شذوذ في وظائف الكبد، ارتفاع في إنزيمات الكبد، ارتفاع في البيليروبين ناتج تفكك خلايا الدم الحمراء الذي يتجلى بإصفرار الجلد والعينين.

أعراض جانبية نادرة (من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 شخص):

- نزف الذي يشمل: نزف في الدماغ أو في العمود الفقري، نزف في الرئتين.
- أعراض جانبية شبيهة غير معروف (لا يمكن تقييم الشبوع من المعلومات المتوفرة):
 - نزف الذي يشمل: نزف لداخل تجويف البطن أو نزف لداخل الحيز الموجود خلف تجويف البطن.
 - طفح في الجلد قد يسبب بثور تبدو مثل أهداف صغيرة (بقعة مركزية داكنة محاطة بمساحة أكثر شحوباً، مع حلقة داكنة حول الحواشي) (حمامى متعددة الأشكال *erythema multiforme*).
 - التهاب في الأوعية الدموية (التهاب وعائي) قد يؤدي إلى طفح جلدي أو لبقع حادة، مسطحة، حمراء ومستديرة تحت الجلد أو لكدمات.
 - نزيف في الكلية، مع وجود دم في البول أحياناً يؤدي إلى عدم قدرة الكلية على العمل كما يجب (اعتلال كلوي مرتبط بمضادات التخثر).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ انقضاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: يجب التخزين دون 30°C.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً:

Tablet core: anhydrous lactose, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, sodium lauryl sulfate, magnesium stearate.

Film coat: hypromellose, lactose monohydrate, titanium dioxide, triacetin, 2.5 mg - iron oxide yellow, 5 mg - iron oxide red.

كل قرص مطلي بعبارة 2.5 ملغ يحتوي على:
51.4 ملغ لاكتوز و 0.08 ملغ صوديوم.
كل قرص مطلي بعبارة 5 ملغ يحتوي على:
102.9 ملغ لاكتوز و 0.16 ملغ صوديوم.

2.5 ملغ - قرص مستدير (قطره 5.95 ملغ) مطلي بفيلم بلون أصفر. كتب على جانب واحد "893"، وعلى الجانب الثاني "21/2".
5 ملغ - قرص بيضوي (قطره 9.73 ملغ * 5.16 ملغ) مطلي بفيلم بلون وردي. كتب على جانب واحد "894"، وعلى الجانب الثاني "5".

صاحب الإمتياز وعنوانه: فايزر لصناعة الأدوية إسرائيل م.ض، شارع شينكار 9، هرتسليا بيتواح 46725.

أرقام تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

إليكوييس 2.5 ملغ: 148.31.33496

إليكوييس 5 ملغ: 149.25.33844

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم تحديثها في 08/2025.