

لے۔

كبسولات لينة

اسم الدواء: لا-
شكله: كبسولات

المادة الفعالة وكميّتها في وحدة جرعة:
كل كبسولة تحتوي:

اقرأ النشرة يا معان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن النساء. إذا كانت لديك استفسارات، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

الصوح، مثلث، الولاء مخصوص للبالغين، أيام 18 سنة وما فوق.

دواء؟

الدواء لا-سي مُخصص للبالغين، لعلاج القلق.
الفصيلة العلاجية: مضادات القلق.

واع:

لا يجوز استعمال الدواء:

- اذا كنت مسؤلًا عن اضطراب في وظائف الكبد (شلل كيكي)
 - اذا كنت مسؤلًا (ارجح) الخازن (الملاقي) او لأي واحد من المركبات الاصفافية التي يحتويها الوجع . تظهر المادة المائية في بند 6 والمركبات الاصفافية مفصلة في البند 6
 - اذا اضطراب في الماضي فرط حساسية (رد فعل ارجوج) للواز انسي
 - تحت جيل 18 سنة

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء:

نماذج تفاعلات بين الأدوية:
إذا كنت تأخذ أو إذا أخذت في الآونة الأخيرة أدوية أخرى بما في
إضافات تغذية أخير الطبيب أو الصيدلي بذلك.
حتى الآن لا توجد تفاعلات معروفة بين لاسبي وأدوية أخرى.

الأطفال والراهقين:

الحمل والإرضاع:
في أياث مخبرية، لم يتم ملاحظة تسمم جيني نتيجة استعمال المادة الفعالة في الدواء لاسي، وأنه لم يتم إجراء أياث سريرية (اكلينيكية) لاستعمال خلل الحمل لا يجوز استعمال الدواء لاسي خلال الحمل. استعمال الدواء لاسي خلال الحمل.

3. كيف تستعمل الدواء؟

- يجب داشتاً استعمال وقاية تعليمات طبيب، إلإا إنكاد من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متاكداً.
- يتم تحديد الحرمة وطريقة العرض على قبل الطبيب فقط.
- الحرمة المقيدة بشكل عام لدى البالغين (بانأة 18 سنة وما فوق) هي كيسولة واحدة من لاسيسي مزدوجة واحدة في اليوم.
- يجبل الدواء باكتهيل مع كمية كافية من سائل للشرب (فضل كلس ماء).
- لا يجوز تضخيم الكيسولة، لا يجوز قطعها أو فتح محنتي الكيسولة.
- لا يجوز أخذ الكيسولة بوضعية الاستلقاء.
- لا يجوز تجاوز الحرمة المفوص بها.

١٠٣ - كيفية تخزين الدواء؟

نلب نسب التسمم: هذا الدواء وكل دواء آخر يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أىدي الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التغافل دون أمر صريح من المختبر.

معلومات إضافية:

جellyatin succinylated; glycerol 85%; refined rapeseed oil; sorbitol solution 70%; carmine lacquer (E 120); patent blue V aluminium lacquer (E 131); titanium dioxide (E 171).

حجم العيادة: يُسوق الدواء لاسي بعلب كرتون التي تحتوي على لوبيحة/لوبيات بلاستيك من 1 كبسولة إلية. عدد لوبيات البلاستيك في كل عيادة كرتون قد يتغير وفقاً لحجم العيادة. على

صاحب التسجيل والمُستورد: د. سموبلوف ستاراد وتسويقي. م.ض.، شركة خاصة.
عبوة كرتون يظهر عدد الكبسولات الكلية في كل عبوة. أحياناً لا يتم تسويق جميع العبوات.

ننتج: د. فیلمار شوابی، کارلسروهه، آلمانیا.
.4365007، رعنای 51226094، ص.ب. 2486.

التنقيح في اب 2021 حسب تعليمات وزارة الصحة.
م تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 155-33-34385-00

سيط وتسهيل القراءة، تقت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. بالرغم من ذلك، الدواء
خصص لكلا الجنسين.

لأنه لم يتم فحص مأمونية لاسي خلال الإرضا عن الأدواء خلا
الإرضا.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء:
تحتوي كل كبسولة لينة على 12 ملغ سوربيتول. عليك استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء إذا كنت تعاني من عدم تحمل السكريات.

3. كيف تستعمل الدواء؟

- يجب داشتاً استعمال وقاية تعليمات طبيب، إلإا إنكاد من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متاكداً.
- يتم تحديد الحرمة وطريقة العرض على قبل الطبيب فقط.
- الحرمة المقيدة بشكل عام لدى البالغين (بانأة 18 سنة وما فوق) هي كيسولة واحدة من لاصسي مزدوجة واحدة في اليوم.
- يجبل الدواء باكتهيل مع كمية كافية من سائل للشرب (فضل كلس ماء).
- لا يجوز تضخيم الكيسولة، لا يجوز قطعها أو فتح محنتي الكيسولة.
- لا يجوز أخذ الكيسولة بوضعية الاستلقاء.
- لا يجوز تجاوز الحرمة المفوص بها.