

עלון לצרcn לפי תקנות הרווקחים (תקנירט) התשמ"ג - 1986
התרופה משוקחת על פ' מרשם רפואי בלבד

אולומיאנט 2 מ"ג אולומיאנט 4 מ"ג

טבליות מצופות

מרכיב פעיל – בריסיטיניב (baricitinib)
 כל טבלייה של אולומיאנט 2 מ"ג מכילה 2 מ"ג בריסיטיניב.
 כל טבלייה של אולומיאנט 4 מ"ג מכילה 4 מ"ג בריסיטיניב.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" בפרק 2 ופרק 6 "מידע נוספת".
קריאה בעיון את העalon עד סוף בטרכם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

בנוסף לעalon, לתכשיר אולומיאנט קיימים כרטיסים מיידע בטיחותי למטופל. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב שעiliar לדעת לפני התחלת הטיפול באולומיאנט ובמהלכו, ולפעול על פיו. יש לעין בכרטיסים המידע בטיחותי למטופל ובעalon לצרcn לפניה תחילת השימוש בתכשיר. יש לשמר את הכרטיסים לעlon נוסף במידת הצורך.

1. למה מיועדת התרופה?

דלקת מפרקים שגרונית (Rheumatoid Arthritis)
 אולומיאנט משמשת לטיפול במוגרים הסובלים מדלקת מפרקים שגרונית מתונה עד חמורה, בהם טיפול קודם בתרופה אנטיריאומטית אחת או יותר מקבוצת DMARD לא היה יעיל די או היה בלתי נסבל.

ניתן להשתמש באולומיאנט כתכשיר יחיד או בשילוב עם מטוטרקסאט (methotrexate).
 אולומיאנט פועלת על ידי ההפחתת פעילותו של אנזים המציג בגוף המכונה "ג'אנוס קינאז" (Janus kinase), אשר מעורב בתהליכי דלקת. באמצעות ההפחתת פעילותו של אנזים זה, אולומיאנט מסייעת בההפחתת כאב, נזקשות ונפיחות במפרקים, עייפות, ועוזרת בהאטת הפגעה בעצם ובסחוס במפרקים. השפעות אלו יכולות לעזור לך בבטיחו פעולה יומיומית, תוך שיפור איכות החיים הקשורה לבリアות עבר חול'י דלקת מפרקים שגרונית.

דלקת עור אтопית (Atopic Dermatitis)
 אולומיאנט משמשת לטיפול ילדים מגיל שנתיים ומעלה, במתבגרים ובמבוגרים הסובלים מדלקת עור אטופית מתונה עד חמורה, שאמורים לקבל טיפול מערכתי. דלקת עור אטופית ידועה גם כאזמה אטופית. ניתן להשתמש באולומיאנט בשילוב עם תרופות לטיפול באזמה שאזהה מרווח על העור או להשתמש בה כתכשיר יחיד. אולומיאנט פועלת על ידי ההפחתת פעילותו של אנזים המציג בגוף המכונה "ג'אנוס קינאז" (Janus kinase), אשר מעורב בתהליכי דלקת. באמצעות ההפחתת פעילותו של אנזים זה, אולומיאנט מסייעת בשיפור מצבו של העור ומפחיתה גרד. בנוסף, אולומיאנט מסייעת בשיפור איכות השינה (עקב הגרד) ואי-איכות החים הכללי. אולומיאנט הראה שהיא משפרת תסמינים של כאב עור, חרדה ודיכאון הקשורים בדלקת עור אטופית.

אלופסיה אראטה (קרחת אזוריית Alopecia Areata)
 אולומיאנט משמשת לטיפול במוגרים עם אלופסיה אראטה (קרחת אזוריית) חמורה, מחלה אוטואימונית המאפיינית בנשירת שיער דלקתית ולא צלקות מהركפת, מהפנים ולייטים מאזוריים אחרים בגוף, אשר עלולה להיות חזרתית ומפתחת.

אולומיאנט פועלת על ידי ההפחתת פעילותו של אנזים המצויב בגוף המכונה "ג'אנוס קינאז" (Janus kinase), אשר מעורב בתהיליכים דלקתיים. באמצעות ההפחתת פעילותו של אנזים זה, אולומיאנט מסייע לצמיחה מחודשת של שיער הקרקפת, הפנים, ושל איזוריים אחרים בגוף המשפעים מהמחלה.

דלקת מפרקים ו-ב-מפרקית אידיופטית כרונית של גיל הילדות (Juvenile idiopathic arthritis) אולומיאנט משמש לטיפול בדלקת מפרקים אידיופטית פעילה של גיל הילדות במטופלים בני שנתיים ומעלה שהיתה להם תגובה לא מספקת או אי סבירות לתרופה קודמת אחת או יותר מסווג אnty-ריאומטי Konvenzionalit סינטטי או אnty-ריאומטי Biologics לשינוימחלה [disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs):]

- דלקת מפרקים ו-ב-מפרקית (polyarticular) אידיופטית כרונית של גיל הילדות [דלקת מפרקים עם גורם ריאומטואידי (rheumatoid factor) חיובי [RF+] או שלילי [-RF], מיעוט מפרקים מורחבים (extended oligoarticular)]
 - דלקת מפרקים הקשורה לאנטציטיס -
 - דלקת מפרקים פסוריואטיבית של הילדות.
- ניתן להשתמש באולומיאנט כתוסף יחד או בשילוב עם מתותרקסאט (methotrexate).
- קבוצה רפואיית:** מדכאי חיסון, מדכאי חיסון סלקטיביים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- | |
|--|
| - אתה רגש (אלרגי) לחומר הפעיל (בריסיטיניב) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בפרק 6). |
| - את בהירין או חושבת שאת עשויה להיות בהירין. |

ازהרונות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני ובמהלך הטיפול באולומיאנט ספר לרופא או לרוקח אם:

- אתה בן 65 ומעלה. אנשים בני 65 ומעלה עשויים להימצא בסיכון מוגבר לדיזומות, לב בעיות לב כולל התקף לב ולסוגים מסוימים של סרטן. הרופא ישוחח איתך האם אולומיאנט מתאימה לך.
- אתה סובל מ眩ום או אם אתה מפתח眩ום, תחושת עייפות מוגברת מהרגיל או בעיות שניים מאחר שלאלה עלולים להיות סימני眩ום. אולומיאנט עלולה להפחתת את היכולת של גוף להילחם בדיזומות ועלולה להחמיר眩ום קיימים או להגברת הסיכון לכך שתפתח眩ום חדש. אם יש לך סוכרת או אם אתה מעל גיל 65 אתה עשוי להימצא בסיכון מוגבר לקלב眩ום.
- אתה סובל או סבלת בעבר משחפת. יתכן שתזדקק לבדיקות לשילול שחפת טרם מתן אולומיאנט. דוחות לרופא אם אתה סובל מטאומינים כגון שיעול טורדני,眩ום, העוזות לילה וירידה במשקל במהלך הטיפול באולומיאנט, לאחר שאללה עלולים להיות סימנים לשחפת.
- אתה סבלת מ眩ום בהרפס (שלבקת חוגרת), לאחר שאולומיאנט עלולה לאפשר את הישנות זו. דוחות לרופא אם אתה מפתח פריחה עורית המלווה בכאב ובלפוחיות במהלך הטיפול באולומיאנט, לאחר שאללה להימנע לשבקת חוגרת.
- אתה סובל או סבלת בעבר מהפטיטיס B או C.
- אתה מיועד לקבלת חיסון. עליך להימנע מקבלת תרכיבי חיסון (חיים) מסוימים במהלך השימוש באולומיאנט.
- יש לך או היה לך סרטן, אם אתה מעשן או שעישנת בעבר, לאחר שהרופא ישוחח איתך האם אולומיאנט מתאימה לך.
- אתה סובל מתפקיד כבד לך.
- יש לך או היה לך בעיות לב, לאחר שהרופא ישוחח איתך האם אולומיאנט מתאימה לך.
- הוי לך בעבר קריישי דם בורדי הרגליים (פלקקת ורידים عمוקים, deep vein thrombosis) או בריאות (תסחיף ריאתי, pulmonary embolism), או שיש לך סיכון מוגבר לפתח את זה (לדוגמא: אם עברת לאחרונה ניתוח גדול, אם את נוטלת אמצעי מניעה הורМОנליים/טיפול הורמוני חלופי, או אם יש לך או לאחד מבני משפחתך הקרובה בעיות קריישה). הרופא ישוחח איתך האם אולומיאנט מתאימה לך. ספר לרופא אם יש לך קווץ נשימה פתאומי או קשי נשימה, כאב בחזה או כאב בגב העליון, נפיחות ברגל או בזרען, כאב או ריגשות ברגליים, או אדמדומיות או שינוי בצבע של הרגל או הזרוע, מפני שאלה יכולם להיות סימנים לקרישי דם בורדים.
- אתה סבלת בעבר מדיברטיקוליטיס (מחלת הסעיף, diverticulitis) – סוג של דלקת במעי הגס, או כיבים בקיבה או במעיים (ראה פרק 4).

- סרטן עור שאינו מלנומה נצפה במטופלים שלהם אוולומיאנט. הרופא עשוי להמליץ לך לבצע בדיקות עור שגרתיות בזמן שאתה מטופל באולומיאנט. אם מופיעים נגעים חדשים בעור במהלך הטיפול, או אם נגעים קיימים משתנים את המראה שלהם, פנה אל הרופא.

אם אתה מבחן באחת מתופעות הלואו החמורות הבאות, עליך לדוח מידית לרופא:

- צפוזים בנשימה
- סחרורת חמורה או תחושת סחרור
- נפיחות בשפתים, בלשון או בגרון
- סרפדת (גרד או פריחה בעור)
- כאב בטן עד המלווה במיזח בחום, בחילות והקאות
- כאב חזק או לחץ בחזה (шибולים לתפשט לצרעות, לסת, ל佐ואר ולגב)
- קוצר נשימה
- צעה קרה
- חולשה חד צדדי בזרוע ו/או ברגל
- דיבור מבולבל

ילדים ומתבגרים

במידת האפשר, כדי שילדים ומתבגרים יקבלו את כל החיסונים הנדרשים לפני השימוש באולומיאנט. אין לתת תרופה זו לילדים מתחת לגיל שנתיים.

אין לתת תרופה זו לילדים ומתבגרים עם אלופסיה ארואה מתחת לגיל 18, מפני שאין מידע על השימוש במחלת זו.

בדיקות ומעקב

יתכן שתצטרכך לעור בבדיקות דם בטרם תחיל ליטול אוולומיאנט, או במהלך נטילתה, על מנת לבדוק האם אתה סובל מספיריה נמוכה של תא דם אדומים (אנמייה), מספיריה נמוכה של תא דם לבנים (נויטרופניה או לימפופניה), מרמת שומנים גבוהה בדם (colesterol) או מרמות גבוהות של אנטימי כבד, זאת על מנת לוודא כי הטיפול באולומיאנט אינו גורם לביעו.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לך תרופה אחרת כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

- במיוחד אם אתה לוקח:
- פרובנציד (probenecid) (טיפול בשיגdon), לאחר שתרופה זו עלולה להגביר את הרמות של אוולומיאנט בدمך. אם אתה נוטל פרובנציד, המינון המומלץ של אוולומיאנט למוגרים הוא 2 מ"ג פעם אחת ביום ולילדים ומתבגרים יש להפחית את המינון בחצי. יש להתיעץ עם הרופא לפני השימוש.
 - תרופה נגד דלקת מפרקים שగורנית הנינתה בהזרקה תרופות הניננתה בהזרקה המדכאות את מערכת החיסון, כולל תרופות ביולוגיות ממוקדות (נוגדים).
 - טאקרולימוס (tacrolimus) או ציקלוספורין (cyclosporine) (חומר).
 - תרופות אחרות המשתייכות לקבוצת מעכבי האנדזים ג'אנס קינאז תרופות שיכולות להגביר את הסיכון לדיברטיקוליטיס כמו תרופות נוגדות דלקת שאין סטריאודוליות (NSAIDs), בדרך כלל משמשות לטיפול בכאבים או מצבים דלקתיים של שרירים או המפרקים) ו/או אופיאואידים (משמשים לטיפול בכאב חמוץ) ו/או קורטיקואיסטרואידים (בדרך כלל משמשים לטיפול במצבים דלקתיים) (ראה פרק 4)
 - תרופות לטיפול בסוכרת או אם יש לך סוכרת. הרופא יחליט האם אתה צריך לקחת פחות מהתרופה נגד סוכרת בזמן שאתה לוקח אוולומיאנט.

הירין, הנקה ופוריות

אם את בהירין או שאתה מיניקה, חושבת שאתה עשוי להיות בהירין או מתכוונת להרות, פני לרופא או לרוקח ליעוץ טרם נטילת תרופה זו.

עליך להשתמש באמצעות מנעה ייעיל על מנת למנוע הירין במהלך הטיפול באולומיאנט ובמשך לפחות שבוע אחד לאחר מתן המנה האחורה של אוולומיאנט. עליך לדוח לרופא אם את בהירין מוחר שאין להשתמש באולומיאנט במהלך הנקה מאחר שאתה ידוע האם תרופה זו עוברת לחלב. את הרופא צריכים באולומיאנט במהלך הירין.

אין להשתמש באולומיאנט במהלך הנקה מאחר שאתה ידוע האם תרופה זו עוברת לחלב. את הרופא צריכים להחליט האם תנייק או תשתמש באולומיאנט. אין לעשות את שניהם יחד.

נהיגה ושימוש במכונות

לאולומיאנט אין השפעה על יכולת לנוהג ולהשתמש במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

אולומיאנט מכילה נתרן
תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בטבליה, כלומר למשה היא נחשבת "נטולת נתרן".

3. כיצד תשמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

יש להתחיל את הטיפול בהשגת רופא המנוסה באבחן מצב הרופאי ובטיפול בו. יש תמיד ליטול תרופה זו כדיוק לפיה ההוראות שניתנו לך על ידי הרופא או הרוקח. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

מבוגרים עם דלקת מפרקים שגרונית, דלקת עור אטופית ואלופסיה ארআת (קרחת איזורית)
המינון המקבול הוא 4 מ"ג פעמיים ביום. הרופא עשוי לתת לך מינון נמוך יותר של 2 מ"ג פעמיים ביום, במיוחד אם אתה מעל גיל 65 או אם אתה מצוי בסיכון מוגבר לziehomim, לкриישי דם, לאיירועים לבביים ממשמעותיים או לסרטן.

אם התרופה פועלת היטב, הרופא עשוי להחליט כי ניתן להפחית את המינון.

אם אתה סובל מירידה בתפקוד הכלליות, המינון המקבול של אולומיאנט הוא 2 מ"ג פעמיים ביום.

שימוש בילדים ובמתבגרים

המינון המקבול הוא 4 מ"ג פעמיים ביום עבור מטופלים עד 30 ק"ג. למטופלים במשקל 10 ק"ג עד מתחת ל-30 ק"ג המינון המקבול הוא 2 מ"ג פעמיים ביום.

אם יש לך ירידה בתפקוד הכלליות, יש להפחית את המינון המקבול של אולומיאנט בחצי.

עבור ילדים שאינם מסוגלים לבלוע טבליות שלמות, הטעויות יכולות להתמוסס במים:

- יש להניח טבליה שלמה בתוך מיכל עם 5-10 מ"ל מים בטמפרטורת החדר ווסובב בעדינות על מנת למוסס (לפרק) את הטעייה. עשוות לחוף עד 10 דקות עד שהטבליה מתמוסס לתחריף ורוד בהיר ועכוור. יתכן משקע מסויים.
- לאחר שהטבליה מתמוססת, יש לסובב בעדינות שוב ולאחר מכן לבלוע את התערובת מיד.
- יש לשטוף את המיכל עם 5-10 מ"ל מים בטמפרטורת החדר על ידי ערבות, ולבלוע את התערובת מיד כדי להבטיח מטען מנה מלאה.

יש להשתמש רק במים למיסוס הטעייה.

לאחר מיסוס הטעייה במים ניתן להשתמש בה עד 4 שעות אם נשמרה בטמפרטורת החדר. אם טבליה מתמוססת במים ורק חלק מהמנה הממוששת נלקחת, המטען עד למחזרת כדי לקחת את המנה המתוכננת הבאה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אולומיאנט מיועדת למטען דרך הפה. עליך לבלוע את הטעייה עם מים. אתה יכול ליטול את הטעויות עם או ללא מזון. על מנת לסייע לך ליטול אולומיאנט, רצוי ליטול אותה באוטה השעה מדי יום.

אין לכתחוש או לחזות את טבליות אולומיאנט. הטעויות אין מיועדות לחולקה למנות קטנות יותר. אם תנסה לחזות את הטעייה אתה עלול לא לקבל את כל המנה שרשם לך הרופא. אין מידע על שימוש בתרופה בזונדה.

אם נטלה בטעות מינון גבוהה יותר או אם בטעות בלע ליד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר רפואי של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך. יתכן שתסבול מחלת מתופעות הלואוי המתוארות בפרק 4.

אם שכחת ליטול את התרופה

- אם החמצת מנה, עליך ליטול אותה ברגע שתיזכר.
- אם שכחת את המנה עבור היום כולם, יש לדלג על המנה שהוחמצה וליטול מנה אחת בלבד כרגע למחזרת.

- אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על טבליה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה אין להפסיק את נטילת אולומיאנט, אלא אם כן הרופא מורה לך להפסיק את נטילתה.

אין ליטול תרופות בחושר! בדוק התווית והמנה בכל פעע שהן לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם הנן זיקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספת נספוח כלשהן לגבי השימוש בתרופה זו, פנה לרופא או לרוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באולומיאנט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשייתן תופעות הללו. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

תופעות לוואי חמורות

זהום כגון שלבקת חוגרת ודלקת ריאות, העול להופיע بعد 1 מתוך 10 אנשים:
דוח לרופא או פנה לעזרה רפואי באופן מיידי אם תפתח את התסמינים המפורטים להלן, אשר עלולים להיות סימנים של:
- שלבקת חוגרת (הרופ צויסטר): פריחה עורית עם שלפוחיות המלאוה בכאב וחום (נדיר מאוד בדלקת עור אטופית ולא שכיח באולופסיה אראה)
- דלקת ריאות: שיעול מתמשך, חום, קוצר נשימה ועייפות (לא שכיח בדלקת עור אטופית ואלופסיה אראה)
דלקת ריאות חמורה ושלבקת חוגרת חמורה הן תופעות לוואי שאינן שכיחות.

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות מאוד (עלולות להופיע ביותר מ- 1 מתוך 10 אנשים):
- זרומים בגרון ובאף
- רמת גבואה של שומנים בדם (colsטרול) המודגמות על ידי בדיקת דם

תופעות לוואי שכיחות (עלולות להופיע אצל עד 1 מתוך 10 אנשים):
- פציע קור (הרופ סימפלקס)
- זהום הגורם לקלקל קיבה או לששלול (גוטרואנטרייטיס)
- זהום בדרכי השתן

מספר גבואה של טסיות (תאים המעורבים בקרישת דם), המודגם על ידי בדיקת דם (לא שכיח בדלקת עור אטופית ובאולופסיה אראה)

כאב ראש בחילות (לא שכיח בדלקת עור אטופית)
כאב בטן (לא שכיח באולופסיה אראה)
רמת גבואה של אנטימי כבד, המודגמות על ידי בדיקת דם (לא שכיח בדלקת עור אטופית)

פריחה אקנה (לא שכיח בדלקת מפרקים שגרונית)
עליה ברמת האנזים קרייטין קינאז, המודגמת על ידי בדיקת מפרקים שגרונית
דלקת (נפיחות) של זקיקי השיער במיזוג הקרקפת שבו מתרחשת צמיחה מחודשת של השיער (נצפה באולופסיה אראה)

תופעות לוואי שאין שכיחות (עלולות להופיע עד 1 מתוך 100 אנשים):
- מספר נמוך של תאי דם לבנים (נויטרופילים), המודגם על ידי בדיקת דם
- רמת גבואה של שומנים (טריגליצרידים), המודגמות על ידי בדיקת דם
- רמת גבואה של אנטימי כבד, המודגמות על ידי בדיקת דם (שכיח באולופסיה אראה)
- עליה במשקל נפיחות בפנים

- סרפתת
- קריישי דם בכל הדם של הריאות
- קרייש דם בוורידי הרגליים או האגן, הנקרא פקקת ורידים عمוקים (DVT)
- דיברטיקוליטיס (מחלת הסעיף, diverticulitis) – דלקת כואבת של ציסים קטנים בركמת המעי

ילדים ומתבגרים

- דלקת מפרקים רב-מפרקי אידיאופטית כרונית של גיל הילדות, דלקת מפרקים הקשורה לאנטזיטיס ודלקת מפרקים פסוריינטית של גיל הילדות: במחקר על ילדים מגיל שנתיים ומעלה עם דלקת מפרקים רב-מפרקי אידיאופטית כרונית של גיל הילדות, דלקת מפרקים הקשורה לאנטזיטיס ודלקת מפרקים פסוריינטית של גיל הילדות, כאב ראש היה שכיח מאוד, מספר נמור של תאי דם לבנים וקרישי דם בריאות היו שכיחים (כל אחד היה ב-1 מתוך 82 ילדים).
- אוטופיק דרמטייס בילדים: במחקר על ילדים מגיל שנתיים ומעלה עם אוטופיק דרמייטיס, תופעות הלועאי היו עיקריות עם אלו שנראו בחולים מבוגרים, למעט מספר נמור של תאי דם לבנים (נויטרופילים), שהוא שכיח יותר בהשוואה למוגרים.

אם הופעה תופעת לועאי, אם אחת מתופעות הלועאי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לועאי שלא צינה בעlion, עלייך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לועאי

ניתן לדוח על תופעות לועאי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לועאי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המופיע לדיווח על תופעות לועאי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידים וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנעו הרעלת. אל תגרום להקהה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחריה תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הבלייסטר ועל גבי האזינה החיצונית. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחזרן של אותו חודש.

תנאי אחסון

יש לאחסן מתחת ל-30°C.

אין להשליך תרופה לשפכים או לפסולת הביתה. שאל את הרוקח כיצד יש להיפטר מתרופות שאין משתמש בהן יותר. עצדים אלו יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף**נוסך על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:**

microcrystalline cellulose, mannitol, croscarmellose sodium, magnesium stearate.

למידע נוסף ראה פרק 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

Film coating, color mixture pink 85G140008 (2 mg)/ 85G140009 (4 mg):

- polyvinyl alcohol
- titanium dioxide
- macrogol
- talc
- lecithin
- iron oxide red

כיצד נראה התרופה ומה תוכן הארץזה:

אולומיאנט 2 מ"ג טבליות מצופות הן טבליות מאורכות בצבע ורוד בהיר, 9 x 7.5 מ"מ, עם הכתוב "Lilly" בצד אחד ו-"2" בצד השני.

אולומיאנט 4 מ"ג טבליות מצופות הן טבליות עגולות בצבע ורוד, 8.5 מ"מ, עם הכתוב "Lilly" בצד אחד ו-"4" בצד השני.

הטבליות מעוגלות ובעלות שקעים בצדדים על מנת להקל עליר בעת אחיזתן.

טבליות אולומיאנט 2 מ"ג ו-4 מ"ג זמיןות במגוון (אריזות בלייטר) של 14, 28, 35, 56, 84 ו-98 טבליות
במגוון קלנדריות (מוסמנות לפי ימים).
יתכן שלא כל גודלי האריזות משוקים.

בעל הרישום וכותבו: אליליל ישראלי בע"מ, רח' השיזף 4, ת.ד 4246, רעננה 4366411.

שם הייצן וכותבו: אליליל, אינדיאנפוליס, אינדיאנה, ארה"ב.

נערך באוקטובר 2024.

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

אולומיאנט 2 מ"ג: 00-35738-161-15
אולומיאנט 4 מ"ג: 00-35739-161-16

לשם הפשטות ולהקלת הקירה עלוון זה נוסף בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.