

هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب

اقرأ النشرة بامان حتى النهاية قبل البدء باستعمال الدواء.

تم تحديد هذه النشرة في وزارة الصحة ومحوها فحص وصودق 09/2010

پريدينيزون پريدينيزون ١ ملغ 20 ملغ ٥ ملغ أقراص أقراص أقراص

التركيب:

كل قرص يحتوي على:

Prednisone 20 mg

كل قرص يحتوي على:

Prednisone 5 mg

كل قرص يحتوي على:

Prednisone 1 mg

المواد غير الفعالة: پريدينيزون ١ ملغ: Lactose, Starch, Gelatin, Talc, Powdered Cellulose, Stearic Acid, Sunset Yellow #6.

پريدينيزون ٥ ملغ: Starch, Lactose, Microcrystalline Cellulose, Talc, Ac-di-sol, Magnesium stearate, Aerosil.

پريدينيزون ٢٠ ملغ: Starch, Lactose, Microcrystalline Cellulose, Talc, Ac-di-sol, Magnesium stearate, Color Red FDC No 3 Lake 30%, Aerosil.

الفصيلة العالجية: مضاد للإلتهابات من فصيلة الكورتيكosteroides.

دواعي الإستعمال: مستحضر مضاد للإلتهابات لعلاج الإلتهابات التي تستجيب للكورتيكosteroides كالحساسات الشديدة وإلتهاب المفاصل.

متى لا يجوز لك إستعمال المستحضر؟

لا يجوز لك إستعمال هذا المستحضر إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته. لا يجوز إستعماله إذا كنت مقبل على تلقي أي لقاح. لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا كنت تعاني من تلوث فطري.

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:

إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة. إذا كنت تعاني من أو إذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة: القلب وأو الأوعية الدموية (ضغط الدم العالي)، العينين (كالجلوكوما)، الكبد، الكلية، المسالك البولية، الجهاز الهضمي (القرحة الهضمية)، الغدة الدرقية، عقبولة العين، أمراض العظام (تخلل العظام)، السل أو تلوث آخر في الجسم (كجدرى الماء أو الحصبة)، إصابة جدية، سكري، عدم استقرار عاطفي (ذهان)، الوهن العضلي الوبيـل.

كيف سيؤثر هذا الدواء على سير أمورك اليومية؟

لا يجوز شرب النبيذ أو المشروبات الروحية الأخرى أثناء تناول هذا الدواء.

تحذيرات: لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء في فترات متقاربة أو لفترة طويلة بدون استشارة الطبيب. يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك ل الطعام أو عقاقير، خاصة للأدوينوكورتيكosteroides، قبل إستعمالك للدواء. يجب إبلاغ الطبيب (بما في ذلك طبيب الأسنان) إذا كنت مقدم على إجراء فحوص جلدية أو عملية جراحية، إن الإستعمال المطول لهذا الدواء قد يسبب تباطؤ النمو عند الأطفال والمرأهـين، لذا يجب الحرص على إتباع تعليمات الطبيب بدقة. يحتوى المستحضر على اللكتوز حيث يمكن أن يسبب حساسية لدى أشخاص معينـين. هناك حساسية للتلوثات أثناء الإستعمال، لذلك يجب الإمتناع عن التماس مع أشخاص مرضى (خاصة بجدرى الماء أو الحصبة).

التفاعلات بين الأدوية: إذا كنت تتعاطى دواء إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآمن بدواء آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتقاضي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير، خاصة الأدوية التي تتنتـمـي إلى المجموعات التالية: الأسـپـيرـين والـسـالـيسـيلـاتـ، الأدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي (الأدوية المهدئـة، المنـومةـ، الأدوية پـارـكـينـسـونـ، أدـوـيـةـ الـصـرـعـ، بـرـبـيـتوـرـاتـ، فيـتـيـتوـئـينـ)، رـيفـامـپـينـ، الأـدوـيـةـ المـدـرـةـ لـلـبـولـ، الأـدوـيـةـ

التي تزود البوتاسيوم، أقراص منع الحمل (الحاوية استروجين) أو الأدوية الاستروجينية، مضادات الحموضة، أمفوتيريسين ب، الأدوية المخضضة لنسبة السكر في الدم والتناولة عن طريق الفم أو الإنسولين، چليکوزيدات الديجيتال، ريتودرين، بوپروبيون، قسم من اللقاھات، مضادات تختير الدم، الأدوية التي تحتوي على عنصر الصوديوم، کاتوكونازول، كلريتوريوميتسين، أدوية ضد ضغط الدم العالى.

الأعراض الجانبية: إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة إستعماله بعض الأعراض الجانبية كزيادة الشهية للطعام، إضطرابات في الجهاز الهضمى، عصبية أو عدم الهدوء، أرق، جفاف الفم، غثيان، طفح جلدى، إلتهابات جلدية، إرتباك، تغيرات في المزاج، ضغط دم. يختفي قسم من هذه الأعراض عادة خلال فترة قصيرة بعد أن يعتاد الجسم على الدواء.

الأعراض الجانبية التي تقتضى إهتماماً خاصاً: كتارت، جلاكوما: توقف/اي عن العلاج وتوجه/اي للطبيب. تشوش الرؤية، تكرر التبول، زيادة العطش (نادرًا): استمرار/اي في العلاج وراجع/اي الطبيب في أقرب وقت ممكن. براز أسود أو دموي (نادرًا): راجع/اي الطبيب حالاً. إكتئاب نفسى، نشوة، ضعف العضلات (نادرًا): استمرار/اي في العلاج وراجع/اي الطبيب بالسرعة الممكنة. آلام متواصلة في البطن، الظهر، الأضلاع (نادرًا): استمرار/اي في العلاج وراجع/اي الطبيب بالسرعة الممكنة. مشاكل في الطمث (نادرًا): استمراري في العلاج وراجع/اي الطبيب بالسرعة الممكنة. إنفاس في الوجه أو اليدين، طفح، زيادة في الوزن (نادرًا): راجع/اي الطبيب حالاً. إشارات لحصول تلوث: آلام في الحق، سخونة، عطاس أو سعال: راجع/اي الطبيب في أقرب وقت ممكن. أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

الجرعة الدوائية: يستعمل الدواء حسب تعليمات الطبيب فقط. لا تتجاوز/اي الجرعة الموصى بها. إذا حدث ونسيت تناول الجرعة في الوقت المعين ثم تذكرت بذلك، فيجب تناولها حالاً ولكن لا يجوز تناول جرعتين معاً في أي حال من الأحوال.

إرشادات الإستعمال: يجب تناول هذا الدواء مع الطعام.
لا توجد معلومات بخصوص شطر أو سحق أو مضاعف القرص.
كيف تستطيع/ين أن تساهم/اي في نجاح العلاج؟

لا تتوقف/اي عن إستعمال هذا الدواء بدون تعليمات من الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية. أما إذا صدرت تعليمات من الطبيب بالتوقف عن العلاج، فيجب أن يتم ذلك تدريجياً.

تجنب/اي للتسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. إذا أفرطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلع الطفل/ة خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحبة عبوة الدواء. لا تسبب/اي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب! هذا الدواء وصف لعلاج مرضك، وقد يسبب الضرر لمريض آخر. لا تعط/ اي من الدواء إلى أقاربك، جيرانك أو معارفك. لا تتناول/ اي الدواء في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء. ضع/ اي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: يجب التخزين في مكان مظلم، جاف وفي درجة حرارة دون 25 درجة مئوية. بالنسبة لمستحضر پريدينيزون 1 ملغ أقراص، بعد فتح العبوة للمرة الاولى، يمكن استعماله خلال 2 شهرين فقط اذا لم تنتهي صلاحيته.

تبقى الأدوية صالحة لفترات محددة فقط، حتى ولو ظلت في علبتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ إنتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك! عليك إستشارة الصيدلى الذي صرف لك هذا الدواء. يجب تخزين الدواء في عبوته الأصلية.

لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: 113332217000, 038702245801, 118062604100

المنتج: ريكح للصناعة الدوائية مرض، شارع هميلاخا 30 حولون.