



רופא/ה נכבד/ה
רוקח/ת נכבד/ת

ברצוננו להביא לידיעתכם את העדכון בעלונים של התכשיר **במרץ 2022:**
Abacavir Lamivudine Taro

החומרים הפעילים:
כל טבלייה מצופה מכילה:
אבקויר (abacavir) 600מ"ג
לאמיבודין (lamivudine) 300 מ"ג

התוויה כפי שאושרה בתעודת הרישום:

Indicated in antiretroviral combination therapy for the treatment of Human Immunodeficiency Virus (HIV) infection in adults, adolescents and children weighing at least 25 kg.

בהודעה זו מצוינים רק הסעיפים בהם נעשו שינויים מהותיים בעלון לצרכן. כמו כן, אומץ עלון לרופא עבור התכשיר. תוספות סומנו בצבע **אדום**.

עדכונים בעלון לצרכן
2. לפני השימוש בתרופה

.....

ישנן תרופות המגיבות עם אבקויר לאמיבודין תרו
אלו כוללות:

- ריוסיגואט, לטיפול בלחץ דם גבוה בכלי הדם (עורק ריאתי) הנושאים דם מן הלב אל הריאות. ייתכן שהרופא יצטרך להפחית את המינון של ריוסיגואט, מכיוון שאבקויר עלולה להעלות את הרמות של ריוסיגואט בדם.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
אבקויר לאמיבודין תרו מכילה פחות מ- 23 מ"ג נתרן לטבלייה ועל כן נחשבת למעשה נטולת נתרן.

עדכונים בעלון לרופא

4.5 Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

Drugs by Therapeutic Area	Interaction Geometric mean change (%) (Possible mechanism)	Recommendation concerning co-administration
MISCELLANEOUS		
Riociguat/Abacavir	Riociguat In vitro, abacavir inhibits CYP1A1. Concomitant administration of a single dose of riociguat (0.5 mg) to HIV patients receiving the combination of abacavir/dolutegravir/lamivudine (600mg/50mg/300mg once daily) led to an approximately three-fold higher riociguat AUC(0-∞) when compared to historical riociguat AUC(0-∞) reported in healthy subjects.	Riociguat dose may need to be reduced. Consult the riociguat prescribing information for dosing recommendations.

העלונים המעודכנים נשלחו למשרד הבריאות לצורך פרסומם במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:
www.health.gov.il וניתן לקבלם מודפסים על ידי פנייה לבעל הרישום:
תרו אינטרנשיונל בע"מ, רחוב הקיטור, 14 ת.ד. 10347 מפרץ חיפה 2624761

תרו אינטרנשיונל בע"מ

הקיטור 14,
ת.ד. 10347, מפרץ חיפה 2624761
טל: 04-8475700, פקס: 04-8727165