

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986
يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

چالافولد 123 ملغ، كبسولات صلبة

تحتوي كل كبسولة صلبة على المادة الفعالة: ميجالاستات (migalastat) 123 ملغ (على شكل ميجالاستات هيدروكلوريد 150 ملغ)

قائمة المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية مفصلة في البند 6.

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه لآخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

الدواء مخصص للكبار، ولالمراهقين من جيل 12 سنة والذين لديهم تغيرات (طفرات) وراثية معينة.

1. لأى غرض مخصص الدواء؟

چالافولد 123 ملغ مخصص للعلاج طويل الأمد لدى الكبار والمراهقين من جيل 12 سنة والذين شخص لديهم بشكل مؤكد مرض فابري (خلل في عمل الإنزيم ألفا - چالاكتوزيداز A) وهم ذوي "طفرات مستجيبة".

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (اليرجي) للمادة الفعالة ميجالاستات، أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر البند 6 في النشرة).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

كبسولات 123 ملغ ميجالاستات غير مخصصة للأطفال بجيل 12 سنة فما فوق، الذين يزنون أقل من 45 كغم. قبل العلاج بـ چالافولد 123 ملغ إحك طبيبك إذا كنت تتناول حالياً علاجاً إنزيمياً بديلاً. لا يجوز إستعمال چالافولد 123 ملغ إذا كنت تستعمل بالإضافة لذلك علاجاً إنزيمياً بديلاً.

خلال فترة علاجك بـ چالافولد 123 ملغ سيقوم طبيبك كل 6 أشهر بإجراء مراقبة لحالتك الطبية وفيما إذا كان الدواء يعمل. إذا نفأق وضنك، فمن شأن طبيبك أن يجري تقييم إضافي أو من شأنه أن يوقف علاجك بـ چالافولد 123 ملغ.

تحدث مع طبيبك قبل تناول چالافولد إذا وجد لديك تراجع خطير في الأداء الوظيفي الكلوي، لأنه لا يوصى بإستعمال چالافولد لدى متعالجين لديهم قصور كلوي خطير (GFR أقل من 30 ملل/دقيقة/1.73 ملم²)

الأطفال

أطفال دون جيل 12 سنة (12 <)

لم يتم اختبار هذا الدواء لدى أطفال دون جيل 12 سنة، لذلك سلامة ونجاعة الإستعمال لدى هذه الفئة من الأعمار غير معتمدة.

تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرأً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية، إضافات غذائية، وأدوية نباتية إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. لأن أدوية معينة قد ترفع أو تخفض من كمية الدواء في جسمك.

يجب تبليغ الطبيب بشكل خاص إذا كنت تتناول أدوية أو مكممات غذائية تحتوي على كفائين، حيث أن هذه الأدوية قد تكون ذات تأثير على كفائين، عمل چالافولد إذا تم تناولها خلال فترة الصوم.

عليك أن تعرف الأدوية التي تتناولها. يستحسن أن يكون معك قائمة لتتمكن من عرضها على طبيبك والصيدلي الخاص بك في كل مرة تحصل فيها على دواء جديد.

استعمال الدواء والطعام

يجب تناول الدواء على معدة خاوية.

يمنع استهلاك الطعام أو الكفافين على الأقل ساعتين قبل تناول الدواء وساعتين بعد تناول الدواء.

الحمل، الإرضاع والخصوصية

ال الحمل

هناك تجربة محدودة حول إستعمال هذا الدواء لدى النساء الحوامل. لا يوصى باستعمال چالافولد خلال فترة الحمل. إستشيري طبيبك قبل تناول هذا الدواء وذلك إذا كنت في فترة الحمل، أو تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للحمل. يتوجب على النساء اللواتي بإمكانهن أن يصبحن حوامل إستعمال وسائل منع حمل ناجعة خلال فترة تناول چالافولد.

الإرضاع

لا يجوز إستعمال هذا الدواء خلال فترة الرضاعة من دون إستشارة طبيبك مسبقاً. لا يُعرف حتى الآن فيما إذا كان هذا الدواء ينتقل إلى حليب الأم. سيقرر طبيبك فيما إذا يتوجب عليك التوقف عن الإرضاع أو عليك التوقف عن إستعمال الدواء بشكل مؤقت. من خلال دراسة إيجابيات الإرضاع للرضيع والفائدة من چالافولد بالنسبة للأم.

الخصوصية لدى الرجال

لا يُعرف حتى الآن فيما إذا كان هذا الدواء يضعف من خصوبة الرجل. لم يتم بعد فحص تأثير چالافولد 123 ملغ على خصوبة بني البشر.

الخصوصية لدى النساء

لا يُعرف حتى الآن فيما إذا كان هذا الدواء يضعف من خصوبة المرأة.

إذا كنت تخططين لإنجاب طفل، إستشيري طبيبك، الصيدلي أو الممرضة.

السيادة وإستعمال الماكينات

من غير المحتمل أن يؤثر هذا الدواء على قدرتك على السيادة وإستعمال الماكينات.

3. كيفية إستعمال الدواء؟


يجب الاستعمال دائمًا حسب تعليمات الطبيب.
عليك الاستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:
يجب بلع كبسولة واحدة بال吞嚥 (يوم نعم ويوم لا) وبساعة محددة من اليوم. لا يجوز تناول چالافولد 123 ملغ خلال يومين متتاليين.

يجب تناول الدواء على معدة خاوية.
يمثل استهلاك الطعام أو الكفافين على الأقل ساعتين قبل تناول الدواء وساعتين بعد تناول الدواء. على الأقل 4 ساعات من الصوم حول موعد تناول الدواء، مطلوبة لإتاحة امتصاص الدواء بشكل كامل.
خلال فترة الصوم من 4 ساعات يمكن شرب الماء (من دون إضافات، بطعمات أو محلية)، عصائر فاكهة من دون لب الفاكهة، ومشروبات غازية من دون كفافين.


لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.
قم ببلع الكبسولة بشكلها الكامل. لا يجوز شطر، سحق أو مضغ الكبسولة.

الرسم أ




المرحلة 1: انزع الختم اللاصق الذي يمسك الغطاء. ارفع غطاء علبة چالاولد الخاصة بك (انظر الرسم أ).

الرسم ب - علبة كرتون مفتوحة




المرحلة 2: اضغط ياستمرار على اللسان البنفسجي بواسطة إيهامك في الجزء الأيسر من العلبة (انظر الرسم ب)، وتابع إلى المرحلة 3.

الرسم ج



المرحلة 3: الآن امسك اللسان الموجود في الجانب الأيمن، حيثما توجد كتابة "اسحب إلى الخارج من هنا - pull" واسحب بطاقة الوليحة المطوية نحو الخارج (انظر الرسم ج)

الرسم د - واجهة بطاقة الوليحة




المرحلة 4: افتح بطاقة الوليحة (انظر الرسم د).


تناول كبسولة چالاولد:

بطاقة لوحة واحدة لـ چالاولد = 14 كبسولة صلبة = 28 يوماً علاجياً بواسطة چالاولد، و 14 دائرة كرتونية بيضاء.
الدواير الكرتونية البيضاء مخصصة لتنكيرك بتناول چالاولد **بالتناوب**، يوم نعم و يوم لا.
يوجه السهم المتعالج أين يبدأ الأسبوعين التاليين من العلاج.

الرسم هـ - واجهة بطاقة اللوحة




الرسم وـ - واجهة بطاقة اللوحة



المرحلة ٥: في اليوم الأول لتناول هذا الدواء من بطاقة اللوحة الجديدة، سجل التاريخ على بطاقة اللوحة (انظر الرسم وـ).

الرسم ز - ظهر بطاقة اللوحة



المرحلة 6: أقلب البطاقة إلى الجانب الثاني لإظهار ظهر البطاقة
جد الكبسولة التي يجب إخراجها.

انش البطاقة كما هو مُبيّن (انظر الرسم ز).
ملاحظة: ثني البطاقة يساعد على رفع الشكل البيضوي
للكرتون المثقوب.


الرسم ح - ظهر بطاقة اللوحة



المرحلة 7: انزع الشكل البيضوي للكرتون المثقوب (انظر الرسم ح).

ملاحظة: بعد إزالة الكرتون، من الجائز أن يبقى غلاف أبيض
لرقابة الألومنيوم، هذا الأمر سليم.


الرسم ط - واجهة اللوحة



المرحلة 8: أقلب البطاقة إلى الجانب الثاني لعرض واجهة البطاقة.

ادفع الكبسولة نحو الخارج (انظر الرسم ط).

الرسم ي - واجهة اللوحة



المرحلة 9: في اليوم التالي، انتقل إلى دائرة الكرتون البيضاء المتقوية في السطر العلوى المسماة "يوم 2".

اضغط على دائرة الكرتون البيضاء لزرعها (انظر الرسم ي).

ملاحظة: إزالة هذه الدائرة البيضاء تساعدك على أن تذكر في أي يوم لا ينبغي تناول الدواء.


تناول كبسولة چالاڤولد 1 بالتناوب، يوم نعم و يوم لا.

بعد كل استعمال أغلق و خزن العلبة.

بعد اليوم 2، انتقل إلى اليوم 3 على بطاقة اللوحة.

قم بالتبديل يومياً بين تناول الكبسولة وإخراج الدوائر الكرتونية البيضاء المتقوية لغاية اليوم الـ 28.

الرسم ق - واجهة بطاقة اللوحة المفتوحة



الفحوص والمتابعة

خلال فترة علاجك بـ چالافولد 123 ملغ سيقوم طبيبك كل 6 أشهر بإجراء مراقبة لحالتك الطبية وفيما إذا كان الدواء يعمل. إذا نفأق وضعك، فمن شأن طبيبك أن يجري تقييم إضافي أو من شأنه أن يوقف علاجك بـ چالافولد 123 ملغ.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر فعليك التوقف عن تناول الدواء وإستشارة طبيبك. من الجائز أن تشعر بصداع أو بدوار.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه مباشرة إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، لكن تذكرت ذلك لاحقاً، بالإمكان تناول الدواء فقط خلال 12 ساعة من موعد التناول الإعتيادي.

إذا إنقضت أكثر من 12 ساعة فيجب تناول الدواء في اليوم المخطط التالي في الموعد الإعتيادي الذي يتم فيه تناول الدواء.

لا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف للتعويض عن المقدار الدوائي الذي فاته.
يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا تتوقف عن تناول الدواء قبل أن تناقش طبيبك حول تداعيات قيامك بذلك.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة!

يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال چالافولد 123 ملغ قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًّا منها.

أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض قد تؤثر على أكثر من مستعمل 1 من بين 10)
• صداع

أعراض جانبية شائعة (أعراض قد تؤثر على حتى مستعمل 1 من بين 10)

• تقلصات عضلية	• خفقان قلب بشكل سريع
• ألم في العضلات (myalgia)	• الشعور بدوخة (فيرتيغو)
• تصلب وألم في الرقبة (torticollis)	• إسهال
• الشعور بوخز في الأطراف	• غثيان
• دوار	• ألم في البطن
• تناقص الإحساس للمس أو للإثارة	• إمساك
• إكتئاب	• جفاف الفم
• بروتين في البول	• الحاجة للتبرز بشكل مفاجئ
• ضيق تنفس	• عسر الهضم (dyspepsia)
• رعاف	• إرهاق
• طفح	• إرتفاع نسب كرياتين فوسفوکيناز في فحوص الدم

• حكة متواصلة	• زيادة الوزن
• ألم	

إذا ظهر عرض جانبي إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبلیغ عن اعراض جانبیة

بإمكان التبلیغ عن اعراض جانبیة لوزارة الصحة بواسطه الضغط على الرابط «تبلیغ عن اعراض جانبیة عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبیة أو عن طريق تصفیح الرابط:
<https://sideeffects.health.gov.il/>

يمكنك أيضاً التبلیغ عن اعراض جانبیة لشركة ترومد م.ض. بواسطه هذا التبلیغ، أنت تساعده على جمع معلومات حول سلامه الدواء.

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقى بدون تعليمات صریحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إقضاء تاريخ الصلاحیة (exp. date) الذي يظهر على العلبة. يشير تاريخ الصلاحیة إلى اليوم الأخير من نفس الشهور.
- لا يجوز التخزين بدرجة حرارة تزيد عن 25 درجة مئوية. لا يجوز التخزين في البراد أو التجميد.
- يجب التخزين في العلبة الأصلية لحمايته من الرطوبة.

لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو في القمامه المنزليه، إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً: محتوى الكبسولة:

Pregelatinised starch and magnesium stearate

غلاف الكبسولة:

Gelatin, titanium dioxide and indigotine - FD&C Blue2

الحر:

Shellac, black iron oxide, and potassium hydroxide

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة: كبسولات صلبة، غطاء الكبسولة بلون أزرق فاتح، جسم الكبسولة بلون أبيض فاتح. الكبسولات معلمة بـ "A1001" بحبر أسود، وعبأة ضمن لوحيات (بليستر). تحتوي كل علبة على 14 كبسولة.

- صاحب الإمتياز وعنوانه: ترومد م.ض. إسرائيل شارع بنی چاؤن 10 ، المنطقة الصناعية بولج ص.ب. 4250499 8105، جنوب نتانيا
- إسم المنتج وعنوانه:

Amicus Therapeutics UK Ltd., Buckinghamshire, United Kingdom

- تم إعدادها في آذار 2024 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

- رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 158-80-35012-00 من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

PL-1027 06-03.24