

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلية (مستحضرات) 1986

يُسوق هذا الدواء بدون وصفة طبيب

هيكسيديل دينتال جل

جل للاستعمال في تجريف الفم

المادة الفعالة وتركيزها: كلور هيكسيدين ديجلوكونات 1% w/w

Chlorhexidine Digluconate 1% w/w
قائمة المواد غير الفعالة مفضلة في البند 6 وفي البند 2 تحت العنوان "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

عليك استعمال المستحضر وفقاً للتعليمات المذكورة في البند 3 في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

- لإعاقه تكوّن اللويحة السنية (البلاك).
- للمساعدة في علاج ومنع التهاب اللثة (جينجيفيتيس).
- للمساعدة في الحفاظ على النظافة الصحية للفم.
- للاستعمال بعد الجراحات أو العلاجات السنية، للحد من التهاب اللثة.
- للاستعمال في حالة التهابات الفم الناتجة عن الأسنان الاصطناعية والتلوث الفطري في الفم.
- للمساعدة في منع تسوس الأسنان لدى الأشخاص المعرضين لخطر عالية لحدوث ذلك، بالإضافة إلى الفلورايد.
- المادة الفعالة كلور هيكسيدين ديجلوكونات عبارة عن مادة مضادة للجراثيم، تقلل من تكوّن اللويحة السنية (البلاك).

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

• وجدت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعالة كلور هيكسيدين ديجلوكونات أو لأي من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (المفضلة في البند 6).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

- لا يجوز استعمال الدواء لدى الأولاد الذين عمرهم أقل من 12 عاماً، إلا بتوصية من طبيب الأسنان.
- لا يجوز استعمال الدواء في أي مكان آخر سوى فمك. اشطف جيداً إذا لامس المستحضر عينيك أو أذنيك.
- لا يجوز استعمال الدواء فوراً بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة. قد يخل معجون الأسنان بفعالية المستحضر. بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة يجب شطف الفم جيداً بالماء والانتظار 5 دقائق قبل استعمال هيكسيديل دينتال جل. بدلاً من ذلك، يمكن استعمال هيكسيديل دينتال جل في وقت آخر خلال اليوم.
- توقف عن استعمال هيكسيديل دينتال جل وتوجه لتلقي المساعدة الطبية المستعجلة إذا نشأ لديك رد فعل تحسسي شديد. انظر معلومات إضافية في البند 4.
- يُحتمل حدوث تظليخ (تصبغ) مؤقت للأسنان واللسان. انظر معلومات إضافية في البند 4.
- قد تلاحظ تغيراً في الإحساس بالطعم أو إحساساً بالذق. انظر معلومات إضافية في البند 4.
- لا يجوز تبيض الأقمشة التي لامست الجل.
- التفاعلات بين الأدوية:
- إذا كنت تستعمل الأن، أو قد استعملت مؤخراً دواءً أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل، الإرضاع والخصوبة:

ليس هناك دليل على تضرر الجنين عند استعمال هيكسيديل دينتال جل. بإمكانك استعمال هيكسيديل دينتال جل إذا كنت حاملاً أو مرضعاً.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي هيكسيديل دينتال جل على المركب PEG 40 Hydrogenated Castor Oil (يسمى أيضاً: Macrogolglycerol Hydroxystearate)، الذي قد يسبب تهيجاً في الجلد.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية المتبعة هي:

- التهاب اللثة: نظف أسنانك بالفرشاة لمدة دقيقة واحدة على الأقل، مرة واحدة أو مرتين في اليوم باستعمال 2 سم (سنتيمترين) من الجل. استمر بالعلاج لمدة ما يقارب شهراً واحداً.
- التهابات الفم والتلوث الفطري في الفم: ادهن الجل مباشرة على المناطق الموهمة بواسطة طرف صيدك أو عود طمينة مرة واحدة أو مرتين في اليوم لمدة دقيقة واحدة على الأقل، واصل الاستعمال لمدة يومين بعد التعافي.
- التهابات الفم الناتجة عن الأسنان الاصطناعية: قبل إدخال الأسنان الاصطناعية، ادهن هيكسيديل دينتال جل بلطف على الأسنان الاصطناعية في المناطق التي تلامس اللثة.

• للمساعدة في منع تسوس الأسنان أو بعد العمليات الجراحية السنية: استعمل حسب تعليمات طبيب الأسنان الخاص بك.

إذا استمرت أعراضك، فراجع طبيبك.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

لا يجوز البلع، للاستعمال الموضعي في تجويف الفم.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء بالخطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأخبر معك عبوة الدواء.

إذا نسيت استعمال هذا الدواء في الوقت المحدد، فلا تستعمل جرعة مضاعفة. استعمال الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي واستشر الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. أضغ النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال هيكسيديل دينتال جل إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

• توقف عن استعمال هيكسيديل دينتال جل وتوجه فوراً لتلقي المساعدة الطبية إذا ظهر لديك طفح جلدي، انتفاخ الشفتين، اللسان، الحلق أو الوجه أو إذا وجدت لديك صعوبات في التنفس. قد تكون هذه الأعراض أعراضاً لرد فعل تحسسي خطير وتندر جداً.

• توقف عن استعمال الجل وتوجه إلى طبيب الأسنان الخاص بك إذا ظهر لديك تهيج، ألم أو انتفاخ في الفم.

أعراض جانبية أخرى يمكن أن تنشأ:

• أعراض جانبية مدى شويوعا غير معروف (أعراض لم يتم تحديد مدى شويوعا بعد):

• تظليخ (تصبغ) مؤقت للسان. يتلاشى التظليخ عند إيقاف العلاج.

• تظليخ (تصبغ) مؤقت للأسنان. عادةً يمكن إزالة هذا التظليخ عن طريق التنظيف بالفرشاة. اجتناب التظليخ بواسطة الامتناع عن شرب الشاي، القهوة أو النبيذ الأحم، خاصةً في الساعة التي تلي الاستعمال، وعن طريق تنظيف الأسنان

اليومي بالفرشاة وبمعجون الأسنان (انظر البند 3). إذا بقي التظليخ، فيمكن إزالته بواسطة التظليخ والصلب لدى طبيب الأسنان أو إحصائية صحة الأسنان. بإمكانك تنظيف أسنانك الاصطناعية بواسطة مادة لتنظيف الأسنان الاصطناعية.

• يُحتمل أن تلاحظ تغيراً في حاسة الذوق أو إحساساً بالذق عندما تستعمل الجل لأول مرة. يزول هذا الشيء عادةً مع الاستمرار بالعلاج.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، فليطلب استشارة الطبيب.

بالإمكان التخلي عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التخلي عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au) والذي يوجه إلى الاستشارة المتخصصة للتخلي عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.au/>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمم! هذا الدواء، وكل دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع ومجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمم.

لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من ذلك الشهر.

• ظروف التخزين: يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25°C.

• عمر التخزين بعد الفتح لأول مرة: بعد الفتح لأول مرة يجب استعماله في غضون 6 أشهر.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

Purified Water, Isopropyl Alcohol, Hydroxypropyl Cellulose, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil (Macrogolglycerol Hydroxystearate), Sodium Acetate Anhydrous, Levomenthol, Peppermint Oil.

كيف يبدو الدواء وما هو محتواه: أنبوية العبوة: أنبوية معدنية ذات سداس متقوّل، معبأة في عبوة كرتونية. تحتوي الأنبوية على جل شفاف بنكهة النعناع ويرانحة مميزة للنعناع.

• حجم العبوة: أنبوية تحتوي على 60 غراماً من الجل.

• المصنّع وصاحب الامتياز: بن شعوم فلوريوس م.رض، المنطقة الصناعية ميسجاف، بريد متجول 2017400.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 17539-36041-00

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

هذه النشرة فحصت وأقرت من قبل وزارة الصحة في تاريخ 01/2024.