

אציקלוביר ויזין משחת עיניים

חומר פעיל:

כל גרם מכיל את החומר הפעיל:
אציקלוביר (Aciclovir) 3%

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

משחת עיניים **אציקלוביר ויזין** מיועדת לטיפול בקרטיטיס (דלקת קרנית העין) שנגרם על-ידי גנף ההרפס סימפלקס (Herpes Simplex).

קבוצה תרפויטית: אנטי-ויראלי.

2. לפני השימוש בתרופה: אין להשתמש בתרופה אם:

אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל אציקלוביר (Aciclovir), ואלאציקלוביר (Valaciclovir) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה תרופה זו (ראה סעיף 6 - "מידע נוסף").

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני השימוש באציקלוביר ויזין ספר לרופא או לרוקח שלך אם:
אתה מרכיב עדשות מגע. יש להימנע מהלרכיב עדשות מגע בזמן השימוש באציקלוביר ויזין.
אתה אינך בטוח, פנה לרופא או לרוקח שלך לפני השימוש באציקלוביר ויזין.

ילדים ומתבגרים:

אין הנחיות מיוחדות. מינון ואופן שימוש כמו במבוגרים.

אינטראקציות/תגובות בין תרופות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריון, הנקה ופוריות:

אם הנך בהריון או מניקה, חושבת שאת בהריון או מתכננת להיכנס להריון, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה. השימוש בתרופה במהלך הריון ייעשה לפי הוראת הרופא במידה והתועלת בשימוש עולה על הסיכון הפוטנציאלי.
אין מידע על ההשפעה של אציקלוביר על פוריות האישה או הגבר.

נהיגה ושימוש במכונית:

אציקלוביר ויזין עלול לגרום לטשטוש ראייה ובעל השפעה חולפת על איכות הראייה, לכן יש להיזהר בנהיגה ושימוש במכונית.
באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או משחקים בקרבת הכביש וכדומה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל:

מבוגרים וילדים:

יש למרוח 1 ס"מ של אציקלוביר ויזין על ידי לחיצה על השפופרת אל תוך שק הלחמית התחתון (lower conjunctival sac) הנמצא בחלק הפנימי של העפעף התחתון, 5 פעמים ביום, עם מרווח של 4 שעות לערך בין כל מריחה, למעט בזמן השינה.
יש להמשיך להשתמש באציקלוביר ויזין לפחות 3 ימים לאחר שהתסמינים חלפו.

קשישים:

אין דרישות מיוחדות של התאמות מינון ואופן שימוש.

אין לעבור על המנה המומלצת.

משך הטיפול:

יש להשתמש בתרופה זו לשך הזמן המומלץ על ידי הרופא שלך.

אופן השימוש:

- אין לבלוע אציקלוביר ויזין מיועדת לשימוש בעיניים בלבד.
- רחץ את ידייך לפני השימוש בתרופה
- השתמש באצבע שלך כדי למשוך בעדינות כלפי מטה את העפעף התחתון של עינך הנוגעה (איור 1)
- הטה את ראשך קלות לאחור והבט למעלה
- מרח 1 ס"מ של אציקלוביר ויזין לתוך העפעף התחתון שלך. יש להימנע מנגוע של קצה השפופרת בעינך (איור 2)
- עצום את עינך למשך 30 שניות (איור 3)
- רחץ את ידייך לאחר השימוש



איור 3

איור 2

איור 1

אם השתמשת בטעות במינון גבוה יותר ספר לרופא או לרוקח שלך אם השתמשת באציקלוביר ויזין יותר מהמנה המומלצת שלך.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת להשתמש בתרופה

אם שכחת להשתמש בתרופה ופספסת מנה, השתמש בה ברגע שנזכרת. אולם אם הזמן סמוך למועד המנה הבאה שלך, דלג על המנה שהוחמצה. המשך להשתמש בתרופה בהתאם לתוכנית שנקבעה.
אין להשתמש במנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באציקלוביר ויזין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי שכיחות מאוד (עלולות להופיע ביותר מ-1 מתוך 10 מטופלים):

- קרטופתיה שטחית (Superficial keratopathy) – תגובה אלרגית אשר אינה דורשת הפסקת טיפול וחולפת ללא סיבוכים.

תופעות לוואי שכיחות (עלולות להופיע בעד 1 מתוך 10 מטופלים):

- תחושת צריבה קלה חולפת בעין, המופיעה מיד לאחר השימוש.
- דלקת הלחמית (conjunctivitis) – דלקת של רירית העין.

תופעות לוואי נדירות (עלולות להופיע בעד 1 מתוך 1000 מטופלים):

- דלקת עפעפיים (Blepharitis)

תופעות לוואי נדירות מאוד (עלולות להופיע בעד 1 מתוך 10000 מטופלים):

- תגובות אלרגיות: תגובות של יתר מיידיות הכוללות אנגיואדמה (נפיחות של הפנים, שפתיים, לשון וגרון) ואורטיקריה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה לאחר תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- ניתן להשתמש בתרופה זו עד 28 ימים מיום פתיחתה לראשונה ולא יאוחר מתאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.
- תנאי אחסון: יש לאחסן בטמפרטורה מתחת של 25°C.
- אין לזרוק תרופה זו למי השפכים או לפח האשפה הביתי. שאל את הרוקח שלך כיצד להיפטר מתרופה בה אין לך צורך יותר. הדבר יעזור להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם – Paraffin, white soft.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

שפופרת אלומיניום המכילה 5 גרם משחה בצבע לבן או כמעט לבן.

שם בעל רישום והיבואן וכתובתו:

רז רוקחות בע"מ, רחוב גשר העץ 31, פארק תעשיות עמק חפר, ישראל

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
175-52-37211-99

עלון זה אושר באפריל 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

RAZP0426-00