

دابيفيجو 5 ملغ، أقراص مغلفة

المادة الفعالة وكميته:

كل قرص يحتوي على:

ليمبوركسانت (Lemborexant) 5 ملء

الماء غير الفعال والمُسيّبة للحساسية في الدواء - انظر البند 6 "معلومات إضافية" والبند 2 "معلومات مهمة عن بعض مكونات الدواء".

إقرأ النشرة تبعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كان لديك المزيد من الأسئلة، فعليك التوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

وصف هذا الدواء للعلاج من أ杰لك. لا تطعمه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة. هذا الدواء غير مخصص لاستخدام لدى الأطفال والمرأهفين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

1. ما هو الغرض من هذا الدواء؟

مهامه لمستقبلات الأوركسين (دواء للنوم/مُنوم)

2. قبل استعمال الدواء

يمنع استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (الergic) للمادة الفعالة (ليمبوركسانت) أو لأي مكون من المكونات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية").
- كنت تُعاني من التغافل (النوم الفوري).

3. كيفية تخزين الدواء؟

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بدبيفيجو، أخبر الطبيب إذا:

- كان لديك تاريخ من الاكتئاب، أو المرض النفسي، أو الأفكار الانتحارية.
- كان لديك تاريخ من الإدمان أو إساءة استخدام الكحول، أو الأدوية التي تصرف بوصفة طيبة أو المدرات.
- كان لديك تاريخ من نوبة مفاجئة من ضعف العضلات المفاجئ (مرض الجمدة)
- كان لديك تاريخ من الشعور بالتعاس في ساعات النهار
- كانت لديك مشكلات في وظائف الرئتين أو مشكلات تنفس
- كنت تعاني من قصور شديد في وظائف الكلى

تحذيرات إضافية:

تُمنع زيادة جرعة الدواء بدون تعليمات صريحة من الطبيب. توجه للطبيب إذا تفاقم الأرق أو لم يتحسن خلال 7 حتى 10 أيام من العلاج.

قد يشير هذا الأمر إلى أن هناك مشكلة أخرى تسبب الأرق.

الأطفال والمرأهفين

هذا الدواء غير مخصص لاستخدام لدى الأطفال والمرأهفين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة. لم يتم إثبات السلامة والفعالية لدى الأطفال والمرأهفين تحت عمر 18 سنة.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا كنت قد تناولت أدوية أخرى مؤخراً، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طيبة والمكمالت الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك، وخاصة إذا كنت تأخذ:

- إيتراكونازول (العلاج للتلوثات الفطرية)، كلوروزوكازون (مضاد حيوي)، فلوكوتازول (العلاج للتلوثات الفطرية)، فيراباميل (العلاج ضغط الدم والدورة الدescrية)، كلوروزوكازون (لإرخاء العضلات)، راتينيتين (العلاج فرحة المعدة) - لأن استعمال تلك الأدوية في نفس الوقت مع دابيفيجو قد يزيد من خطورة أعراض دابيفيجو الجانبيّة.
- ريفياميسين (مضاد حيوي)، إيفالبرينز (العلاج الصرع)، عصبة القدس يوحنا (العلاج الالكتواب)، بوسنان (العلاج فرط ضغط الدم الرئوي الشريكي)، إيفالبرينز (العلاج العدوى بفيروس HIV)، إيتراكوبيرين (العلاج الصرع) - لأن استعمال تلك الأدوية في نفس الوقت مع دابيفيجو قد يقلل من فعالية دابيفيجو.
- بوبروبيون (العلاج الالكتواب)، ميتاندون (لتسكن الآلام المتوسطة حتى الشديدة، يساعد في التخلص من الإدمان على الأدوية المضدرة) - لأن استعمال تلك الأدوية في نفس الوقت مع دابيفيجو قد يسبب اضطراباً في فعاليتها. يمكن أن يرافق الطبيب الاستجابة لتلك الأدوية وكذلك يأخذ زيادة جرعتها في الاعتبار.
- مثبطات الجهاز العصبي المركزي (مثل البنزوديازيبينات، الأفيونيات، مصادفات الالكتواب من مجموعة ثلاثيات الحلقات) - لأن تناول تلك الأدوية مع دابيفيجو يزيد من خطورة تنشيط الجهاز العصبي المركزي، مما قد يؤدي إلى الإمسار بالبطاقة خلال ساعات النهار. يمكن أن يحتاج الطبيب لتعديل جرعة دابيفيجو وتلك الأدوية عندما يتم تناولها معًا.
- يمكن تناول أدوية أخرى قد تؤدي إلى التعاس، إلا إذا كان ذلك بناءً على تعليمات الطبيب.

استعمال الدواء والطعام

إذا تم تناول الدواء مع الوجبة أو بعدها مباشرةً، فإن الوقت اللازم لبداية النوم قد يطول.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

يُمنع استهلاك الكحول في نفس الوقت مع دابيفيجو، لأن الأمر يزيد من خطورة المعاناة من أعراض جانبية شديدة.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل، فاستشيري الطبيب قبل استعمال الدواء. من غير المعروف ما إذا كان دابيفيجو يُمكنه أن يؤذي الجنين.

إذا كنت ترضعين رضاعة طبيعية أو تخططين للإرضاع رضاعة طبيعية، فاستشيري الطبيب قبل استعمال الدواء. دابيفيجو ينتقل لحليب الأم. تحدثي مع طبيبك عن الطريقة المثلثي لتغذية رضيعك في أثناء العلاج بدبيفيجو.

السيارة واستعمال الماكينات

تُمنع السباحة، أو تشغيل الماكينات الثقيلة، أو القيام بأعمال حظرية، أو القيام بأعمال تحتاج إلى ذهنه صافٍ، إذا كنت تتناول دابيفيجو.

ووصلت على أقل من ليلة كاملة من النوم (7 ساعات على الأقل) أو إذا تناولت جرعة أعلى من التي وصفها لك الطبيب.

قد تظل تشعر بالتعاس في اليوم التالي لتناول دابيفيجو. امتنع عن السباحة أو القيام بأنشطة خطيرة أخرى إلى أن تشعر بأنك يفطن تماماً.

معلومات مهمة عن بعض مكونات الدواء

دبيفيجو يحتوي على اللاكتوز. إذا كان أحد الأطباء قد أخبرك من قبل أن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، فاستشر الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب استعمال دابيفيجو دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك أن تتأكد من الطبيب أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد مما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر.

لا يحدد الجرعة وطريقة العلاج إلا الطبيب. الجرعة المعتادة عموماً هي:

ليس أكثر من قرص واحد في اليوم من دابيفيجو، مباشرةً قبل النوم في المساء، بحيث يكون الوقت المتبقي المخطط لاستيقاظك بعده هو 7

ساعات على الأقل.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة التناول

لا توجد معلومات متوفرة عن طحن/搣يم/مضع الفرسن.

إذا تناولت جرعة زائدة عن طريق الخطأ

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا أبتلع طفلً من الدواء عن طريق الخطأ، فتوجه فوراً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضره عليه الدواء معك.

إذا أوقفت تناول الدواء

يجب المداومة على العلاج حسبما أوصاك به الطبيب.

حتى إذا حدث تحسُّن في حالة الصحية، فلا تترد عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

لا تتناول الأدوية في الظلام! تأكد من الملصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع النظارات إذا كنت تحتاج لها.

إذا كان لديك المزيد من الأسئلة تتعلق باستعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما هو الحال مع أي دواء، فقد يسبب استعمال دابيفيجو أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تجزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل لا تعلاني من أي منها.