הודעה על החמרה (מידע בטיחות) בעלון לצרכן (מעודכן 3102.50)

	28.0	04.2014 תאריך
Daktacort Cream (ת ומספר הרישום <u>662923616</u>	שם תכשיר באנגליו
	J-C Health Care Ltd.	שם בעל הרישום
מרות בלבד !	טופס זה מיועד לפרוט ההח	

ההחמרות המבוקשות פרק בעלון טקסט חדש טקסט נוכחי התוויות מתי אין להשתמש אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים<mark>, או</mark> לכל אתה רגיש (אלרגי) לחומרים בתכשיר? אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה הפעילים או לכל אחד התרופה <mark>או לתרופות אנטיפיטריתיות אחרות</mark> מהמרכיבים הנוספים אשר דומות. מכילה התרופה. אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה: אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול: תגובות בין תרופותיות: הריון והנקה: כיצד תשתמש בתרופה: תופעות לוואי:

מצ"ב העלון, שבו מסומנות ההחמרות המבוקשות על רקע צהוב

הודעה על החמרה (מידע בטיחות) בעלון לרופא (מעודכן 3102.50)

28.04.14	תאריד
----------	-------

שם תכשיר באנגלית ומספר הרישום <u>Daktacort cream 0662923616</u>

__J-C Health Care Ltd.___ שם בעל הרישום

טופס זה מיועד לפרוט ההחמרות בלבד!

ההחמרות המבוקשות			
טקסט חדש	טקסט נוכחי	פרק בעלון	
		Indication	
Known hypersensitivity to miconazole or other imidazole derivatives, hydrocortisone or another ingredient of DAKTACORT. Tuberculous skin infections, herpes simplex, vaccinia, all forms of varicella.	Known hypersensitivity to miconazole, hydrocortisone or another ingredient of DAKTACORT. Tuberculous skin infections, herpes simplex, vaccinia, all forms of varicella.	contraindications	
		Posology, dosage & administration	
		Special Warnings and Special Precautions for Use	
		Interaction with Other Medicaments and Other Forms of Interaction	
Pregnancy Caution is recommended during pregnancy. Treatment of large surfaces and the application under occlusive dressing should be avoided during that time. Miconazole has not been observed to be teratogenic in animals, but has been shown to be embryotoxic at maternal toxic doses. In animals, corticosteroids are known to cross the placenta and consequently can affect the fetus. (See Non clinical information.)	Pregnancy Caution is recommended during pregnancy. Treatment of large surfaces and the application under occlusive dressing should be avoided during that time. Miconazole has not been observed to be teratogenic in animals, but has been shown to be embryotoxic at maternal toxic doses. Corticosteroids are known to cross the placenta and consequently can affect the fetus. (See Non clinical information.)	pregnancy Fertility, and Lactation	
		Adverse events	

מצ"ב העלון, שבו מסומנות ההחמרות המבוקשות על רקע צהוב