

דיזיגו 5 מ"ג, טבליות מצופות:

החומר הפעיל וכמותו:

כל טבליה מכילה:

למברוקסנט (lemborexant) 5 מ"ג

חומרם בלתי פעילים ואלרגניים בתוופה – ראה סעיף 6 "מייעז נסוף" ובסעיף 2 מייעז חשוב על חלק מהמרכיבים של התוופה".

קרא בעיון את העילן עד סופו בתרם תשמש בתוופה. עלון זה מכיל מידע תמצית על התוופה. אם יש לך שאלות נוספת, פנה אל הרופא או אל הרocket.

תוופה זו ברשמה לטיפול עבוקן. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרופאי דומה.

תוופה זו איבנה מיוחדת לשימוש ילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 שנה.

1. למ"ד מיעצת התוופה?

התוופה מיועדת לטיפול במוגרים הטובלים מדודי שינה, המאופינים בקש"י היידמות או קשיים בשימור שינה (איןטומניה).

קבוצה רפואית:

אנטוגניסט לרצפטורים של אוקסין (תוופה לשינה/היפנויה)

2. לפניהם השימוש בתוופה:

אין להשתמש בתוופה אם:

- אתה רגיש (אלרג) לחומר הפעיל (למברוקסנט) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התוופה (ראה סעיף 6 "מייעז נסוף").
- אתה סובל מנרכולפסיה (הירמות בלתי רצונית).

אדרחות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתוופה:

- יש לך היסטוריה של התמכרות או שימוש לרעה באלכוהול, תרופות מרשם או סמי רחוב.
- יש לך היסטוריה של התקף פתאומי של חולשת שרירים (קטפלקסייה).
- יש לך היסטוריה של ישכניות בשעות היום.
- יש לך בעיות בתפקוד הרווח או בעיות נשימה.
- יש לך בעיות בתפקוד הכלילי.
- אתה סובל מליקוי חמוץ בתפקוד הכלילי.

אין להעתלות את המינון של התוופה ללא הוראה מפורשת של הרופא. פנה לרופא במידה ובודדי השינה מהמים או אין מפריטים תוך 10 ימי טיפול. דבר זה עלול להציג ערך רק שקיימת בעיה אחרת הגורמת לנדוד שינה.

ילדים ומתבגרים:

תגובה בין תרופות:

- אם אתה לוקח, או אם לך תקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות לא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:
- אטרוקונוזול (טיפול ביוהומים פטיותיים), קלריטורומיין (אנטיביטיים), פלקונוזול (טיפול בדיאמינים פטריים), ורפיפיל (טיפול בדיאמינים). בכירה – קיבת תרופות אלה יחד עם דיזיגו עלול להעלות את הסיכון לתופעת נודאי של דיזיגו.
- ריפומפיצין (אנטיביטייקה), קרובמדפין (טיפול באפליסיה), צמח St. John's Wort (טיפול בדיכאון), בסנטון (טיפול ביתר לחץدم ריאטי עזקה), אפאבירין (טיפול בדיזוז- HIV), אוטוביין (טיפול בדיזוז בעיני-ה- HIV), מודפיניל (טיפול בישכניות) – שימוש בתרופות אלה יחד עם דיזיגו עלול להפחית את הייעילות של דיזיגו.
- בופרופין (טיפול בדיכאון), מಥאדון (לשיכון כאבים ביןוניים עד חזקים), מסיע בגמilia מהמתכוורות לסמים לתרופות אלו ואף שקוול להעלota את המינון שלהן.
- מודאי ערכות העצבים המרכזית (כגון בצדיאזפינים, אופיאידים, נוגדי דיזיגו מקובצות הטריציקלים) – נטילת תרופות אלו יחד עם דיזיגו עלול להעלות את הסיכון לדיזיגו מערערת העצבים המרכזית, שיכול לגרום לפגיעה בעורנותה במחלק שנות היום. יתכן והרופא יצטרך להתראים את המינון של דיזיגו ותרופות אלו כאשר נוטלים אותו יחד.
- **אין ליטול תרופות אחרות העולות לגורם לשיכניות,** אלא אם כן זו הוראת הרופא.

שימוש בתוופה ומהו:

במידה והטוופה ניתלה עם הארוחה או סמוך אחריה, הזמן עד תחילת השינה עלול להתארך.

שימוש בתוופה וציריך אלכוהול:

אין לצרוך אלכוהול יחד עם דיזיגו, היות והדבר מעלה את הסיכון לסובל מתופעות לוואי חמורות.

הירון, הנקה ופומיות:

אם את בהריון או מתכנתה הירון, היועצץ ברופא לפני השימוש בתוופה. לא ידוע האם דיזיגו יכול להפגע בעובר.

אם את מכקה או מתכנתה להנkick, היועצץ ברופא לפני השימוש בתוופה. דיזיגו עוברת לחלב אם. שוחחי עם הרופא שלק' לגבי הדרכו הטובה ביותר להזין את התינוק שלק' במהלך הטיפול בדיזיגו.

בגיה ושימוש במכוונות:

אין להגיה, להפעיל מכוונות כבאות, לבצע פעולות מסוכנות, או לבצע פעולות המצריכות חשיבה צולחה, במידה ואותה גוטל דיזיגו והוא לך פחות מיליה של שינה (פחות 7 שעות) או אם נטלת מינון גבוה יותר מזה שהרופא רשם לך.

אתה עלול עדין להציג מנוונים ביום של מהירות נטילת דיזיגו. אין להגיה או לבצע פעולות מסוכנות אחרות עד שאתה מוגרש עז לחלוות.

מייעז חשוב על חלק מהמרכיבים של התוופה:

דיזיגו מיליה לקות. אם נאמר לך בעבר על ידי רופא שיש לך איסכון לסתול מטופלים מסויימים, היועץ ברופא לפני נטילת תרופתך.

3. כיצד תשמש בתוופה?

יש להשתמש בדיזיגו תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלייך לבדוק עם הרופא או הרocket אם איןך בטוח בכךגע למינון ואפואן הטיפול בתכשיש.

המינון ואפואן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקבול בדרך כלל הוא:

לא יותר מטבילה אחת ביום של דיזיגו, סמוך לפפי השינה בערב, כאשר הזמן המתוכנן שנ過ור הוא לפחות 7 שעות.

אין לעבור על המנה המומלצת.**אוף נסיליה:**

לא קיים מידע לגבי כתישה/חציה/לעיסה של הטבליה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בעל ידך מן התוופה, פנה מיד לרופא או לחדר רפואי מין של בית חולים והבא אריזת התוופה איתך.**אם מפסיק את נטילת התוופה:**

יש להפסיק בטעמם כפוי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול מוביל להיוועץ ברופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווות והמנה **בכל פעם** שאתת נטלת תרופתך. הרכב משקפיים אם אתה ذוקן להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתוופה, היועץ ברופא או ברocket.