

דצמבר 2020

רופא/ה נכבד/
רוכח/ת נכבד/ה

**Olumiant 2mg
Olumiant 4mg**
Film coated tablets

חברת לילי מבקשת להודיעיכם כי הعلונים לרופא ולצורך של התכשיר שביניהם עודכו.
בהתודה זו מצוינים רק הסעיפים בהם נעשה שינוי המהווה החמרה. קיימים עדכונים נוספים.
טקסט שהתווסף מודגש בקו תחתון.
העלונים המעודכנים לרופא ולצורך מפורסמים במאגר התרופות באתר משרד הבריאות וניתן לקבלם
מודפסים על ידי פניה לבעל הרישום :
אלילILI ישראל בע"מ, השיזף 4, רעננה, טל": 09-9606234

בברכה,
ד"ר יצחק תירוש
רוכח ממונה

החומר הפעיל:

Baricitinib 2&4 mg

התוויה המאושרת לתרופות:

Olumiant is indicated for the treatment of moderate to severe active rheumatoid arthritis in adult patients who have responded inadequately to, or who are intolerant to one or more disease modifying anti rheumatic drugs.

Olumiant may be used as monotherapy or in combination with methotrexate.

העדכנים העיקריים בעלון לרופא הינט:

4.4 Special warnings and precautions for use

Diverticulitis

Events of diverticulitis and gastrointestinal perforation have been reported in clinical trials and from postmarketing sources. Baricitinib should be used with caution in patients with diverticular disease and especially in patients chronically treated with concomitant medications associated with an increased risk of diverticulitis: nonsteroidal anti-inflammatory drugs, corticosteroids, and opioids. Patients presenting with new onset abdominal signs and symptoms should be evaluated promptly for early identification of diverticulitis or gastrointestinal perforation.

4.8 Undesirable effects

Gastrointestinal disorders – Frequency Uncommon - Diverticulitis

העדכוניים העיקריים בעליון לצריכן הימנ:

2. לפני השימוש בתרופה

ازהירות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרופה לפני ובמהלך הטיפול באולומיאנט ספר לרופא אם אתה:

- סבלת בעבר מדיברטיקוליטיס (מחלת הסעיף, diverticulitis) – סוג של דלקת במעי הגס, או כיבים בקיבה או במעיים (ראה פרק 4)

אם אתה מבחין באחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות, עלייך לדוח מיידית לרופא:

- כאב בטן עז המלווה במיוחד בחום, בחילות והקאות.

איןטראקטיות/תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לך תחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרוקח.
במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות שיכולות להגבר את הסיכון לדיברטיקוליטיס כמו תרופות נוגדות דלקת שאינן סטריאודילוֹט (NSAID), בדרך כלל משמשות לטיפול בכאבים ואו מצבים דלקתיים של שרירים או המפרקים ואו אופיאידים (משמשים לטיפול בכאב חמוץ), ואו קורטיקוסטרואידים (בדרך כלל משמשים לטיפול במצבים דלקתיים). ראה פרק 4.

4. תופעות לוואי

תופעות לוואי לא שכיחות (עלולות להופיע بعد 1 מתוך 100 אנשים):

- דיברטיקוליטיס (מחלת הסעיף, diverticulitis) – דלקת כואבת של כיסים קטנים ברכמת המעי.