

اسيكلوفير فيزرين مَرْهُم لِلْعَيْنَيْنِ

المادة الفعالة:

يحتوي كل غرام على المادة الفعالة:
3% w/w Aciclovir (Aciclovir)

الجرعة المقحولة بشكل عام:
البالغون والأطفال:
يجب دهن 1 سم من أسيكلوفير فيزرين عن طريق الضغط على الأنبوة داخل كيس متاحمة العين الأسفل (lower conjunctival sac) الموجود في الجزء الداخلي من جفن العين السفلي، 5 مرات في اليوم، مع فاصل من 4 ساعات تقريباً بين دهن الآخر. ما عدا وقت النوم.
يجب مواصلة استعمال أسيكلوفير فيزرين على الأقل 3 أيام بعد اختفاء الأعراض.

المستardon:

لا توجد متطلبات خاصة لملامنة الجرعة وطريقة الاستعمال.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها:
مدة العلاج:

يجب استعمال هذا الدواء للفترة الزمنية الموصى بها من قبل الطبيب.

طريقة الاستعمال:

لا يجوز بلع الدواء. أسيكلوفير فيزرين مخصص للاستعمال في العينين فقط.

1. اغسل يديك قبل استعمال الدواء.
2. استعمل أسيكلوفير فيزرين مخصوص لعينيك السفليتين المصابة للأسفل برفق (رسم 1).
3. قم بإتمام رأسك قليلاً للخلف واظهر الأعلى.
4. إدهن 1 سم من أسيكلوفير فيزرين إلى داخل جفن عينك السفلي. يجب الامتناع عن ملامسة طرف الأنبوة لعينك (رسم 2).
5. أغلق عينك لمدة 30 ثانية (رسم 3).
6. اغسل يديك بعد الاستعمال.



إذا استعملت عن طريق الخطأ جرعة أكبر من اللازم آخر الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا استعملت جرعة أكبر من الموصى بها من أسيكلوفير فيزرين.
إذا أفرجت بتناول الجرعة أو بلع طفل من الدواء بالخطأ، توجه على الفور إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معاً.

إذا نسيت استعمال الدواء إذا كنت تأخذ، أو أخذت موعداً أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات قريب موعد جرعة آخر تلكالية، تجاوز الجرعة التي تم تفويتها.
وأصل استعمال الدواء حسب الخطوة التي تم تحديدها.

لا يجوز استعمال جرعة مخالفة من أجل التعييض عن الجرعة المنسية.

يجب المراقبة على العلاج كما ووصى من قبل الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تتحقق من الملصق والجرعة في كل مرة تتناول بها دواء.
يجب وضع القرارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أي أسلنة إضافية فيما يتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية
كما في كل دواء، قد يسبب استعمال أسيكلوفير فيزرين أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تتفق من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

أعراض جانبية شائعة جداً (قد تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 متعالجين):
- احتلال القنية السطحي (Superficial keratopathy) - رد فعل أرجي الذي لا يحتاج لإيقاف العلاج ويختفي دون مضاعفات.

يمكن استعمال هذا الدواء حتى 28 يوم من يوم فتحه لأول مرة وفي موعد لا يتجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية الظاهر على العبوة.
شروط التخزين: يجب تخزينه درجة حرارة تحت 25 درجة مئوية.
لا يجوز رمي هذا الدواء المصرف الصحي أو لسلة المهمات البيئية. اسأل الصيدلي الخاص بك عن كيفية التخلص من دواء لم تعد بحاجة له. الأمر يساعد في المحافظة على البيئة.

6. معلومات إضافية
بالإضافة إلى المركب الصالحي، يحتوي الدواء أيضًا على - Paraffin, white soft.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:
أنبوبة الومينيون التي تحتوي 5 غرام مرم ملون أبيض أو تقريباً أبيض.

اسم صاحب التسجيل والمُستورد وعنوانه:

راز روكموت، م.ض، شارع جيشر هعيش، 31، الحديقة الصناعية عيميك حيفا، إسرائيل

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
99-372111-175-52.

تمت المصادقة على هذه النشرة في نيسان 2024 وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.

من أجل التيسير وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. بالرغم من ذلك،
الدواء مُخصص لكلا الجنسين.

RAZP0426-00

1. لأي غرض مُخصص الدواء؟

مَرْهُم العَيْنَيْنِ أسيكلوفير فيزرين مُخصص لعلاج التهاب قرنية العين الذي ينجم عن فيروس الهرس البسيط (Herpes Simplex). (Herpes Simplex)

الفصيلة العلاجية: مضادات للفيروسات

2. قبل استعمال الدواء إذا:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

كنت حاملةً (أرجي) للمادة الفعالة أسيكلوفير (Aciclovir)، وفالاسيكلوفير (Valaciclovir) أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها هذا الدواء (انظر البند 6 - "معلومات إضافية").

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

قبل استعمال أسيكلوفير فيزرين أخر الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا:
كنت تضع عدسات لاصقة. يجب الامتناع عن وضع عدسات لاصقة أثناء استعمال أسيكلوفير فيزرين.

إذا لم تكن واثقاً، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك قبل استعمال أسيكلوفير فيزرين.
الأطفال والمرأهقون: لا توجّد تعليمات خاصة. الجرعة وطريقة الاستعمال كما هو الحال لدى البالغين.

تقاطعات/ تداخلات بين الأدوية:
إذا كنت تأخذ، أو أخذت موعداً أخرى أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل، الإرضاع والخصوبة:

إذا كنت حامل أو مرضعة، تظنين أنك قد تكونين حامل أو خططين للدخول في الحمل، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل باستعمال الدواء. استعمال الدواء خلال الحمل يمكن لا توجّد معلومات بخصوص تأثير أسيكلوفير على خصوبة المرأة أو الرجل.

السيادة واستعمال الماكينات:

قد يسبب أسيكلوفير فيزرين ضبابية الرؤية وقد يكون ذات تأثير منعكس على جودة الرؤية، لذلك يجب توخي الحذر عند السيادة أو استعمال الماكينات.
بعض الأطباء، يجب تحذيرهم من ركوب الدراجة الهوائية أو من اللعب بالقرب من الشارع وما إلى ذلك.

3. كافية استعمال الدواء؟

يجب الاستعمال دائمًا وفق تعليمات الطبيب. عليك التتحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء. الجرعة وطريقة العلاج يتم تحديدها من قبل الطبيب فقط.

أعراض جانبية شائعة (قد تظهر لدى حتى 1 من بين 10 متعالجين):

- شعور عابر بالحرقة في العين، الذي يظهر فوراً بعد الاستعمال.
- التهاب المتاحمة (conjunctivitis) - التهاب مخاطية العين.

أعراض جانبية نادرة (قد تظهر لدى حتى 1 من بين 1000 متعالجين):

- التهاب الجفون (Blepharitis)

أعراض جانبية نادرة (قد تظهر لدى حتى 1 من بين 10000 متعالجين):

- ردود فعل أرجية: ردود فعل فورية من فرط الحساسية التي تشمل وذمة وعائية (الانتفاخ الوجه، الساقين، اللسان والحلق) والشتري.

إذا ظهر عرض جانبية، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية:

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة من خلال الضغط على الرابط "الت bliغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى الموزع الإلكتروني للت bliغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول للرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>.

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريـخ انتهاء الصلاحـية (exp. Date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحـية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.