

سينوكلاير أقراص مطالية

المواد الفعالة وكميتها في وحدة جرعة:

Each coated tablet contains:
verbena herb, powdered 36 mg; Gentian root, powdered
2 mg; Common Sorrel herb, powdered 36 mg; Elder
flower, powdered 36 mg; Primula flower with calyx,
powdered 36 mg.

لكل قرص مطلي يحتوي على:
 مسحوق نباتي فيربينا 36 ملغ، مسحوق جذر جينتيانا
 36 ملغ، مسحوق زهور البيلسان 36 ملغ، مسحوق
 لقانة كل المواد الغير فعالة والمسمية للحساسية في

للمعلومات هامة عن جزء من مركبات الدواء – أن
اقرأ النشرة بامتنان حتى نهايتها قبل أن تستعمل
معلومات ملخصة عن الدواء، إذا كانت لديك أسئلة
الصيادي.

الدواء سينوكيلر مخصص للبالغين وللأطفال فوق
العمر الذي ينتهي إلى أداء حسب التقييمات في هذه الحالة

إشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية
عليك التوجه إلى الطبيب إذا تفاقمت أعراض المرض
من استعمال الدواء أو في حال تعادل وتكرر أعراض

١. لاي غرض مُختص الدواء؟
الدواء سينوكيلر مُختص لتفعيل الاعراض في
بالرشح، في البالغين، وفي الأطفال فوق جيل 12
تشمل هذه الاعراض: اختناق في الأنف، رشح الرئتين،
منطقة الجيوب الأنفية.
الفنة العلاجية: دواء نباتي لعلاج الرشح.

2. قبل استعمال الدواع

معلومات للسكريين: قرص مطلي و
غرام كربوهيدرات.
الدواء سينوكلير لا يحتوي على سكر.

3. كيفية استعمال الدواليك

- ١- تذكرة خاصة بخصوص استعمال الدواء:**
 - ١- يجب التوجه إلى الطبيب إذا تفاقمت أعراض المرض وبعد ١٤-٧ يوماً من استعمال الدواء أو في حال تعادل وتنط المستمر.**
 - ٢- الأطفال والمهاتفين: لا يجوز استعمال الدواء سينوكليبر في جيل 12 سنة ذلك لأنه لا توجد معلومات كافية بخصوص استعمال الأعما**

! إذا كنت تأخذ أو إذا أخذت في الآونة الأخيرة، أدوية أخرى بما يدون وصفة طبيب وأضافات تغذية، أخير الطبيب أو الصيدلي بذلك حتى، الآخر عن تفاعلات بين سينه كلينير وأدوية أخرى.

استعمال الدواء والغذاء: يمكن تناول الدواء سينوكلاير، الشراب، أو بدون أي صلة بالغذاء.
إذا كانت لديك حساسية معروفة في جهاز الهضم، يوصى بتناول الدواء بعد الوجبات.

الحمل والإرضاع: إذا كنت حامل أو مرضعة يجب استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء سينوكلير. كما في أدوية أخرى، استعمال سينوكلير أثناء الحمل أو الإرضاع لا ينصح به، إلا في الحالات الطارئة.

- ١- السياقة وتشغيل الماكينات:** لا توجد تحذيرات خاصة بـ الدواء سينوكيلر إثناء السياقة أو تشغيل الماكينات.
- ٢- معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء:** الدواء سينوكيلر يحتوي على بولوكورز، لاكتون، سوكروز وسوربيتول. عليك استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء سينوكيلر إذا كنت تعاني لسعك بات معينة.

4. الأعراض الجانبية:

كلّي أي دواء، قد يسبّب استعمال سينوكليبر أعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفزع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن أن لا تصيب بأي واحدة منها.

الأعراض الجلدية التي تتطلب انتهاء خاص:
 يجب إيقاف استعمال الدواء والتوجه فوراً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ عند ظهور أول عالمدة لرد فعل أرجي شديد الذي يتميز بالانتفاخ الشتني، انتفاخ في اللسان، انتفاخ في الحقق والأدلة، الالتواء المصحوب بتضيق في مجري التنفس (وذمة وعائية)، ضيق تنفس وانتفاخ الروجه. شiroع هذه الأعراض الجلدية نادر.
أعراض جلدية غير شائعة (uncommon) التي تظهر لدى 1-10 مستخدمي الماء من بين 1,000:

أعراض جانبية نادرة (rare): التي تظهر لدى 1-10 مستخدمي الدواء من بين 10,000 حالة في جهاز الهضم (الم بطن، غثيان).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تتعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن التنزيل عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط [التنزيل عن اعراض جانبية عقب للاعوان "الموجود في صفحة البيت في موقع وزارة الصحة الموقع للاستماره الانترنتية للتنزيل عن اعراض جانبية اهم طرتبة الدخول للرابط.](http://www.health.gov.il)

<https://sideeffects.health.gov.il>
بالإضافة، يمكن التبليغ لشركة دكتور سامويلوف استيراد وتسويق بعنوان البريد الإلكتروني: drugsafety@drsamuelov.co.il

٥. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول الاطفال وأو الرضيع وبذلك تمنع التسمم.
- لا تسبب التلفيودون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة وأو اللوحة.

التاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
شروط التخزين: لا يجوز التخزين بدرجة حرارة التي تزيد عن 25 درجة مئوية.

معلومات للسكريين: فررص مطلي واحد من سينوكلير يحتوي بالمعدل ما يقارب 0.2 غرام كربوهيدرات. الدواء سينوكلير لا يحتوي جلوتين.

3. كيفية استعمال الدواء؟

عليه الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً.

الجرعة المتبعة عادة في البالغين والأطفال فوق جيل 12 سنة: قرص مطاط واحد من سينوكاير،

3 مرات في اليوم. لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة استعمال الدواء سينوكلاير: يجب تناول قرص مطلي واحد من سينوكلاير 3 مرات في اليوم (صباح، ظهر ومساء). يجب تناول الفرنس المطلبي مع سادة للشرب (مثلاً كأس ماء). سحق/شطر/مضغ: لا يجوز سحق أو مضغ أو شطر القرص المطلبي.

مدة العلاج بالدواء سينوكلير: في غياب تعليمات أخرى من الطبيب، استعمل الدواء هي 7 حتى 14 يوماً.
يجب التوجه إلى الطبيب إذا تفاقمت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد 7-14 يوماً من استعمال الدواء، فحالياً مكانت اعراض المرض.

إذا افقرت بالخطأ بتناول الجرعة عليك اعلام طبيبك. سيفرق هو إذا كان هناك حاجة للنقاش بأي عمل.

إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو غرفة الطوارئ المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

في حال الإفراط في الجرعة، من الممكن أن تكون الأعراض الجانبية نتيجة استعمال الداء أشد.

- إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المخصص، لا بجور تناول جرعة مضاعفة
 - خذ الجرعة التالية في الوقت المعتمد واستشر الصيدلي او الطبيب.
- إذا توقفت عن تناول الدواء: إيقاف العلاج عادة غير مصحوب باعراض خطيرة
 - أو أعراض خاصة

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من الملصق والجرعة في كل مرة تتناول به دواء، ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أي أستهلاك إضافي، فيما يتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.