

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - ١٩٨٦

يسوّق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

جابانتين تيفع ٦٠٠ ملغ

أقراص

المادة الفعالة وكميتها:

يحتوي كل قرص على:

Gabapentin 600 mg جابانتين ٦٠٠ ملغ

جابانتين تيفع ٨٠٠ ملغ

أقراص

المادة الفعالة وكميتها:

يحتوي كل قرص على:

Gabapentin 800 mg جابانتين ٨٠٠ ملغ

لقائمة المواد غير الفعالة، الرجاء أنظر الفقرة ٦

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

هذا الدواء مخصص لعلاج داء الصرع لدى كبار ومرهقين فوق عمر ١٢ سنة.

هذا الدواء مخصص لعلاج ألم الاعتلال العصبي لدى كبار إعتباراً من عمر ١٨ سنة وما فوق.

(١) لأي غرض مخصص الدواء؟

• لعلاج أشكال مختلفة من الصرع (الإختلاجات التي تكون مقتصرة في البداية على أقسام معينة من الدماغ، سواء إنتشرت لأجزاء أخرى من الدماغ أو لا). يصف لك الطبيب جابانتين ليساعد في علاج مرض الصرع لديك عندما يكون العلاج الحالي الذي تتلقاه لا يتيح السيطرة الكاملة على حالتك.

• لعلاج ألم الاعتلال العصبي (ألم مستمر ناتج عن ضرر عصبي) بعد مرض هربس أو نتيجة مرض السكري. إن مشاعر الألم يمكن أن توصف كحرارة، حرق، ألم نابض، طلقة نارية، طعنة، ألم حاد، تقلصات، وخز، خدر، دبابيس وإبر وما شابه.

الفصيلة العلاجية:

من مضادات الإختلاجات.

(٢) قبل إستعمال الدواء:

❗ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• علمت بوجود حساسية لجابانتين أو لأحد مركباته الأخرى (أنظر الفقرة ٦: «معلومات إضافية»).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

• لقد راودت عدد قليل من الأشخاص المعالجين بأدوية مضادة للصرع مثل جابانتين أفكار إنتحارية أو أفكار عن إلحاق الأذى الذاتي. عليك وعلى أفراد عائلتك الإنتباه إلى التغيرات في الحالة النفسية والتصرفات السلوكية. يجب متابعة ومراقبة العلامات التي تدل على وجود خطورة للإقدام على الإنتحار مثل:

- كلام أو أفكار عن الرغبة في إلحاق الأذى بنفسك.

- الإنطواء على الذات والإبتعاد عن العائلة والأصدقاء.

- إكتئاب أو تفاقم الإكتئاب الموجود.

- الإنشغال بموضوع الموت.

- إباحة أو تسليم ممتلكات غالية الثمن.

في حال ظهور واحد أو أكثر من تلك العلامات أو أي نمط سلوكي مقلق آخر - يجب مراجعة الطبيب حالاً!

• عدد قليل من الأشخاص الذين يتناولون جابانتين يعانون من رد فعل تحسسي أو من رد فعل جلدي خطير، الذي قد يتطور لمشاكل أخطر إذا لم يتم علاجه. عليك الإنتباه لظهور أي واحد من الأعراض المفصلة فيما يلي وإبلاغ الطبيب حالاً عند ظهورها:

ضعف عضلي، حساسية أو ألم وخاصة، إذا شعرت في نفس الوقت، بسوء أو تعاني من سخونة مرتفعة التي يمكن أن تنجم عن تفكك شاذ للعضلات الأمر الذي يمكن أن يشكل خطراً على الحياة وقد يؤدي إلى مشاكل في الكلى. من الجائز أيضاً أن يحدث تغير في لون بولك وتغير في نتائج فحوص الدم (خاصة إرتفاع نسب الكرياتين فوسفوكيناز في الدم).

❗ قبل العلاج بـ جابانتين تيفع إحك للطبيب إذا:

• كنت في فترة الحمل، تخططين للحمل أو في فترة الرضاعة.

• كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الكلية. من الجائز أن يصف لك الطبيب نظاماً مختلفاً لجرعة دوائية.

• كنت معالجا بالديليزة الدموية (hemodialysis). بلغ طبيبك في حال تطور لديك ألم في العضلات و/ أو ضعف.

• تطورت لديك أعراض مثل آلام غير زائلة في البطن، غثيان وتقيؤات، يجب الإتصال بطبيبك حالاً لأن هذه الأعراض قد تدل على إلتهاب شديد في البنكرياس.

• كنت تعاني من إضطراب لعدة أنواع من التشنجات التي تشمل نوبات من نوع «النوبات الصرعية الغيبية» («absence»).

من الخبرة المتراكمة فقد بلغ بعد بدء تسويق المستحضر عن حالات لسوء إستعمال وتعلق بـ جابانتين. عليك إبلاغ الطبيب المعالج إذا وجد لديك سابقة لسوء إستعمال أو تعلق.

❗ إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:

• أدوية تحتوي على أفيونات مثل مورفين. من الجائز أن يزيد المورفين من تأثير جابانتين. بالإضافة لذلك من الجائز أن مشاركة جابانتين مع الأفيونات تؤدي لأعراض مثل الميل إلى النوم و/ أو تثبيط التنفس.

• مضادات الحموضة للمشاكل الهضمية. عند تناول جابانتين مع مضادات الحموضة الحاوية ألومنيوم ومغنيزيوم في نفس الوقت، فإن إمتصاص جابانتين من المعدة قد يقل. لذا، من الموصى به تناول جابانتين ساعتين على الأقل بعد تناول مضادات الحموضة.

• من غير المتوقع أن يتداخل جابانتين مع أدوية أخرى مضادة للصرع أو مع أقراص منع الحمل.

• قد يشوش جابانتين على نتائج بعض الفحوص المخبرية. إذا توجب عليك إجتياز فحص بول، بلغ طبيبك عن تناولك للدواء.

❗ إستعمال الدواء والطعام:

يمكن تناول الأقراص مع أو بدون طعام.

❗ إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول:

لا يجوز شرب البيرة أو المشروبات الروحية أثناء فترة العلاج بهذا الدواء.

❗ الحمل والإرضاع:

لا يوصى بتناول الدواء خلال فترة الحمل، إلا إذا قرر طبيبك بأنه من الممكن تناوله. على النساء في سن الخصوبة إستعمال وسائل منع حمل ناجعة خلال فترة العلاج بالدواء.

لم يتم إجراء بحوث حول إستعمال هذا الدواء لدى النساء الحوامل، لكن لوحظ إرتفاع في خطورة إلحاق الضرر بالجنين الذي يتطور وذلك بإستعمال أدوية أخرى لعلاج نوبات التشنج لدى النساء الحوامل، خاصة إذا كان الإستعمال بأكثر من دواء واحد في نفس الوقت لمنع التشنجات. لذا، وإذا أمكن، حاولي تناول فقط دواء واحد لمنع التشنجات خلال فترة الحمل فقط بحسب توصية من طبيبك.

توجهي حالاً للطبيب في حال كنت حاملاً، تعتقدين بأنه من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل أثناء فترة تناول المستحضر. لا تتوقفي عن تناول الدواء بشكل مفاجئ، لأن التوقف عن إستعمال الدواء قد يؤدي إلى نوبة صرعية، التي قد تسبب إنعكاسات خطيرة على صحتك وعلى صحة الجنين.

جابانتين، المادة الفعالة الموجودة في هذا الدواء، تنتقل عن طريق حليب الأم. لذا لا يوصى بالإرضاع أثناء فترة إستعمال الدواء، لأن التأثير على الطفل غير معروف.

❗ السياقة وإستعمال الماكينات

إن إستعمال هذا الدواء قد يضعف من اليقظة ويسبب الدوار والإرهاق لذا لا يجوز سياقة المركبة، تشغيل الماكينات الخطرة أو القيام بأعمال خطيرة حتى تعلم فيما إذا كان لهذا الدواء تأثير على قدرتك في تنفيذ هذه الأعمال.

(٣) كيفية إستعمال الدواء؟

• يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائماً. عليك الإستيضاح بأسرع ما يمكن من الطبيب أو من الصيدلي إذا كان تأثير جابانتين أقوى أو أضعف مما ينبغي أو إذا لم تكن واثقاً.

• الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

• هذا الدواء مخصص لعلاج داء الصرع لدى كبار والمرهقين فوق عمر ١٢ سنة.

• هذا الدواء مخصص لعلاج ألم الاعتلال العصبي لدى كبار إعتباراً من عمر ١٨ سنة وما فوق.

• عادة يرفع الطبيب المعالج الجرعة الدوائية بالتدريج.

• الجرعة الدوائية الإبتدائية تكون عادة بين ٣٠٠ ملغ و- ٩٠٠ ملغ كل يوم.

• بعد ذلك، بالإمكان رفع الجرعة الدوائية بحسب تعليمات الطبيب حتى جرعة دوائية يومية عظمى قدرها ٣٦٠٠ ملغ يرشدك الطبيب بتناول ذلك بـ ٣ جرعات منفصلة، أي مرة في الصباح، مرة في الظهرية ومرة في المساء.

• يجب إستعمال هذا الدواء في أوقات محددة كييفما قرر الطبيب المعالج.

• لا يجوز المضغ! يجب بلع الأقراص مع الكثير من الماء.

ليس بالإمكان شطر الأقراص. عند الحاجة، من أجل تسهيل البلع يمكن تقسيم القرص إلى أجزاء صغيرة لكن يجب بلع كل الأجزاء في نفس الوقت.

• يوصى بتناول جابانتين تيفع ساعتين على الأقل بعد تناول مضادات الحموضة.

• واصل تناول المستحضر حتى يبلغك الطبيب بالتوقف.

• إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلية أو تخضع للعلاج بالديليزة الدموية فمن الجائز أن يصف لك الطبيب نظاماً لجرعة دوائية أو جرعة دوائية مختلفين.

• إذا تجاوزت عمر ٦٥ سنة، فعليك تناول جرعة دوائية إعتيادية من جابانتين إلا إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى. من الجائز أن يصف لك الطبيب نظاماً لجرعة دوائية أو جرعة دوائية مختلفين وذلك إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى.

❗ إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبه الدواء معك.

إن الجرعة الدوائية المفرطة قد تؤدي إلى زيادة الأعراض الجانبية وذلك يشمل: فقدان الوعي، دوار، إزدواج الرؤية، النطق بشكل غير واضح، نعاس وإسهال. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

❗ إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، يجب تناول جرعة دوائية حالاً عند تذكرك بذلك إلا إذا حان موعد تناول الجرعة الدوائية التالية. لا يجوز في أي حال من الأحوال تناول جرعتين دوائيتين معاً للتعويض عن الجرعة الدوائية المنسية! يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

❗ إذا توقفت عن تناول الدواء بشكل مفاجئ، أو بدون إستشارة الطبيب، فإن الخطورة لحدوث تشنجات تزداد.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب. إن التوقف عن العلاج، خفض الجرعة الدوائية للعلاج أو تبديل هذا الدواء بدواء آخر يجب أن يتم بشكل تدريجي لمدة أسبوع على الأقل وفقاً لتعليمات الطبيب (أنظر الفقرة ٤ في هذه النشرة - أعراض جانبية نتيجة التوقف المفاجئ عن العلاج).

• لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

• إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

يتبع

تتمه

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال جابابنتين تيفع قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

الأعراض الجانبية التي تقتضي إهتماماً خاصاً، في حال حدوث الأعراض الجانبية التالية راجع الطبيب حالاً:

- ردود فعل جلدية شديدة التي تشمل علامات مثل: حكة، طفح في الجلد، إحمرار و/ أو تساقط الشعر، إنتفاخ الشفتين والوجه، قد تكون هذه أعراضاً لرد فعل تحسسي شديد
 - ألم متواصل في البطن، غثيان وتقيؤات، قد تكون هذه أعراضاً لإلتهاب شديد في البنكرياس
 - قد يؤدي جابابنتين إلى رد فعل تحسسي شديد أو يشكل خطراً على الحياة الذي قد يؤثر على الجلد أو على أجزاء أخرى من الجسم مثل الكبد أو خلايا الدم. من الجائز أن تعاني من طفح كجزء من رد الفعل هذا. من الجائز أن يسبب لك رد الفعل التحسسي الشديد هذا المبيت في المستشفى أو أن تضطر إلى التوقف عن تناول جابابنتين (وفقاً لقرار الطبيب). إتصل حالاً بطبيبك إذا كنت تعاني من إحدى الأعراض التالية:
- طفح في الجلد
 - شرى
 - سخونة
 - إنتفاخ غير زائل في الغدد (مثل الغدد الليمفاوية)
 - إنتفاخ الشفتين واللسان
 - إصفرار الجلد أو الجزء الأبيض من العينين
 - ظهور كدمات أو أنزفة شاذة
 - إرهاق أو ضعف شديدين
 - ألم غير متوقع في العضلات
 - حدوث تلوثات بوتيرة عالية
- إذا كنت معالماً بالدليزة الدموية، راجع الطبيب عند ظهور آلام في العضلات و/ أو ضعف.
- ضعف في العضلات، حساسية أو ألم خاصة إذا ترافقت بشعور غير جيد أو بسخونة، من الجائز أن تكون علامات لتفكك غير إعتيادي للعضلات الأمر الذي يشكل خطراً على الحياة وقد يؤدي إلى مشاكل في الكلية. إضافة إلى ذلك من الجائز أن يكون بولك عديم اللون وأن تكون تغيرات في نتائج فحص الدم (ارتفاع في نسب كرياتين فوسفوكيناز في الدم) - راجع طبيبك حالاً!
- تفاقم التشنجات - راجع الطبيب حالاً!
- حركات لا إرادية، خاصة في الوجه، اللسان أو الأطراف - يجب مراجعة الطبيب حالاً!

أعراض جانبية شائعة جداً (قد تظهر لدى أكثر من ١ من بين ١٠ معالجين):

- تلوث فيروسي
- الميل إلى النوم، عدم التنسيق (ataxia)، دوار
- إرهاق، سخونة

أعراض جانبية شائعة (قد تظهر لدى أكثر من ١ من بين ١٠٠ معالج):

- إتهاب الرئتين، تلوثات في الطرق التنفسية، تلوثات في المسالك البولية، إتهاب الأذنين أو تلوثات من نوع آخر
- تعداد منخفض لخلايا الدم البيضاء
- فقدان الشهية للطعام (قهم)، زيادة الشهية للطعام
- إرتباك، صعوبات في التفكير، تغيرات في الحالة النفسية، إكتئاب، قلق، عصبية، غضب تجاه الآخرين - راجع الطبيب حالاً! (أنظر «تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء» في الفقرة ٢ في هذه النشرة)
- تشنجات، حركات تشنجية (حركات قفزية)، صعوبة في النطق، فقدان الذاكرة، رجفة، صعوبات في النوم، صداع، حساسية في الجلد، تدني الإحساس (خدر)، صعوبة في التنسيق، حركات شاذة في العينين، زيادة، ضعف أو فقدان المنعكسات - يجب مراجعة الطبيب حالاً! نسيان، قلة الحساسية للمس (فتور)
- تشوش الرؤية أو رؤية مزدوجة - يجب مراجعة الطبيب حالاً!
- دوار/ فيرتيغو - يجب مراجعة الطبيب حالاً!
- ضغط دم مرتفع، تورد أو توسع الأوعية الدموية
- صعوبات في التنفس - راجع طبيبك حالاً! إتهاب القصبات (إلتهاب البلعوم أو القصبات). ألم في الحنجرة - راجع الطبيب حالاً! سعال، جفاف في الأنف.
- تقيؤ، غثيان - يجب مراجعة الطبيب حالاً! مشاكل في الأسنان، إتهاب اللثة
- إسهال، ألم في البطن، صعوبات في الهضم، إمساك، غازات في الجهاز الهضمي، جفاف الحنجرة أو الفم
- إنتفاخ الوجه، كدمات، طفح، حكة، حب الشباب، وخز
- آلام في المفاصل. ألم في العضلات - راجع الطبيب حالاً! ألم في الظهر، تشنجات
- عجز جنسي لدى الرجال
- إنتفاخ الرجلين والذراعين، صعوبات في المشي، ضعف، ألم، الشعور بوعكة، أعراض شبيهة بالإنفلونزا
- إنخفاض في تعداد خلايا الدم البيضاء، زيادة في الوزن
- إصابة عرضية، كسر، كشط/ تآكل الجلد
- إضافة إلى ذلك، فقد كانت هناك بلاغات شائعة عن سلوك عدائي وحركات تشنجية وذلك في الأبحاث السريرية التي أجريت لدى الأطفال

أعراض جانبية غير شائعة (قد تظهر لدى أكثر من ١ من بين ١٠٠٠ معالج):

- رد فعل تحسسي مثل شرى
- تناقص في الحركة
- نبض سريع - يجب مراجعة الطبيب حالاً!
- نتائج شاذة لفحوصات مخبرية التي تدل على مشاكل في الكبد
- إختلالات نفسية
- سقوطات
- إرتفاع نسب السكر في الدم (لوحظ غالباً لدى مرضى السكري)

أعراض جانبية نادرة (قد تظهر لدى أكثر من ١ من بين ١٠٠٠٠ معالج):

- فقدان الوعي
 - إنخفاض نسبة السكر في الدم (غالباً لوحظ لدى مرضى السكري)
- منذ بدء تسويق جابابنتين بلغ عن الأعراض الجانبية التالية:**
- إنخفاض نسبة الصفائح الدموية في الدم (التي تساهم في عملية التخثر)
 - هذيان - يجب مراجعة الطبيب حالاً!
 - مشاكل لحركات شاذة مثل إنفتال، حركات تشنجية وصلابة
 - طنين في الأذنين
 - مجموعة أعراض جانبية التي يمكن أن تشمل إنتفاخ في الغدد الليمفاوية (كتل منفردة بارزة وصغيرة من تحت الجلد)، سخونة، طفح وإلتهاب في الكبد حيث تظهر هذه الأعراض معاً.
 - يرقان (إصفرار الجلد والعينين)، إتهاب الكبد
 - فشل كلوي شديد، تسرب البول
 - تضخم نسيج الثدي، تضخم الثديين
 - أعراض جانبية نتيجة توقف مفاجئ عن العلاج: قلق، صعوبات في النوم، غثيان، ألم، تعرق. ألم في الصدر - راجع الطبيب حالاً!
 - تذبذبات في نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري
 - علامات لتفكك ألياف العضل (rhabdomyolysis) - آلام مفاجئة في العضلات، حساسية أو ضعف في العضلات. يجب مراجعة الطبيب حالاً!
 - تغير في نتائج فحص الدم - إرتفاع في نسبة CPK (كرياتين فوسفوكيناز) في الدم، إنزيم يتحرر نتيجة إصابة أو ضرر في العضل - يجب مراجعة الطبيب حالاً!
 - متلازمة ستيفن - جونسون (قد تتجلى بحويصلات، تقشر أو حدوث نزف في الجلد المحيط للشففتين، العينين، الفم، الأنف والأعضاء التناسلية، علامات شبيهة بالإنفلونزا وسخونة مرتفعة) - يجب مراجعة الطبيب حالاً!
 - مشاكل في الأداء الوظيفي الجنسي ذلك يشمل عدم القدرة على بلوغ الإشباع الجنسي، قذف متأخر
 - إنخفاض في نسبة الصوديوم في الدم

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

٥) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/ أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة/ اللويحة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. في أي حالة لوجود شك عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء.
- يجب حفظ هذا الدواء في مكان جاف ومظلم، دون ٢٥ درجة مئوية. يحفظ في العلبة الأصلية.

٦) معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً: Microcrystalline cellulose, povidone, hydrogenated vegetable oil type 1, talc, crospovidone, HPMC 2910/hypromellose, titanium dioxide, macrogol/PEG 400.
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
جابابنتين تيفع ٦٠٠ ملغ
قرص بيضوي الشكل لونه أبيض - أوف وايت. في جانب واحد من القرص مطبوع «93» وفي الجانب الثاني مطبوع «7173».
- جابابنتين تيفع ٨٠٠ ملغ
قرص بيضوي الشكل لونه أبيض - أوف وايت. في جانب واحد من القرص مطبوع «93» وفي الجانب الثاني مطبوع «7174».
- يعبأ الدواء ضمن لويحات (بليستر)، بأحجام العلب الممكنة التالية: ٢٠٠، ١٠٠، ٩٠، ٦٠، ٥٠، ٣٠، ١٠ أقراص. من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العلب.
- صاحب الإمتياز وعنوانه، إسم المنتج وعنوانه:
تيفع للأدوية والمستحضرات الطبية م.ض.، ص.ب. ٣١٩٠، بيتح - تكفا.
- أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص ورُخص في ١٢/٢٠١٦
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
جابابنتين تيفع ٦٠٠ ملغ: ٣٢٩٧٩-٥٣-١٤٦
جابابنتين تيفع ٨٠٠ ملغ: ٣٢٩٨٠-٥٤-١٤٦
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.