

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصياغة
(مستحضرات) - 1986
يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

بنقوك™ 15 ملغ

بنقوك™ 30 ملغ

بنقوك™ 45 ملغ

المركب الفعال وكميته:
يحتوي كل قرص ذو تحرير مطول على
(على شكل هيميهيدرات) 15 ملغ
Upadacitinib (as hemihydrate) 15mg
يحتوي كل قرص ذو تحرير مطول على
(على شكل هيميهيدرات) 30 ملغ

يحتوي كل قرص ذو تحرير مطول على (على شكل هيميهيدرات) 45 ملг Upadacitinib (as hemihydrate) 45mg إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالها هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا تإضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي. وُصف هذا الدواء للعلاج من أجلك. لا تعطيه للأخرين

بالإضافة للنشرة، تتوفر للمستحضر رينفوك 'بطاقة الأمان للمتعالج'. تحتوي هذه البطاقة على معلومان، التي يتوجب عليك معرفتها، قبل بدء العلاج رينفوك والتصرف وفقها. يجب قراءة 'بطاقة المعلوم للمتعالج' والنشرة للمستهلك بتمعن قبل بدء إستعمال حفظ البطاقة لقراءتها بتمعن ثانية عند الحاجة.

- التهاب المفاصل الروماتيزي (Rheumatoid Arthritis) هو التهاب شديد في المفاصل، غالباً في اليدين والركبتين، وقد ينتشر إلى مفاصل أخرى. وهو مرض التهابي يصيب الأنسجة المحيطة بالمفاصل، مما يؤدي إلى تضخمها وفقدان حركة المفصل. علاجه يتضمن إيقاف الالتهاب، وتحسين القدرة على الحركة، وتحفيز إنتاج الكولاجين في المفاصل.
- التهاب المفاصل الصدفي (Psoriatic Arthritis) هو مرض ي聯属 psoriasis، حيث يظهر التهاب في المفاصل في الأشخاص الذين يعانون من psoriasis. علاجه يتضمن إيقاف الالتهاب، وتحسين القدرة على الحركة، وتحفيز إنتاج الكولاجين في المفاصل.

- تحمل العلاج. بالإمكان إستعمال رينقوك كعلاج منفرد ميتوتركسات (methotrexate).
- إلتهاب الفقار الرثياني (Ankylosing Spondylitis) الكبار، الذين قاسوا من إستجابة غير كافية لعلاج إعتيادي.
- إلتهاب الجلد التأتبي (Atopic Dermatitis) المتوسط لدى الكبار والمرأة في سن 12 سنة وما فوق والمُر جهازي.
- إلتهاب القولون التقرحي (Ulcerative Colitis) الشديد لدى الكبار، الذين قاسوا من استجابة غير كافية.

- الإستجابة أو عدم تحمل علاج تقليدي أو ببيولوجي سا
 - مرض كرون (Crohn's disease) المتوسط حتى الكبار، الذين قاسوا من إستجابة غير كافية، فقدان الإسن
 - تحمل علاج تقليدي أو ببيولوجي سابق.

الفصيلة العلاجية: من المثبتات الإنقائية لجهاز المناعة جانوس كيناز.

يعمل رينفوك عن طريق تقليل نشاط الإنزيم في الج "جانوس كيناز" الذي يقلل للالتهاب.

لديك، في تقليل الإرهاق، ويمكن أن يبطئ تضرر العظم في المفاصل لديك. هذه التأثيرات يمكن أن تسهل على نشط الإعتيادي وبذلك تؤدي إلى تحسين جودة حياتك.

إلتهاب المفاصل الصدفي

يستعمل رينثوك لعلاج إلتهاب المفاصل الصدفي لدى الكبار المفاصل الصدفي عبارة عن مرض يؤدي إلى إلتهاب المفاصل إذا كنت تعاني من إلتهاب مفاصل صدفي نشط، فمن الجيد البداية أدوية أخرى. إذا لم تؤثر هذه الأدوية بشكل كبير رينثوك مع أو بدون ميتوتريكسات لعلاج إلتهاب المفاصل

يمكن أن يساعد رينثوك في تقليل الألم، التصلب والانتفاخ لديك وما حولها، الألم والتصلب في العمود الفقري، الأصدفية والإرهاق ويمكن أن يبيطئ تضرر العظم والمفاصل لديك. هذه التأثيرات يمكن أن تسهل على نشاطي و بذلك تؤدي إلى تحسين جودة حياتك.

التهاب الفقار الرثياني

الجائز أن تتلقى في البداية أدوية أخرى. إذا لم تؤثر هذه أبداً، ستتلقى رينفوك لعلاج التهاب الفقار الرئيسي لدى يمكن أن يساعد رينفوك في تقليل آلام الظهر، التصلب والعمود الفقري. هذه التأثيرات يمكن أن تسهل على نشوب ذلك تؤدي إلى تحسين جودة حياتك.

إن التهاب القولون التقرحي عبارة عن مرض إلتهابي في الأمعاء يستعمل رينفوك لعلاج الكبار الذين يعانون من التهاب القولون.

الذين إستجابوا بشكل غير كافٍ أو لم يكن بإمكانهم تحمل يمكن أن يساعد رينفوك في تقليل علامات وأعراض المرض نزف في البراز، ألم في البطن، الإللاج وتكرار الذهاب إلى هذه التأثيرات يمكن أن تتيح ممارسة الأنشطة اليومية والتحفيض من الإنهاك.

يُمكن بإمكانهم تحمل علاج سابق.

قد يساعد رينفوك في تقليل علامات وأعراض المرض الإلحاد وتكرار الذهاب إلى المرحاض، ألم في البطن وإلتهاب الأمعاء لديك. يمكن أن تتيح هذه التأثيرات ممارسة الأنف بشكلٍ سليم والتخفيف من الإنهاك.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (اليرجي) لـ أفيپاداسيتنيب أو لكل واحد من

- الإضافية التي يحتويها الدواء (مُفصلة في الفقرة 6)
- وُجد لديك تلوث حاد (مثل التهاب الرئتين أو تلوث جلد)
- وُجد لديك مرض السل النشط (TB)
- وُجدت لديك مشاكل خطيرة في الكبد
- كنت حاملاً (أنظري فقرة "الحمل، الإرضاع والخصوص

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج وخلال العلاج بـ رينفوك إشك للطبيب إ

- وُجد لديك تلوث أو إذا تطورت لديك تلوثات بشكل

لطبيبك إذا تطورت لديك أعراض مثل سخونة، جرحاً بإرهاق أكثر من المعتاد أو مشاكل في الأسنان، لأن هذه تكون علامات لتلوث. يمكن أن يضعف رينثوك من على محاربة التلوثات وقد يفاقم تلوث حالي أو يزيد تطور تلوث جديد. إذا كنت تعاني من السكري أو كنت بـ وما فوق، قد تكون معرضاً لخطورة زائدة لتطور تلوث.

● عانيت من مرض السل أو كنت على إتصال قريب مع شخص بالسل. سيجري طبيبك فحص لمرض السل قبل بدء العلاج. ويمكن أن يكرر الفحص أثناء فترة العلاج.

- عانيت من تلوث الهرس النطيلي (القوباء المنطقية)، يمكن أن يسمح بعودة التلوث. إحك لطبيبك إذا وجد لديك على الجلد مع حويصلات، لأن هذه يمكن أن تكون على المنطقية.
- كان لديك ذات مرة إلتهاب الكبد (heatitis) من نوع تلقيت مؤخراً لقاحاً أو أنك مقدم على تلقي لقاح - ذلك الحبة غير موصى بها خلال إستعمال رينثوك.
- وجد لديك سرطان أو عانيت في الماضي من سرطاناً قمت بالتدخين في الماضي، لأنه سيتناقض مع الط

- لوحظ سرطان جلد ليس ميلانوما لدى متعالجين يتناولون شائعاً الطبيب أن يوصي بإجراء فحوص جلد بشكلٍ فتراتٍ تتراوح بين ستة وسبعين يوماً، فإذا تطورت خلال العلاج أو بعده جديدةً أو إذا تغير مظهر الآفات الحالية، إلحاحٌ للطبيب.
- وُجدت لديك، أو كانت لديك مشاكل في القلب، لأنَّه سُبُّ الطبيب فيما إذا كان رينفوك مناسب لك.
- كبدك لا يعمل كما يجب.
- وُجدت لديك في الماضي حلَّطات دموية في أوردة الد

الأوردة العميقه) أو في الرئتين (إنصمام رئوي) أو لـ زائدة في أن تتطور لديك خثرات دموية من هذا النوع إجتذب عملية جراحية كبيرة مؤخراً، إذا كنت تستعملين حمل هورمونية/علاج هورموني بديل، إذا شخص إختثر الدم لديك أو لدى أحد من أفراد عائلتك المقربين معك الطبيب فيما إذا كان رينثوك مناسب لك.

إحكِ لطبيبك، إذا تطور لديك ضيق مفاجئ في التنفس أو التنفس، ألم في الصدر أو ألم في أعلى الظهر، إنتفاخ في البطن، ألم في الراحتة، أو حساسية، أو احمرار أو تغير لامعنة

- في اليد، لأن هذه يمكن أن تكون علامات لخثرات دموية
- وُجِدَتْ لدِيك مشاكل في الكلى.
- وُجِدَ لدِيك ألم غير مُشخص في البطن، يوْجَدْ لدِيك حالياً إلتهاب الرتج (diverticulitis)، إلتهاب مؤلم لكيٰسات جدار الأمعاء لدِيك) أو تقرحات في المعدة أو في الأمعاء الدقيقة.
- إذا كنت تقاسي من إحدى الأعراض الجانبية الخطيرة فوراً إلى طبيبك:

- أعراض مثل طفح (شرى)، صعوبات في التنفس أو إنتفاخ اللسان أو الحنجرة، من الجائز أنك تقاسي من رد فعل بعض الأشخاص الذين تناولوا رينثوك قاسوا من ردود فعل خطيرة. إذا كنت تقاسي من إحدى الأعراض خلال العلاج، توقف عن تناول رينثوك وتوجه لتلقي مساعدة طبية فوري.
- آلام شديدة في البطن، خاصة تلك المصحوبة بسخونة، غثيان، الفحوص والمتابعة سوف تحتاج إلى إجراء فحوص دم قبل بدء العلاج بـ رينثوك.

تناول الدواء. ذلك لكي يتم فحص ما إذا كان هناك تغير في خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، تعداد منخفض لخلايا الدم العدلات أو قلة المفاويات)، نسبة عالية للشحوم في الدم أو نسب عالية من إنزيمات الكبد. الفحوص هي للتأكد من بـ رينفوك لا يسبب مشاكل.

لا يوصى بإستعمال رينفوك لدى أطفال دون عمر 12 مراهقين يزنون أقل من 30 كلغ الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتيزمي، إلا من القليلين.

الصدفي، إلتهاب العغار الرباعي، إلتهاب الفولون البفرحي كرون وهذا لأنه لم يتم بحثه لدى هذه الفئة العمرية.

التداخلات/ التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إلحاح الصيدلي عن ذلك. ذلك لأن أدوية معينة بإمكانها التقليل من العلاج بـ رينفوك أو قد تزيد خطورة حصول أعراض ج ● أدوية لعلاج التلوثات الفطرية (مثل إيتراكونازول، پـ أو ڤوريكونازول)

- أدوية لعلاج التلوثات الجرثومية (مثل كلاريثروميسين)
- أدوية لعلاج متلازمة كوشينغ (مثل كيتوكونازول)
- أدوية لعلاج مرض السل (مثل ريفامبيسين)
- أدوية لعلاج الإختلالات أو النوبات (مثل فينيتوئين)
- أدوية التي تؤثر على جهازك المناعي (مثل ميركапتوپورين، سيكلوسپورين وتاکرولیموس)
- أدوية التي قد تزيد من خطورة حدوث إنتقام (ion diverticulitis) في الجهاز الهضمي أو إلتهاب الرّتج مضاربة للالتهاب اللاستي وئدية (غالباً تستعمل لعلا-

- حالات إلتهاب العضلات أو المفاصل)، و/أو المواد أفيونية (تستعمل لعلاج الآلام الشديدة)، و/أو الكورتيكosteroids (تستعمل لعلاج حالات الإلتهاب)
- أدوية لعلاج السكري أو إذا وجد لديك سكري. من شأنه يقرر فيما إذا كنت بحاجة لكمية أقل من الدواء المضاد لتناولك أوپاداسيتینیب (upadacitinib).
- إذا كنت تتناول إحدى الأدوية من القائمة أعلاه أو إذا لاحظت للطبيب أو للصيدلي الخاص بك قبل تناول رينفوك.

الحمل، الإرضاع والخصوصية

الحمل
لا يجوز إستعمال رينثوك أثناء فترة الحمل.

الإرضاع
إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع، تحدي مع طبيبك
هذا الدواء. لا يجوز إستعمال رينثوك أثناء فترة الإرضاع
المعروف فيما إذا كان هذا الدواء ينتقل إلى حليب الأم.
سوف تقرران فيما إذا كنت سترضعن أو تستعملين رينثوك
بعمل الاثنين معاً

إلتهاب المفاصل الروماتيزمي، إلتهاب المفاصل الصدفي أو
إلتهاب الفقار الرثياني
الجرعة الدوائية الإعتيادية عادة هي 15 ملغ مرة واحدة في اليوم.

إلتهاب الجلد التأتبي
الكتار:

الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة 15 ملغ أو 30 ملغ مرة واحدة في اليوم، كما وصف من قبل طبيبك. من شأن الطبيب أن يقرر رفع أو خفض الجرعة الدوائية الخاصة بك وفقاً لعمل الدواء في الجسم.

المسنون:

إذا كان عمرك 65 سنة وما فوق، فإن الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة 15 ملغ مرة واحدة في اليوم.

المراهقون (أعمار 12-17 سنة) الذين يزنون 30 كلغ على الأقل:

الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة 15 ملغ مرة واحدة في اليوم.

إلتهاب القولون التقرحي

الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة 45 ملغ مرة في اليوم لمدة 8 أسابيع. من شأن طبيبك أن يتخذ قراراً بإطالة مدة الجرعة الدوائية الإبتدائية ذات 45 ملغ لمدة 8 أسابيع إضافية (بالإجمال 16 أسبوعاً).

بعد ذلك فإن الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة 15 ملغ أو 30 ملغ مرة في اليوم كعلاج طويل الأمد. من شأن الطبيب أن يقرر رفع أو خفض الجرعة الدوائية وفقاً لكيفية إستجابتك للدواء.

المسنون:

إذا كان عمرك 65 سنة وما فوق، فإن الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة 15 ملغ مرة في اليوم كعلاج طويل الأمد.

من شأن الطبيب أن يقرر خفض الجرعة الدوائية إذا وجدت لديك مشاكل في الكلى، أو إذا وصفت لك أدوية معينة أخرى.

مرض كرون

الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة 45 ملغ مرة في اليوم لمدة 12 أسبوعاً. بعد ذلك الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة 15 ملغ أو 30 ملغ مرة في اليوم كعلاج طويل الأمد. من شأن الطبيب أن يقرر رفع أو خفض الجرعة الدوائية وفقاً لكيفية إستجابتك للدواء.

المسنون:

إذا كنت بعمر 65 وما فوق، فإن الجرعة الدوائية هي عادة 15 ملغمرة في اليوم كعلاج طويل الأمد.

من شأن الطبيب أن يقرر خفض الجرعة الدوائية إذا وجدت لديك مشاكل في الكلى، أو إذا وصفت لك أدوية معينة أخرى.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها

طريقة التناول

• يجب بلع القرص كاملاً مع الماء. لا يجوز شطر، سحق، مضخ أو كسر القرص قبل بلعه لأن هذا قد يغير من كمية الدواء التي تدخل لجسمك.

• لمساعدتك على تذكر تناول رينثوك، تناوله كل يوم في نفس الوقت.

• بالإمكان تناول الأقراص مع أو بدون طعام.

• تجنب الطعام أو الشراب الذي يحتوي على الجرثيم فروت خلال فترة تناولك (أو علاجك بـ) رينثوك لأن ذلك قد يزيد من إحتمال ظهور أعراض جانبية، عن طريق زيادة كمية الدواء في جسمك.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية كبيرة فعلك التوجه لطبيبك. لربما تقاسي بعض من الأعراض الجانبية المفصلة في الفقرة 4.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

• إذا فوتت جرعة دوائية واحدة، فتناولها فوراً تذكر ذلك

• إذا نسيت الجرعة الدوائية الخاصة بك لمدة يوم كامل، قم بتنفويت الجرعة الدوائية التي خسرتها وتناول فقط جرعة دوائية واحدة في اليوم التالي كالمعتاد

• لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن القرص المنسي

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا تتوقف عن تناول رينثوك إلا إذا أمرك طبيبك بالتوقف عن تناوله.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء

والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع

النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلحة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال رينثوك قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهىش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعانى أي منها.

أعراض جانبية خطيرة

تحدث مع طبيبك أو توجه فوراً لتلقي مساعدة طبية إذا كنت تقاسي من أية علامات لـ:

• تلوث مثل القوباء المنطقية أو طفح جلدي مؤلم مع حويصلات (الهربيس النطيلي) - أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100

• تلوث في الرئتين (التهاب الرئتين)، الذي يامكانه أن يسبب ضيق في التنفس، سخونة وسعال مع بلغم - أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100

• تلوث في الدم (إنتان) - أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) -

أعراض تظهر لدى 10-11 مستعملين من بين 1,000

• فطريات في الفم (بقع بيضاء في الفم)

• إرتفاع في نسبة الدهون الثلاثية (نوع من الشحوم في الدم) كما يظهر في الفحوص

• إلتهاب الراتج (diverticulitis)، تطور إلتهاب مؤلم في جيوب صغيرة تتشكل في جدار أمعائك

• إنتفاخ في الجهاز الهضمي (تبق في الأمعاء)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) - أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة

• تلوثات في الحنجرة والأذن

• حب الشباب

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 10-11 مستعملين من بين 100

• سرطان جلد ليس ميلانوما

• سعال

• سخونة

• جروح البرد (الهربيس البسيط)

• غثيان

• إرتفاع في نسبة الإنزيم المسمى كرياتين كيناز، الذي يظهر في

فحوص الدم

• تعداد منخفض لخلايا الدم البيضاء، الذي يظهر في فحوص الدم

• إرتفاع نسب الكوليسترول (نوع من الشحوم في الدم) كما يظهر في

الفحوص

• ارتفاع في نسبة إنزيمات الكبد، الذي يظهر في فحوص الدم (علامة لمشاكل في الكبد)

• زيادة في الوزن

• إلتهاب (إنتفاخ) بصيلات الشعر

• إنفلونزا

• فقر الدم

• آلام في البطن

• إرهاق (شعور بإرهاق غير عادي وضعف)

• صداع

• شرى (urticaria)

• تلوث في المسالك البولية

• طفح

• الشعور بدوخة (فيرتيغو)

• دوران

• تلوث في الرئتين (bronchitis)

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000

• فطريات في الفم (بقع بيضاء في الفم)

• إرتفاع في نسبة الدهون الثلاثية (نوع من الشحوم في الدم) كما يظهر في

الفحوص

• إلتهاب الراتج (diverticulitis)، تطور إلتهاب مؤلم في جيوب

صغريرة تتشكل في جدار أمعائك

• إنتفاخ في الجهاز الهضمي (تبق في الأمعاء)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، عليك

إستشارة الطبيب.

إذا نسيت تناول الدواء؟

• إذا فوتت جرعة دوائية واحدة، فتناولها فوراً تذكر ذلك

• إذا نسيت الجرعة الدوائية التي خسرتها وتناول فقط جرعة دوائية واحدة في اليوم التالي كالمعتاد

• لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن القرص المنسي

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا تتوقف عن تناول رينثوك إلا إذا أمرك طبيبك بالتوقف عن تناوله.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء

والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع

النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلحة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(5) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أية وسائل.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.

• لا تنسى أن تخزن الدواء في مكان آمن و بعيداً عن الأطفال و/أو الحيوانات.