

Gazyva[®] 1000mg/40ml obinutuzumab Concentrate for solution for infusion

רופא/ה יקר/ה, רוקח/ת יקר/ה,

חברת רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ מבקשת להודיעכם על מספר עדכונים שבוצעו בעלון לרופא של התכשיר גזייבה.

בהודעה זו מצוינים רק עדכונים מהותיים ועדכונים אשר מהווים החמרה.

ההתוויות הרשומות לתכשיר בישראל:

Chronic Lymphocytic Leukaemia (CLL)

Gazyva, in combination with chlorambucil is indicated for the treatment of patients with previously untreated chronic lymphocytic Leukaemia (CLL).

Follicular Lymphoma (FL)

Gazyva in combination with chemotherapy, followed by Gazyva maintenance therapy in patients achieving a response, is indicated for the treatment of patients with previously untreated advanced follicular lymphoma.

Gazyva in combination with bendamustine followed by Gazyva monotherapy is indicated for the treatment of patients with follicular lymphoma (FL) who did not respond or who progressed during or up to 6 months after treatment with a rituximab-containing regimen.

למידע נוסף יש לעיין בעלון לרופא כפי שנשלח למשרד הבריאות.

העלון המעודכן נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות, וניתן לקבלו מודפס ע"י פנייה לבעל הרישום: רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ, ת.ד 6391 , הוד השרון 4524079 טלפון 09-9737777. כתובתנו באינטרנט: www.roche.co.il.

בברכה,

לביא עמי-עד רוקח ממונה בתאור צפרי-חגג מחלקת רישום

4

<u>עדכונים מהותיים בעלון לרופא</u>

בסעיף 6.6 Special precautions for disposal and other handling בסעיף

Instructions for dilution

Gazyva should be prepared by a healthcare professional using aseptic technique. Do not shake the vial. Use a sterile needle and syringe to prepare Gazyva.