

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) - 1986

Препарат отпускается без рецепта врача

САВИОР

Крем

Состав

Цетримид 0.5% w/w (Cetrimide 0.5% w/w)

Хлоргексидина гидрохлорид 0.1% w/w

(Chlorhexidine hydrochloride 0.1% w/w)

Для информации о неактивных компонентах и аллергенах в препарате см. раздел 2 - "Важная информация о некоторых ингредиентах препарата" и раздел 6 - "Дополнительная информация".

Внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию перед применением препарата. Данная инструкция содержит основные сведения о препарате. Если у Вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или к фармацевту. Применяйте препарат в соответствии с указаниями в разделе дозировки данной инструкции. Посоветуйтесь с фармацевтом, если Вы нуждаетесь в дополнительной информации. Следует обратиться к врачу в случае, если признаки заболевания (симптомы) ухудшаются или не улучшаются.

1. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ПРЕПАРАТ?

Применяется как средство первой помощи для внешней дезинфекции при небольших повреждениях, ранениях и ожогах.

Фармакологическая группа:

Дезинфицирующие средства (антисептики).

Хлоргексидина гидрохлорид это антисептик с широким спектром активности против микроорганизмов, включая бактерии, грибки и вирусы.

Цетримид обладает антисептическими свойствами.

2. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА

Не применяйте препарат, если:

известно о повышенной чувствительности к любому из компонентов препарата, особенно к хлоргексидина гидрохлориду, способному вызвать аллергическую реакцию. Препарат содержит цетостеариловый спирт, который может вызвать местную кожную реакцию (например, контактный дерматит).

Особые предостережения относительно применения препарата Савиор Крем:

- Только для наружного применения. Не глотать.
- Вы можете испытывать дискомфорт, если у Вас чувствительная кожа.
- Прекратите использование препарата, если у Вас возникло раздражение или другие нежелательные эффекты.
- Избегайте контакта с мозгом, мозговыми оболочками (оболочками, окружающими головной и спинной мозг) и средним ухом.
- Не используйте в области глаз, так как попадание в глаза может привести к повреждению зрения. При попадании препарата в глаза немедленно тщательно промойте их водой. В случае раздражения, покраснения, боли в глазах или нарушения зрения немедленно обратитесь к врачу. При использовании аналогичных препаратов, случайно попавших в глаз во время хирургических операций у пациентов, находящихся под общим наркозом, были отмечены серьезные случаи необратимого повреждения роговицы (повреждения поверхности глаза), при которых могла потребоваться ее трансплантация.
- Избегайте использования мыла или других анионных веществ вместе с препаратом Савиор Крем.

Взаимодействие препаратов:

Если Вы принимаете или принимали в последнее время другие препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Беременность, кормление грудью и фертильность:

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что беременны, или планируете забеременеть, посоветуйтесь с врачом или фармацевтом перед применением.

Беременность

Данные о применении во время беременности отсутствуют. Потенциальный риск для человека неизвестен, но, вероятно, он очень низок, поскольку хлоргексидина гидрохлорид и цетримид имеют низкую всасываемость при местном применении.

Кормление грудью

Неизвестно, выделяются ли хлоргексидина гидрохлорид и цетримид с грудным молоком.

Данные о применении в период кормления грудью отсутствуют. Однако маловероятно, что препарат выделяется с грудным молоком, поскольку всасываемость препарата низкая.

При нанесении крема Савиор Крем на область груди рекомендуется тщательно промыть эту область водой перед кормлением грудью.

Фертильность

Данные о влиянии на фертильность отсутствуют.

Важная информация о некоторых ингредиентах препарата:

Препарат содержит цетостеариловый спирт (cetostearyl alcohol), который может вызвать местную аллергическую реакцию кожи (такую, как контактный дерматит).

3. КАК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРЕПАРАТ?

Уточните у врача или фармацевта, если Вы не уверены относительно дозировки и режима лечения препаратом.

Способ применения:

- Только для наружного применения. Не глотать!
- Следует тщательно вымыть руки до и после использования.
- Промойте пораженный участок чистой водой и высушите.
- Аккуратно нанесите крем тонким слоем на пораженный участок пальцами или марлей.
- При небольших порезах и ранах, защитите пораженное место пластырем или повязкой.
- Ожоги: лучше оставить открытыми.
- При необходимости повторите процесс. Не используйте в области вокруг глаз. При попадании в глаза тщательно промойте их водой.

Если Ваше состояние не улучшилось в течение нескольких дней, следует обратиться к врачу.

Если Вы применили избыточную дозу или если ребенок случайно проглотил препарат, немедленно обратитесь к врачу или в приемное отделение больницы и возьмите с собой упаковку препарата.

Не принимайте препарат в темноте! Проверяйте этикетку и дозу каждый раз перед приемом препарата. При необходимости пользуйтесь очками.

Если у Вас имеются дополнительные вопросы относительно применения препарата, посоветуйтесь с врачом или с фармацевтом.

4. ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Как и при лечении любым препаратом, применение препарата Савиор Крем может вызывать побочные явления у части пациентов. Не тревожьтесь при чтении списка побочных явлений. Возможно, Вы не будете страдать ни одним из них.

Прекратите применение препарата и немедленно обратитесь к врачу, если:

Вы ощущаете одно из следующих, редких аллергических явлений: затруднения дыхания, отек лица, языка или горла, головокружение.

Другие возможные побочные эффекты, частота которых неизвестна:

- Аллергические реакции, такие, как дерматит (воспаление кожи), зуд, эритема (покраснение кожи), экзема, сыпь, крапивница, раздражение кожи и волдыри.
- Повреждение роговицы (повреждение поверхности глаза), постоянное повреждение глаз, включая постоянное нарушение зрения (вследствие случайного попадания в глаза во время хирургической операции в области головы у пациентов, находящихся под общим наркозом).

Если возникает побочное явление, если одно из побочных явлений становится более выраженным или же Вы страдаете от побочного явления, не упомянутого в инструкции, посоветуйтесь с врачом.

Отчет о побочных явлениях:

О побочных явлениях можно сообщить в Министерство Здравоохранения, нажав на ссылку "Отчет о побочных явлениях вследствие медикаментозного лечения", находящуюся на домашней странице сайта Министерства Здравоохранения (www.health.gov.il) и направляющую на форму онлайн, предназначенную для отчета о побочных явлениях, или перейдя по адресу: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ПРЕПАРАТ?

- Избегайте отравления! Этот препарат, как и любой другой, надлежит хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, и вне зоны их зрения, во избежание отравления. Не вызывайте рвоту без получения точных указаний врача.
- Не применяйте препарат после истечения срока его годности (exp. date), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.
- **Условия хранения: хранить данный препарат при температуре ниже +25°C.**
- **Можно использовать Савиор крем до 12 месяцев после первого открывания тюбика, но не позже истечения срока годности лекарства.**

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В дополнение к активным компонентам препарат также содержит:

Purified water, Cetostearyl alcohol, Mineral oil (paraffin oil).

Как выглядит препарат и каково содержимое упаковки:

Алюминиевый тюбик, содержащий белый гладкий крем однородной структуры, без комочков.

Тюбик содержит 10 грам.

Производитель и владелец лицензии и его адрес: Тева Израиль ЛТД, ул. Двора А Невиа 124, Тель Авив 6944020.

Откорректирована в сентябре 2024.

Регистрационный номер препарата в Государственном Реестре лекарственных средств Министерства Здравоохранения: 126.25.21373