

פינגולימוד טבע

כרטיס למטופלת

פינגולימוד טבע

כרטיס תזכורת למטופלת בנוגע להיריון
אנא קראי את המדריך למטופל ומטפל של **פינגולימוד טבע** שקיבלת מהרופא שלך. ניתן למצוא את המדריך גם בלינק הבא:
<https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/patient-safety-information>
לפני התחלת הטיפול בפינגולימוד טבע
לפני נטילת **פינגולימוד טבע**, ספרי לרופא שלך אם את בהיריון או מתכננת להרות. **פינגולימוד טבע** עלולה לפגוע בעובר. בתחילת הטיפול ולאחר מכן באופן קבוע, רופאך יידע אותך על הסיכון ועל הפעולות הנדרשות למעורר סיכון זה. יש לבצע בדיקת היריון.

הרופא שלך יידע אותך על הצורך באמצעי מניעה יעיל בזמן הטיפול ולמשך חודשיים לאחר הפסקתו. דברי עם רופאך על אמצעי המניעה היעילים ביותר הזמינים לך.
במהלך נטילת פינגולימוד טבע
במהלך הטיפול נשים צריכות להימנע מהיריון. מטופלות צריכות להשתמש באמצעי מניעה יעילים בזמן הטיפול ב**פינגולימוד טבע**. נשים צריכות להימנע מהיריון במהלך הטיפול ובמשך חודשיים לאחר הפסקת הטיפול. יש לחזור על בדיקת היריון במרווחי זמן מתאימים. הרופא שלך יספק לך ייעוץ קבוע לגבי הסיכונים החמורים של **פינגולימוד טבע** בעובר. אם תהי, או שאת מעוניינת להרות, דברי על כך עם רופאך, כיוון שיהיה עליך להפסיק את

הטיפול ב**פינגולימוד טבע**. במקרה של היריון הרופא שלך ייעץ לך. רופאך ייתן לך ייעוץ רפואי לגבי ההשפעות המזיקות של **פינגולימוד טבע** לעובר וייתן לך הערכה לגבי התוצאה האפשרית. יש לבצע בדיקת אולטרסאונד וייתכן שהטיפול ב**פינגולימוד טבע** יופסק.
לאחר הפסקת הטיפול בפינגולימוד טבע
עליך ליידע את הרופא שלך מיד אם את סבורה שמחלת הטרשת הנפוצה שלך מתמירה (כגון חולשה או שינוי ראייה) או שהבחנת בתסמינים חדשים לאחר הפסקת הטיפול ב**פינגולימוד טבע** עקב היריון. יש צורך להשתמש באמצעי מניעה יעילים במשך חודשיים לאחר הפסקת הטיפול ב**פינגולימוד טבע**, בגלל משך הזמן שלוקח

ל**פינגולימוד טבע** לצאת מהגוף. למידע נוסף, קראי את העלון לצרכן לפני השימוש.
דיווח תופעות לוואי:
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות:
/https://sideeffects.health.gov.il
כמו-כן, באפשרותך לדווח לבעל הרישום, טבע ישראל בע"מ דרך:
Safety.israel@teva.co.il
מסמך זה הינו בהתאם לדרישות משרד הבריאות, ותוכנו נבדק ואושר בדצמבר 2021. טבע ישראל בע"מ
דבורה הנביאה 124, תל אביב
מיקוד 03-6864000 טלפון: 03-6864000

Fingolimod Teva

Pregnancy specific patient reminder card BEFORE STARTING FINGOLIMOD TEVA TREATMENT

Please read the **Fingolimod Teva** Patient and Caregiver Guide provided by your doctor. The guide can also be found in the following link: <https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/patient-safety-information>
Before taking **Fingolimod Teva**, tell your doctor if you are pregnant or are planning to become pregnant.
Fingolimod Teva may harm your unborn baby. At treatment start and then regularly, your doctor will inform you about the risk and required actions to minimize the risk.
A pregnancy test should be conducted. Your doctor will inform you about the need for effective contraception while on treatment and for 2 months after discontinuation. Talk to your doctor

about the most effective contraception options available to you.
WHILE YOU ARE TAKING FINGOLIMOD TEVA
While on treatment women should not become pregnant. Patients should use effective contraception while taking **Fingolimod Teva**. Women should not become pregnant during treatment and for 2 months after discontinuing treatment. Pregnancy tests should be repeated at suitable intervals.
If you become pregnant or if you want to become pregnant, please discuss this with your doctor because **Fingolimod Teva** treatment should be discontinued.
In the event of a pregnancy your doctor will provide counselling.

Your doctor will give you medical advice regarding the harmful effects of **Fingolimod Teva** to the fetus and will provide an evaluation of the potential outcome.
An ultrasonography examination should be performed, and **Fingolimod Teva** treatment may be discontinued.
AFTER STOPPING FINGOLIMOD TEVA TREATMENT
Inform your doctor immediately if you believe your MS is getting worse (e.g. weakness or visual changes) or if you notice any new symptoms after stopping treatment with **Fingolimod Teva** due to pregnancy.
Effective contraception is needed for 2 months after stopping **Fingolimod Teva** treatment because of the length of time it takes for **Fingolimod Teva** to leave the body.
For further information, please read the Patient

Information Leaflet prior to use of the product. Reporting adverse events: Adverse events can be reported to the Ministry of Health via: <https://sideeffects.health.gov.il/> You may also report to the registration holder Teva Israel Ltd at: safety.israel@teva.co.il This document has been determined by the Ministry of Health and the content therefore has been checked and approved on December 2021 Teva Israel LTD
124 Dvora Hanev'ia St., Tel Aviv 6944020, Israel
Phone no.: 03-6864000

מנ הממכן איהא תבליג סאכב התסגיל, תייע ישראליל מ.צ. מן כאלל: [Safety.israel@teva.co.il](mailto:safety.israel@teva.co.il) יתואק זהא המסנד מע תעלימא וזרעה השכה, וקד תמ חכס מضمونه ומסאדעה עליה פי כאונון האול 2021. תייע ישראליל מ.צ., דפורא הנפינא 124, תל אביב הרמר البرידי 6944020, האתפ: 03-6864000

תייע הצרעה עלי הגנין, וסיקדמ לכ תקדירה בשאן הנתיגה התוקעה. יגב אגרה חכס אולטרסאונד (אואג פוק סוטייה), ומן הממכן אן יתמ וקפ העלג **פינגולימוד תייע**. **בעד התוקפ ען העלג פינגולימוד תייע** עליק תבליג טיבייק פורה אדא כנת תעקדין אן אסאנתק במרש התסלב המתעד קד תפאקמת (מתל חכע או תגייר פי רויה) או אדא לאחזת אעראס אגדידה בעד התוקפ ען העלג פינגולימוד תייע פי אעקב החמל. הנאלק חאה לאסתחאד וסאלל מנע חמל נאעה למדה שיהרין בעד התוקפ ען העלג **פינגולימוד תייע**, לאן זהה הקרה הלרמה לחרוג **פינגולימוד תייע** מן הגיס. למעולמא אציפיה, אקריני נשרה המסתלק קבל האסתחאד. **התבליג ען האעראס הגאנייה:** מן הממכן תבליג וזרעה השכה ען אעראס גאנייה מן כאלל: <https://sideeffects.health.gov.il/>

פקרה העלג ולמה שיהרין בעד וקפה. תחדיתי מע טיבייק חול וסאלל מנע החמל האקר נאעה ומתאה לכ. **כאלל פקרה תסאול פינגולימוד תייע** כאלל פקרה העלג, יגב עלי הנשא האמתאע ען החמל. יגב עלי מתלפיקא העלג אסתחאד וסאלל מנע חמל נאעה כאלל פקרה העלג **פינגולימוד תייע**. יגב עלי הנשא האמתאע ען החמל כאלל פקרה העלג ולמה שיהרין בעד וקפ העלג. יגב אגרה אגרה חכס החמל בפוארק זמניה מלאמה. סיפוק לכ טיבייק אסתחאה דאמה בשאן מאפר **פינגולימוד תייע** השדידה עלי הגנין. אדא חמלת, או אדא כנת תרגיבן בחמל, תחדיתי ען זהא האמר מע טיבייק, לאנה סייתויגב עליק וקפ העלג **פינגולימוד תייע**. פי חאל חסול החמל, סיקדמ לכ טיבייק האסתחאה. סיקדמ לכ טיבייק האסתחאה בשאן תאקירא **פינגולימוד**

פינגולימוד-תייע
בטאפה תזכיר למתלפיה העלג בשאן החמל
ירגי אן תקרני דליל מתלפי ומקדמ העלג האכס **פינגולימוד תייע** הזי תלפיה מן טיבייק. בלאמאן אגאד הדליל עלי הראית תאלי איהא:
<https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/patient-safety-information>
קבל אדע העלג פינגולימוד תייע
קבל תסאול **פינגולימוד תייע**, אעמי טיבייק אדא כנת חאמלא או תחטטין לחמל. מן הממכן אן יסביב **פינגולימוד תייע** הצרר לגנין. פי אדאיה העלג ובעד דלל בסורה דאמה, סיבלגכ טיבייק באחפורה וחחפורא האובג איתאעה לחד מן זהה החפורה. יגב אגרה חכס חמל. סיבלגכ טיבייק ען חאה לוסילה מנע חמל נאעה כאלל