

הודעה על החומרה (מידע רפואי) בעלון לרופא ובעלון לצרכן

תאריך 02.04.2014

שם תכשיר באנגלית ומספר הרישום

שם בעל הרישום CTS chemical industries Ltd.

טופס זה מיועד לפרוטת החומרות בלבד !

עלון לרופא :

החומרים המבוקשות		
פרק בעלון	טקסט נוכחי	טקסט חדש

עלון לצרכן :

החומרים המבוקשות		
פרק בעלון	טקסט נוכחי	טקסט חדש
קדמה		<p>התרופה מיועדת למוגרים ולילדים מעל גיל 12. מתחת לגיל 12 שנים יש לפנות לרופא. ילדים מתחת לגיל 9 שנים מומלץ להשתמש בבטיי X תרחיף. עילית להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. עילית לפנות אל הרופא-abs סימני המחלת (סימפטומים) מחקרים או אינם משתפרים לאחר ימיים. יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא אם השלשלול מלוויה בחום גבוה, מיד לחלו צלצלים באוזניים או איבוד שמיעה.</p>
אין להשתמש בתרופה אם:	<ul style="list-style-type: none"> • ידועה רגישות (אלרגיה) לאחד ממרכיבי התרופה או לסליציליטים. • הינך נוטל תכשיר אחר המכיל סליצילט וככל זה אספרין. • הינך מתחת לגיל 20 וסובל מחלות המלotta בחום כדוגמת שפעת האבעבועות רוח (מחשש לתסמנות ריא). • אתה סובל מכיב קיבה (אולקוז), דימומים, צואה דמיטית או שחורה. 	<p>אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה או לסליציליטים. אין להשתמש בצעירים מתחת לגיל 20 החולים במחלות ממולאות בחום כדוגמת שפעת האבעבועות רוח (מחשש לתסמנות ריא).</p>
اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:	<ul style="list-style-type: none"> • לפני התחלה הטיפול יש להיוועץ ברופא אם הינך בהריון או מניקה, הינך סובל או סובל בעבר מליקוי בתפקוד: מערכת הנשימה (כגון אסתמה), הצליה/מערכת השתן, מערכת העיכול (כגון כיב קיבה), מערכת 	<p>אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלה הטיפול: אם הינך בהריון או מניקה אם הינך סובל/ת או</p>

[127] נס הערתות: מעלון הרפוננס

<p>הדם (כגון קריישה וכו'), שגדון (גאוט), סוכרת, התיבשות (פה יבש, צמאן, שחחרורת), חום, צואה רירית.</p> <ul style="list-style-type: none"> אין להשתמש בתרופה זו לעיטים קרובות או תקופת ממושכת ביל' להיוועץ ברופא. אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי-עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. אין לתת לילדים או מתבגרים לטיפול בבחילות אשר סיבתן פגם במבנה מערכת העיכול. אין להשתמש בתרופה אם סימני המחלת (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר יומיים. אם בשימוש בתרופה מתרחשים שינויים בהתנהגות המלולים בבחילות ובתקאות, התיעץ עם הרופא כיוון שתסמינים אלו יכולם להיות סימן מוקדים לתסמונת ראי (Reye's syndrome, מחלת נדירה אף חמורה). 	<p>סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: מערכת הנשימה (כגון אסתמה) הכליה/מערכת השתן מערכת העיכול (כגון אלקלואידים) מערכת הדם (כגון קריישה וכו') שגדון (גאוט) סוכרת התיבשות (פה יבש, צמאן, שחחרורת), חום, צואה רירית</p> <p>ازהרות: אין לשנות ינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה אין להשתמש בתרופה זו לעיטים קרובות או תקופת ממושכת ביל' להיוועץ ברופא.</p> <p>אם הינך או ילך/תך רגיש/ה למזון כלשהו או למורפה כלשהי, במיוחד לאספירין וסליצילטים, עיר להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.</p> <p>אין להשתמש בתרופה לילדים ולמתבגרים עד גיל 20 שסובלים משפעת או אבעבועות רוח או שיש להם חום או אבדו הרבה נזלים.</p> <p>אין לתת ילדים או מתבגרים לטיפול בבחילות אשר סיבתן פגם במבנה מערכת העיכול.</p>	
<p>כמו בכל תרופה, השימוש בטבנ' X עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת המהמשכים. אל תיבהל למקרא רישמת תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבוי מארך אחת מהן.</p> <p>יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם מופיעים התסמינים הבאים:</p> <p>חולשה, עייפות, בעיות בשינה, טישוטוש ראייה, בלבול, אלצליים באוזניים או איבוד שמיעה, עיירה חמורה.</p> <p>יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא בהקדם האפשרי אם:</p>	<p>תופעות לוואי: בנוסך לפועלות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי.</p> <p>כגון: עיצרות, שלשול, בחילה, תרופה זו עלולה לגרום לשינוי בצבע הצואה או הלשון (לשחור).</p>	<p>תופעות לוואי: בנוסך לפועלות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי.</p> <p>כגון: עיצרות, שלשול, בחילה, תרופה זו עלולה לגרום לשינוי בצבע הצואה או הלשון (לשחור).</p>

- מופעים סימנים של מיןן יתר כגון נמנום, כאב ראש.
- במקורה של שלשול המלווה בחומם. תרופה זו עלולה לגרום לשינוי בצבע הצואאה או הלשון. בשינויים אלה אין מקום לדאגה. תופעות לוואי נוספות: עצירות, שלשול, בחילה .

בשינויים אלה אין מקום לדאגה

תופעות המחייבות

התיחסות מיוחדת:

סימנים של מיןן יתר

(نمונם, כאב ראש):

הפסיק הטיפול ופנה

לרופא

חולשה, עויתת, בעיות בנשימה, טשטוש ראייה, בלבול, אבוד שמיעת, עיררות חמורה: הפסיק הטיפול ופנה לרופא מיד !

בכל מקרה שבו הנך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא ציינו בעלן זה, או אם חל שינוי בהרגשות הכללית עליר להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובהות

בין תרופתיות ילדים

ותינוקות:

על ההורים לדוח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת כניתנת לצד/ה! ראה (1) לעיל תופעות לוואי ותגובהות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו.

מצ"ב העלוון, שבו מסומנות החומרות המבוקשות על רקע כאוב.
שינויים שאינם בגדר חומרות סומנו [בעלוון] בצבע שונה. יש לסמן רק תוכן מהותי ולא שינויים במיקום הטקסט.