

سينوكيلير® شراب

المواد الفعالة وكميتها في وحدة جرعة:

1 ml syrup contains: 417 mg extract (1:38.5) from 0.011 g of a mixture of gentian root, verbenae herb, common sorrel herb, elder flower, primula flower with calyx (1:3:3:3:3);
1. extracting agent: ethanol 59% (V/V), 2. - 4. extracting agent: purified water.

يحتوي كل 1 مل شراب: 417 مل غرام خلطي: حذار جينيان، نبات الحمامض، زهور البيلسان، زهور بنتة الربيع (1:3:3:3:3); 1. سائل الخلاصة: 59% إيثانول في الحجم، 4. سائل سائل الخلاصة: ماء.

للمعلومات العامة عن جزء من مركبات الدواء - انظر للبند 6.
للمعلومات العامة عن جزء من مركبات الدواء - انظر للبند 2.

اقرأ النشرة بأامان حتى نهايتها قبل إن تستعمل الدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء، إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

الدواء سينوكيلير® شراب مخصوص للبالغين والأطفال فوق جيل 12 سنة.
عليك تناول الدواء حسب التوجيهات في بدء العلاج من هذه النشرة.
إشتر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.
عليك التوجه إلى الطبيب إذا تفاقمت علامات المرض (أعراض) أو لم تتحسن بعد 14-7 يوماً من استعمال الدواء.

1. لاي غرض مخصوص الدواء؟
الدواء سينوكيلير® شراب مخصوص لتخفيف الأعراض في الأنف والجيوب الأنفية المصحوبة بالرشح، في البالغين وفي الأطفال فوق جيل 12 سنة.

تشمل هذه الأعراض: احتقان في الأنف، رشح الأنف، الم رأس وألم في الوجه في منطقة الجيوب الأنفية.

الفئة العلاجية: دواء نباتي لعلاج الرشح.

2. قبل استعمال الدواء:
لا يجوز استعمال الدواء:

- إذا كنت حساساً (أرجي) لواحد أو أكثر من المواد الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء. قائمة المركبات الإضافية مفصلة في البند 6.

- تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء:
• يجب التوجه إلى الطبيب إذا تفاقمت علامات المرض (أعراض) أو لم تتحسن بعد 14-7 يوماً من استعمال الدواء أو في حال تعاود وتنكر أعراض المرض.
- عليك التوجه إلى الطبيب إذا كنت تعاني من أعراض مثل: حرارة مرتفعة، نزيف من الأنف، الم حاد، إفرازات أنفية قوية، اصطرباب في الرؤبة، عدم تباين بين أجزاء الوجه أو في منطقة العينين، أو خدر في منطقة الوجه.

• إذا كنت تعاني من التهاب في المعدة (غازتينيس) أو حساسية معروفة في المسالك الهضمية، يجب تناول الدواء سينوكيلير® شراب بعد الوجبة سوية مع كأس من الماء.
الأطفال والمرأهقون: هذا الدواء غير مخصص للأطفال والمرأهقين تحت جيل 12 سنة، ذلك لأنه لا توجد معلومات بخصوص مامونية وجاعنة استعمال الدواء لدى الأطفال دون هذا الجيل.

إذا كنت تأخذ أو إذا أخذت في الأونة الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذية، آخر الطبيب أو الصيدلي بذلك، غير معروف عن تفاعلات بين الدواء سينوكيلير® شراب وبين أدوية أخرى.

استعمال الدواء والغذاء: يمكن تناول الدواء سينوكيلير® شراب مع الغذاء، مع الشراب، أو بدون أي صلة بالغذاء.
لمعلومات إضافية، انظر للنقطة 3 - "كيفية استعمال الدواء".

الحمل، التلقيح والتأثير على الحضوقة:
إذا كنت حاملاً، مرخصة، تطلبين أنك حامل أو تحظين للحمل، استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل تناول الدواء.
استعمال الدواء سينوكيلير® شراب أثناء الحمل أو الإرضاع يتم بتوجيه من الطبيب فقط، بعد تقدير الفائدة مقارنة بالمخاطر في هذه الحالات. بما أن الدواء سينوكيلير® شراب يحتوي على الكحول، يجب تفضيل استعمال الدواء سينوكيلير® أقراص أثناء الحمل أو الإرضاع، لا توجد معلومات كافية بخصوص تأثير الدواء على الخصوبة لدى البشر.
لمعلومات إضافية، انظر للنقطة 3 - "كيفية استعمال الدواء".

السيادة وتشغيل الماكينات: لا توجد تحذيرات أو تعليمات خاصة بخصوص استعمال الدواء سينوكيلير® شراب أثناء السيادة أو تشغيل الماكينات.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء:
يحتوي الدواء سينوكيلير® شراب على سائل المالتينول. يحتوي الدواء سينوكيلير® شراب على 8% كحول.
يحتوي هذا الدواء على 64 مل غرام كحول (الإيثanol) في كل 1 مل شراب، أي ما يعادل 68% كحول في الحجم.
الكمية القصوى من الكحول (الإيثanol) في الجرعة الواحدة من الشراب يحتم 7 مل تعادل 12 مل من البيرة (جعة) أو 5 مل من النبيذ. هذه الكمية الصغيرة من الإيثanol ليس لها أي تأثير ولا تتطلب عناية خاصة.

عليك استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء سينوكيلير® شراب إذا قيل لك من قبل طبيبك أنك تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة.

معلومنات لمرضى السكري: يحتوى 7 مل من سينوكيلير® شراب 5.5 غرام من سائل المالتينول، يعادل ما يقارب 0.35 وحدات تحويل للكربوهيدرات أو 12.65 سعرات حرارية.
قد يكون لسائل المالتينول تأثير ملئ خفيف.

3. كيفية استعمال الدواء؟
عليك الحصول مع الطبيب أو الصيدلي في حال لم تكن متاكداً بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر.
الجرعة المقيدة بشكل عام هي:

مجموع الجرعة اليومية	جرعة وحيدة بالمل (يجب التناول x 3 كل يوم)	جيـل
21 مل	7 مل	البالغين والأطفال من جيل 12 سنة وما فوق

لا يوجد تجاوز الجرعة الموصى بها.
في وظائف الكبد.

مدة العلاج: طالما لم تلتقط تعليمات أخرى من الطبيب، مدة العلاج بالدواء هي 14-7 يوماً.

طريقة التناول: يجب تناول الدواء سينوكلاير® شراب بمساعدة كأس القاس المرتفع 3 مرات في اليوم (صباخاً، فوراً وسأة) مباشراً للثوم. كلما تطلب الأمر، يمكن شرب القليل من سائل شرب (يفضل كأس ماء) وليس مشروب كحولي، بعد تناول الدواء.

إذا كانت لديك حساسية معرفية في جهاز الهضم، يوصى بتناول الدواء سينوكلاير® شراب بعد الوجبات.
يجب الحفظ قبل الاستعمال.

إذا تناولت جرعة مفرطة بالخطأ عليك اعلام طبيب، سيقرر هو إذا كانت هناك حاجة للتصرف بأي شكل من الانكماش. في حال الإفراط في الجرعة من الممكن أن تكون الأعراض الجانبية المفصلة في بند 4 أشد. إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المخصص، لا بحوزك تناول جرعة مضاعفة.خذ الجرعة التالية في الوقت المعتاد واستشر الصيدلي أو الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء: إيقاف العلاج عادة ما يكون غير ضار.

لا يجوز تناول أدوية في الظل! تحقق من الملصق والجرعة في كل مرة تتناول بها دواء. وضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أي استثناء إضافية فيما يتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كل آية دواء، قد تسبب استعمال سينوكلاير® شراب أعراضًا جانبية لدى جزء من المستخدمين.

لا تزغ عن قرآن قائمة الأعراض الجانبية، من الممكن أن لا تصاب بأي واحد منها.

إذا ظهر أحد الأعراض الجانبية المذكورة أدناه، يجب إيقاف استعمال الدواء سينوكلاير® شراب واستشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن. سيخدد الطبيب خطورة العرض الجانبي وسفرغر إذا كان من الضروري التصرف بأي شكل من الانكماش.

الأعراض الجانبية التي تتطلب انتباها خاصاً:

يجب إيقاف استعمال الدواء والتوجه فوراً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ عند ظهور أول علامة لرد فعل أرجي شديد الذي يتضمن بانتفاخ الشفتين، انتفاخ في اللسان، انتفاخ في الحقن وأو البلغم المصحوب بتضيق في مجرى التنفس (وذمة وعائية) ضيق تنفس وانتفاخ الوجه. شويع هذه الأعراض الجانبية غير معروفة.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) التي ظهرت لدى 1-10 مستخدمين للدواء من بين 1,000:
قلة راحة في جهاز الهضم (الم بطئ، غثيان).
أعراض حساسية في الجلد (طفح، أحمرار، حكة).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو عندما تتعارى من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن الت bliyg عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "الت bliyg عن اعراض جانبية عقب علاج دواني" الموجود في صفحة البيت في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الموجه لاستشارة الإنترنطية للت bliyg عن أعراض جانبية أو عن طريق الدخول للرابط: (<https://sideeffects.health.gov.il>).
بالإضافة، يمكن الت bliyg لشركة دكتور سموينيلوف استيراد وتسويق بعنوان البريد الإلكتروني:
drugsafety@drsamuuelov.co.il