

رينقوك™ 15 ملغ أقراص ذات تحرير مطّول

المُركب الفعال وكميته:

يحتوي كل قرص ذو تحرير مطّول على أوباداسيتنيب (على شكل هيميهيدرات) 15 ملغ Upadacitinib (as hemihydrate) 15 mg

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاجك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

بالإضافة للنشرة، تتوفّر للمستحضر رينقوك بطاقة معلومات حول الأمان للمتعالج. تحتوي هذه البطاقة على معلومات هامة عن الأمان، التي عليك معرفتها، قبل بدء العلاج وخلال العلاج بـ رينقوك والتصرف وفقها. يجب قراءة بطاقة المعلومات حول الأمان للمتعالج بتمعن والنشرة للمستهلك قبل بدء إستعمال المستحضر. يجب حفظ البطاقة لقراءتها بتمعن ثانية عند الحاجة.

1 لأي غرض مخصص الدواء؟

رينقوك مخصص لعلاج:

• إلتهاب المفاصل الروماتيزمي (Rheumatoid Arthritis) المتوسط حتى الشديد لدى الكبار، الذين قاسوا من إستجابة غير كافية لعلاج سابق بدواء واحد مضاد للروماتيزم أو أكثر من مجموعة DMARDs أو لم يكن بإمكانهم تحمل العلاج. بالإمكان إستعمال رينقوك كعلاج منفرد أو بمشاركة ميتوتريكسات (methotrexate).

• إلتهاب المفاصل الصدفي (Psoriatic Arthritis) لدى الكبار، الذين قاسوا من إستجابة غير كافية لعلاج سابق بدواء واحد مضاد للروماتيزم أو أكثر من مجموعة DMARDs أو لم يكن بإمكانهم تحمل العلاج. بالإمكان إستعمال رينقوك كعلاج منفرد أو بمشاركة ميتوتريكسات (methotrexate).

• إلتهاب الفقار الرثائي (Ankylosing Spondylitis) لدى الكبار، الذين قاسوا من إستجابة غير كافية لعلاج إعتيادي.

الفصيلة العلاجية: من المثبتات الإنقائية لجهاز المناعة، من مثبتات جانوس كيتاز. يعمل رينقوك عن طريق تقليل نشاط الإنزيم في الجسم المُسمى "جانوس كيتاز" الذي يساهم في تقليل الإلتهاب.

الإلتهاب المفاصل الروماتيزمي

يستعمل رينقوك لعلاج إلتهاب المفاصل الروماتيزمي لدى الكبار. إن إلتهاب المفاصل الروماتيزمي عبارة عن مرض الذي يؤدي إلى إلتهاب المفاصل والصدفية. إذا كنت تعاني من إلتهاب مفاصل روماتيزمي نشط، فمن الجائز أن تلتقي في البداية أدوية أخرى. إذا لم تؤثر هذه الأدوية بشكل كاف، ستلتقي رينقوك مع أو بدون ميتوتريكسات لعلاج إلتهاب المفاصل الروماتيزمي لديك.

يمكن أن يساعد رينقوك في تقليل الألم، التصلب وإنفاس المفاصل لديك وما حولها، الألم والتصلب في العمود الفقري، الآفات الجلدية الصدفية والإرهاق، ويمكن أن يبطئ تضرر العظم والغضروف في المفاصل لديك. هذه التأثيرات يمكن أن تسهل من النشاط اليومي الإعتيادي لديك وبذلك إلى تحسين جودة حياتك.

الإلتهاب الفقار الرثائي

يستعمل رينقوك لعلاج إلتهاب الفقار الرثائي لدى الكبار. إلتهاب الفقار الرثائي عبارة عن مرض الذي يؤدي إلى إلتهاب المفاصل والصدفية. إذا كنت تعاني من إلتهاب فقار رثائي نشط، فمن الجائز أن تلتقي في البداية أدوية أخرى. إذا لم تؤثر هذه الأدوية بشكل كاف، سوف تلتقي رينقوك لعلاج إلتهاب الفقار الرثائي لديك.

يمكن أن يساعد رينقوك في تقليل آلام الظهر، التصلب والإلتهاب في العمود الفقري. هذه التأثيرات يمكن أن تسهل من النشاط اليومي الخاص بك وبذلك إلى تحسين جودة حياتك.

2 قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً (اليرجي) لأوباداسيتنيب أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في الفقرة 6)

• كان لديك تلوث حاد (مثل إلتهاب الرئتين أو تلوث جلدي جرثومي)

• كان لديك مرض السل النشط (TB)

• كانت لديك مشاكل خطيرة في الكبد

• كنت حاملاً (أنظر في فقرة "الحمل، الإرضاع والخصوصية")

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج وخلال العلاج بـ رينقوك إحك للطبيب إذا:

• وُجد لديك تلوث (سخونة، تعرق، أو قشعريرة، ضيق في التنفس، جلد دافئ، أحمر أو مؤلم أو تقرحات على جسمك)، الشعور بالتعب، سعال، شعور بحرقان أثناء التبول أو تبول أكثر تواتراً من المعتاد، صداع شديد مع رقبة مُتصلبة)، أو إذا كان لديك ذات مرة تلوث متكرر - يمكن أن يقلل رينقوك من قدرة جسمك على محاربة التلوثات ولذلك قد يؤدي إلى تفاقم التلوث الحالي، أو قد يزيد الإحتمال لديك لتطور تلوث جديد

• عانيت من مرض السل أو كنت على إتصال قريب مع شخص مريض بالسل. سيجري طبيب الفحص لمرض السل قبل البدء بالعلاج بـ رينقوك ويمكن أن يكرر الفحص أثناء فترة العلاج

• عانيت من تلوث الهربي النطيلي (القوباء المنطقية)، لأن رينقوك يمكن أن يسمح بعودة التلوث. إحك لطبيبك إذا كان لديك طفح مؤلم على الجلد مع حويصلات، لأن هذه يمكن أن تكون علامات القوباء المنطقية

• كان لديك ذات مرة إلتهاب الكبد (hepatitis) من نوع B أو C

• تلقيت مؤخراً لقاحاً أو أنك مقدم على تلقي لقاح - وهذا لأن اللقاحات

• لديك سرطان - لأن طبيبك سيحتاج إلى أن يقرر فيما إذا لا يزال بإمكانك تلقي رينقوك لعلاج التلوثات الفطرية (مثل إيتراكونازول، بوساكونازول أو

• أدوية لعلاج التلوثات الجرثومية (مثل كلاريثروميسين)

• أدوية لعلاج متلازمة كوشينغ (مثل كيتوكونازول)

• أدوية لعلاج مرض السل (مثل ريفامبيسين)

• أدوية لعلاج الإختلاجات أو التعبات (مثل فينيتوئين)

• أدوية التي تؤثر على جهاز المناعة لديك (مثل أزاثيوبيرين، سيكلوسبورين وتاكروليموس)

إذا كنت تتناول إحدى الأدوية من القائمة أعلاه أو إذا لم تكن واثقاً، إحك للطبيب أو للصيدلي الخاص بك قبل تناول رينقوك.

الحمل، الإرضاع والخصوصية

لا يجوز إستعمال رينقوك أثناء فترة الحمل.

الإرضاع

إذا كنت مرضعة أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. ذلك لأن أدوية معينة بإمكانها التقليل من نجاعة العلاج بـ رينقوك أو قد تزيد خطورة حصول أعراض جانبية.

• أدوية لعلاج التلوثات الفطرية (مثل إيتراكونازول، بوساكونازول أو فوريكونازول)

• أدوية لعلاج التلوثات الجرثومية (مثل كلاريثروميسين)

• أدوية لعلاج متلازمة كوشينغ (مثل كيتوكونازول)

• أدوية لعلاج مرض السل (مثل ريفامبيسين)

• أدوية لعلاج الإختلاجات أو التعبات (مثل فينيتوئين)

• أدوية التي تؤثر على جهاز المناعة لديك (مثل أزاثيوبيرين، سيكلوسبورين وتاكروليموس)

إذا كنت تتناول إحدى الأدوية من القائمة أعلاه أو إذا لم تكن واثقاً، إحك للطبيب أو للصيدلي الخاص بك قبل تناول رينقوك.

الحمل

لا يجوز إستعمال رينقوك أثناء فترة الحمل.

الإرضاع

إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع، تحدثي مع طبيبك قبل تناول هذا الدواء. لا يجوز إستعمال رينقوك أثناء الإرضاع لأنه غير معروف إذا ما كان

هذا الدواء ينتقل لحليب الأم. أنت وطبيبك تقرران فيما إذا كنت سترضعين

أو تتناولين رينقوك. لا تقوّمي بعمل الإثنين معاً.

منع الحمل

إذا كنت إمرأة في سن الخصوبة، يتوجب عليك إستعمال وسائل ناجعة لمنع الحمل من أجل تجنب حصول حمل أثناء تناول رينثوكول لمدة 4 أسابيع على الأقل بعد جرعتك الدوائية الأخيرة من رينثوكول. إذا حملت خلال هذه الفترة، عليك التوجه مباشرة إلى طبيبك.

السيادة وإستعمال الماكنات

لا يوجد لـ رينثوكول تأثير على القدرة على السيادة وإستعمال الماكنات.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بالنسبة للجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. الجرعة الدوائية الإعتيادية عادة هي قرص واحد ذو 15 ملجم مرة واحدة في اليوم.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها

طريقة التناول

- يجب بلع القرص كاملاً مع الماء. لا يجوز شطر، سحق، مضغ أو كسر القرص قبل بلعه لأن هذا قد يغير من كمية الدواء التي تدخل لجسمك

- لمساعدةك على تذكر تناول رينثوكول، خذه كل يوم في نفس الوقت

- بالإمكان تناول الأقراص مع أو بدون طعام

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر على التوجّه لطبيبك. ربما ستقاومي بعضًا من الأعراض الجانبية المذكورة في الفقرة 4.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

- إذا فوتت جرعة دوائية واحدة، قم بتناولها فور تذكر ذلك

- إذا نسيت الجرعة الدوائية الخاصة بك لمدة يوم كامل، قم بتفويت الجرعة الدوائية التي خسرتها وتناول فقط جرعة دوائية واحدة في اليوم التالي كالمعتاد

- لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن القرص المنسي يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا يجوز التوقف عن تناول رينثوكول إلا إذا أعطاك الطبيب تعليمات للتوقف عن تناوله.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال رينثوكول قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهن من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

أعراض جانبية خطيرة

إحكام طبيبك أو توجّه فوراً لتلقي مساعدة طبية إذا كنت تقاسي من أية علامات للتلوث، مثل:

- القوباء المنطقية أو طفح جلدي مؤلم مع حويصلات (الهرپس النطاقي) - أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100

- تلوث في الرئتين (التهاب الرئتين)، الذي بإمكانه أن يسبب ضيق في التنفس، سخونة وسعال مع بلغم - أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000

أعراض جانبية أخرى

إحكام طبيبك إذا لاحظت إحدى الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) - أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة تلوثات في الحنجرة والأنف

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100

- سعال
- سخونة
- جروح البرد (الهرپس البسيط)
- غثيان

- ارتفاع في نسبة الإنزيم المُسمى كرياتين كيناز، الذي يظهر في فحوص الدم
- تعداد منخفض لخلايا الدم البيضاء، الذي يظهر في فحوص الدم (علامة لمشاكل في الكبد)
- زيادة في الوزن
- حب الشباب

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000

- فطريات في الفم (بقع بيضاء في الفم)
- ارتفاع نسب الدهون الثلاثية (نوع من الشحوم في الدم) كما يظهر في الفحوص

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبلیغ عن اعراض جانبية

بالإمكان التبلیغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلیغ عن اعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>

(5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روئية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس.

- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة الخارجية واللوحة (بليستر). يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر

- يجب التخزين بدرجة حرارة حتى 30 درجة مئوية

- يجب التخزين في اللوحة الأصلية (بليستر) للحماية من الرطوبة

- لا يجوز رمي أي دوائية إلى المجاري أو إلى القمامات المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة

164-29-36194

للمعلومات إضافية ولمركز برنامج الدعم

*6718

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

RIN APL TIK AUG21_CL_P3