

ميزيزن® 0.25 ملخ

أعراض مطالية

المادة الفعالة

سيپونيمود 0.25 ملخ في كل قرص مطلي
siponimod 0.25 mg (as siponimod fumaric acid)

ميزيزن® 2 ملخ

أعراض مطالية

ال المادة الفعالة

سيپونيمود 2 ملخ في كل قرص مطلي
siponimod 2 mg (as siponimod fumaric acid)

المادة الفعالة

الماء غير الفعال والمولادات الحساسية في المستحضر: أنظر الفقرة 2 البند "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ الشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء، تجتنبي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسلحة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء للعلاج من أجل، لا تتعطه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى لو بدا لك أن حاليهم الطبية مشابهة لحالتك.

1. لأي غرض مخصوص الدواء؟

ميزيزن مخصوص لعلاج الكبار الذين لديهم التصلب المتعدد (من المرض الناكس المتعدد (MS) بأشكاله المتكررة، بما في ذلك المرض الناكس المتعدد (RRMS)، Relapsing-Relapsing Multiple Sclerosis) ومتلازمة الضرسية (SPMS، Secondary Progressive) (Multiple Sclerosis).

الفصيلة العلاجية: مثبطات جهاز المناعة، مثبطات جهاز المناعة الإنقاذية

كيف يعمل الدواء؟

تنتمي المادة الفعالة، سيبونيمود، إلى مجموعة الأدوية المسماة معدلات المستقبل (S1P) - فوسفات (S1P) (sphingosine-1-phosphate (S1P) receptor modulators).

يُعرف مرض نشط للتصلب المتعدد الثنائي عندما تحدث ثوبات أو عندما تُظهر تنازع

فحص التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) وجود ثلمات إنتهاج.

يساعد ميزيزن في حماية الجهاز العصبي المركزي (CNS) من مهاجمة جهاز المناعة للجسم نفسه، وهو يقوم بذلك عن طريق:

- تقييد الحركة الحرة لجزء من خلايا الدم البيضاء (المسمى الخلايا الملفافية) في الجسم.

- حجب خلايا الدم البيضاء من الخلايا الملفافية من الوصول إلى الدماغ والمخ الشوكي. هكذا

ينخفض الضرب العصبي الناتج عن SPMS وتحتاج لذلك ميزيزن في إبطاء تأثيرات نشاط المرض (مثل تنازع العصبونات في الدماغ والثوبات).

2. قبل إستعمال الدواء إذا:

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• كنت حساساً (الرجي) لـ سيبونيمود، للفول السوداني، للصويا أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" وأيضاً "معلومات إضافية" في الفقرة 6).

• وجذ لديك مشكلة في الكبد. قد يُرغم طببك بإجراء فحوص دم لك لفحص وظائف كبدك قبل أن يصف لك ميزيزن.

• كانت لديك في الماضي مشكلة في الكبد. قد يستعمل سيبونيمود أثناء الحمل قد يُرغم طببك بإجراء فحوص دم لك لفحص وظائف الكبد في الكبد.

• أو تناولت أدوية أخرى مخصصة لاضطرابات نظم القلب، مثل أميدورون، بروکاتينام، كيندين أو سوتاول. قد يقر طببك أن أصف لك ميزيزن، لأنه قد يزيد من التأثير على عدم انتظام نظم القلب.

• أو دوبي مخصوص لاضطرابات نظم القلب، مثل ديلتيازيم أو فيراميل (الذان يتمتعان إلى مجموعة الأدوية التي تسمى حاجات قنوات الكالسيوم)، ديجوكسين أو إيفارابين. قد يوجه طببك إلى أخصائي القلب، لأنه قد تكون هناك حاجة إلى تغيير أدوبيتك، حتى إذا كان التفكك البطيء للدواء ينطبق على جاهزك، فإن تناول 5 أعراض من ميزيزن 0.25 ملخ في اليوم الخامس في فترة المعابر، وفق ما جاء أعلاه، يكون آمناً لك.

• لا يجوز تناول المقدار الدوائي الموصى به.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.

• إذا كنت تتناول أدوية أخرى مخصصة للقلب، يجب تناول القرص مع الماء.