

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) – 1986 г.

**Внимательно и полностью прочтите инструкцию
перед применением препарата.**

Формат данной инструкции установлен Министерством здравоохранения,
содержание проверено и утверждено.

МЕРФЕН – СПРЕЙ ДЛЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Спрей

Состав:

Каждый мл содержит:

Активные компоненты и их количество:

Benzoxonium chloride 1 мг
Chlorhexidine gluconate 18 мг

Неактивные компоненты:

Lauryldimethylamineoxide, Purified water

Лекарственная группа:

Benzoxonium chloride: антисептик –дезинфицирующее средство

Chlorhexidine gluconate: антисептик –дезинфицирующее средство

Показания:

Препарат предназначен для дезинфекции ран, порезов, царапин, легких ожогов и укусов насекомых.

Когда не следует пользоваться препаратом?

Противопоказано применение препарата при повышенной чувствительности к одному из его компонентов.
Противопоказано применение препарата в области глаз или рта.
Противопоказано применение препарата в среднем ухе, поэтому нельзя использовать его в случае перфорации барабанной перепонки.

Предостережения:

Не применяйте препарат часто или на протяжении длительного времени, не проконсультировавшись с врачом.

Если рана не заживет после 10-14 дней, либо если рана опухает, вызывает боль или повышение температуры, либо в случае кожной реакции, следует проконсультироваться с врачом.

Нельзя применять препарат для глаз или в районе глаз. В случае попадания в глаза промойте их водой.

Взаимодействие с другими препаратами:

Если Вы принимаете другой лекарственный препарат или недавно закончили лечение другим препаратом, сообщите об этом лечащему врачу в целях предотвращения опасности или неэффективности лечения, связанных с взаимодействием с другими лекарствами.

Беременность:

Можно пользоваться препаратом в малых количествах (на небольших ранах) в период беременности. В случае применения препарата в первой трети беременности или в случае длительного применения препарата, либо нанесения

его на большие участки, следует проконсультироваться с врачом.

Грудное кормление:

Можно пользоваться препаратом в малых количествах (на небольших ранах) во время кормления грудью, но не на груди.

Побочные эффекты:

Кроме желаемого эффекта препарата, во время его использования могут возникнуть следующие побочные эффекты: раздражение кожи (редко), крапивница (очень редко).

Побочные эффекты, требующие особого внимания:

Одышка, головокружение (анафилактическая реакция), отечность, в особенности лица и горла (очень редко): прекратите лечение и обратитесь к врачу.

При появлении побочных эффектов, не упомянутых в данной инструкции, либо в случае изменения в общем самочувствии следует немедленно обратиться к врачу.

Принятая дозировка при отсутствии других предписаний врача:

См. "Способ применения".

Не превышайте рекомендуемую дозировку.

Обратите внимание:

Не глотать! Препарат предназначен исключительно для наружного применения.

Не допускайте попадания препарата в глаза, на слизистые оболочки (например, рта или носа). В случае попадания в глаза хорошо промойте их водой.

Способ применения:

После очищения раны, брызгать раз или два в день непосредственно на обрабатываемый участок. После нанесения препарата дайте коже высохнуть перед тем, как накладывать повязку. Не накладывайте герметичную повязку на обработанный участок.

Препаратом можно пользоваться в любом положении, даже когда баллончик перевернут.

При первом применении препарата следует несколько разназать до появления спрея.

Не допустите отравления!

Это лекарство, как и любое другое, следует хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, во избежание отравления.

Если Вы приняли большую дозу, или если ребенок по ошибке проглотил это лекарство, немедленно обратитесь в приемный покой больницы, захватив с собой упаковку с лекарством.

Не вызывайте рвоту, не получив на это четких указаний врача!

Не принимайте лекарство в темноте! При каждом приеме лекарства, проверьте этикетку и дозировку.

При необходимости пользуйтесь очками.

Хранение:

Следует хранить при температуре ниже 25°C.

Даже при соблюдении рекомендуемых правил хранения, срок хранения лекарств ограничен. Пожалуйста, обратите внимание на дату истечения срока годности препарата! При возникновении сомнений проконсультируйтесь с фармацевтом, выдавшим препарат.

Не храните разные лекарства в одной упаковке.

Регистрационный номер препарата: 1216830135

Изготовитель: Випор Консьюмер Хелф, Вилар-Сюр-Глан, Швейцария

Владелец лицензии: Медитренд Шивук (2004), Бат-Ям, Киббуц Галиль Ям 4690500