

أكامول تيقع أقراص أكامول تيقع حبسولات

التركيب

كل قرص /حبسولة (حبة بشكل كبسولة) يحتوي:

پاراسيتامول 500 ملغ (Paracetamol 500 mg)

لمعلومات حول المركبات غير الفعالة ومولدات الحساسية أنظر الفقرة 2 - "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

هذا الدواء مخصص للكبار والأطفال من عمر 6 سنوات وما فوق. عليك تناول الدواء وفقاً للتعليمات في الفقرة 3 من هذه النشرة. **استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.**

يجب مراجعة الطبيب إذا إستمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمتم الأعراض أو لم تزول خلال 5 أيام على الرغم من إستعمال الدواء.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لتسكين الألم ولتخفيف السخونة الناتجة عن أسباب مختلفة، مثل صداع، آلام في الأسنان، رشح، إنفلونزا، آلام روماتيزمية (rheumatic) وآلام الدورة الشهرية.

الفصيلة العلاجية:

مسكن للألم وخافض للسخونة.

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- علمت بوجود حساسية لپاراسيتامول أو لكل واحد من مركبات الدواء الأخرى - أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية".

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

- إذا تطورت لديك في الماضي أعراض جانبية جلدية نتيجة تناول مستحضرات تحوي پاراسيتامول، فلا يجوز تناول مستحضرات تحتوي على پاراسيتامول، كي لا تحدث لك ثانية أعراض جلدية شديدة.
- يحوي المستحضر پاراسيتامول حيث قد يسبب ضرراً للكبد عندما:
 - يعطى بجرعة دوائية تزيد عن الموصى بها أو لفترة طويلة.
 - يتم شرب مشروبات كحولية أثناء العلاج.
 - يتم تناول أدوية إضافية تؤثر على نشاط الكبد.
- لا يجوز إستعمال هذا الدواء في أحيان متقاربة بدون إستشارة الطبيب.
- لا يجوز تناول أدوية إضافية لتخفيف السخونة وتسكين الألم أو أدوية للرشح دون إستشارة الطبيب أو الصيدلي، وذلك لمنع حصول فرط في الجرعة الدوائية أو التسمم بالپاراسيتامول.
- لا يجوز تناول أدوية إضافية من «عائلة أكامول» و/أو مستحضرات إضافية تحوي پاراسيتامول.
- يجب الإمتناع عن تناول جرعة دوائية عالية (وذلك ضمن الحدود الموصى بها) من هذا الدواء أثناء الصوم.

إحذ الطبيب قبل بدء العلاج إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من:

- حساسية لأي طعام أو لأي دواء
- مرض في الكبد أو خلل في وظيفة الكبد
- خلل في وظيفة الكلية
- الإدمان على الكحول
- يرقان

- إذا كنت في فترة الحمل أو في فترة الرضاعة

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحذ الطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

- مضادات تخثر الدم، مثلاً وارفارين.
- مستحضرات تخثر تشكل الإنزيمات في الكبد (مثلاً: ريفامپيسين، باربيتورات).
- أدوية للصرع - فبنتويتين، كاربامازيبين.
- مضادات الإلتهاب الالاستيروئيدية.
- ميتوكلوبراميد أو دوميبريدون (لعلاج الغثيان، التقيؤ ومشاكل هضمية إضافية).
- كلورامفينيكول (مضاد حيوي).
- بروبينسيد (لعلاج النقرس).
- كوليسيرامين (لتخفيض فائض الشحوم في الدم).
- فلوكلوكساسيلين (مضاد حيوي)، وذلك جراء وجود خطر جدي لحدوث اضطرابات في الدم وسوائل الجسم (حمض إستقلابي مع فعوة أنيونية كبيرة) التي تتطلب علاجاً طارئاً وقد تحدث خاصة في حالات تضرر الكلى بشكل خطير، إنتان الدم (حالة تكون فيها الجراثيم وسومها في الدم وتلحق الضرر بأعضاء الجسم)، سوء تغذية، إدمان مزمن على الكحول وذلك إذا تم إستعمال مقدار دوائي يومي أعظمي من الپاراسيتامول.

إستعمال پاراسيتامول وإستهلاك الكحول

لا يجوز إستهلاك الكحول أثناء العلاج ب پاراسيتامول بسبب زيادة الخطورة لحدوث ضرر للكبد.

الحمل والإرضاع

الحمل

إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة يجب إستشارة الطبيب قبل بدء إستعمال الدواء.

يجب تناول الجرعة الدوائية الأخفض والناجعة بالنسبة لك لتسكين الألم و/أو لخفض السخونة، للمدة الزمنية الأقصر الممكنة. إستشرى الطبيب إذا لم يحدث تخفيف للألم أو للسخونة أو إذا توجب عليك تناول الدواء في أوقات متوارة أكثر.

الإرضاع

تنتقل كميات قليلة من پاراسيتامول إلى حليب الأم. يجب إستشارة الطبيب قبل الإستعمال.

السياقة وإستعمال الماكينات

لا يؤثر پاراسيتامول على القدرة على السياقة أو على تشغيل الماكينات.

الإستعمال لدى الأطفال

هذا الدواء مخصص للكبار والأطفال فوق عمر 6 سنوات، أنظر الفقرة 3. على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كافة الأعراض الجانبية وكذلك عن كل دواء إضافي يعطى للطفل.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ صوديوم في القرص/الحبسولة ولذلك يعتبر "خالياً من الصوديوم".

3) كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالدواء.

الجرعة الدوائية الإعتيادية في حال عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب هي عادة:

كبار وأطفال من عمر 12 سنة وما فوق:

1-2 قرص/حبسولة كل 6 - 4 ساعات حسب الحاجة.

لا يجوز تجاوز جرعة دوائية قدرها 8 أقراص/حبسولات في 24 ساعة.

- إذا ظهر غثيان، إنفاخ، مغص في الوزن، فقدان الشهية للطعام وإصفرار العينين والجلد.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5 كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسهم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقفيظ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقاص تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين في مكان جاف، دون 25 درجة مئوية.

6 معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

أكامول يتيغ أقراص: Microcrystalline cellulose, Maize starch, Povidone, Croscarmellose sodium, Talc, Silica colloidal anhydrouse, Magnesium stearate.

أكامول يتيغ حبسولات:

Microcrystalline cellulose, Maize starch, Povidone, Croscarmellose sodium, Talc, Silica colloidal anhydrouse, Magnesium stearate.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

أكامول يتيغ أقراص:

قرص دائري بلون أبيض مع خط للشطر من جانب واحد. أكامول يتيغ أقراص ضمن عبوة بليستر (لويحة) تحتوي على 20، 30، 60 قرصاً.

من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العلب

أكامول يتيغ حبسولات:

قرص مطاول (حبسولة) بلون أبيض مع خط للشطر من كلا الجانبين. أكامول يتيغ حبسولات ضمن عبوة لويحة (بليستر) يحتوي على 20، 30، 40، 50، 60، 70 حبسولة.

من الجائز ألا تسوّق كافة أحجام العلب.

إسم المنتج وصاحب الإمتياز وعنوانه:

يتيغ إسرائيل م.ح.م، شارع دفور هنتفيك 12، تل أبيب 6944020 تم إعداد هذه النشرة في تشرين الأول 2024

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

أكامول يتيغ أقراص: أكامول يتيغ حبسولات:

176.60.36645 176.61.37219

من أجل سهولة وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

أطفال بعمر 12 - 9 سنة:

1- 1/2 قرص/حبسولة كل 6 - 4 ساعات حسب الحاجة.

لا يجوز تجاوز جرعة دوائية قدرها 4 أقراص/حبسولات في 24 ساعة (2 غرام في 24 ساعة).

أطفال بعمر 9-6 سنوات:

1/2 قرص/حبسولة كل 4-6 ساعات حسب الحاجة.

لا يجوز تجاوز جرعة دوائية قدرها 3 أقراص/حبسولات في 24 ساعة (1.5 غرام في 24 ساعة).

لا يجوز إعطاء قرص/حبسولة لأطفال دون عمر 6 سنوات.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

عليك مراجعة الطبيب إذا إستمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا لم تزول الأعراض خلال 5 أيام على الرغم من إستعمال الدواء.

طريقة الإستعمال

لا يجوز المضغ أو السحق! بالإمكان شطر الأقراص/حبسولات في خط الشطر.

يجب بلع الدواء مع قليل من الماء.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، يجب التوجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء. لا تسبب التقفيظ بدون تعليمات واضحة من الطبيب! حتى لو كنت تشعر بحالة جيدة، فإن العلاج الفوري هو ضروري، بسبب خطورة تطور ضرر خطير للكبد، الأعراض الجانبية يمكن أن تكون غثيان وتقيؤ، إسهال، فقدان الشهية للطعام، آلام في البطن، إنتفاخ، تعرق زائد، ألم أو حساسية في أعلى البطن ومن الجائز أن هذه الأعراض لا تعكس خطورة الضرر الحاصل للكبد.

لا تتناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا فرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4 الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أكامول يتيغ قد يسبب أعراضاً جانبية مثل دوار، لدى قسم من المستعملين. لا تندهدش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

قد تكون الأعراض الجانبية خطيرة أكثر لدى المسنين.

أعراض جانبية خطيرة:

يجب التوقف عن العلاج ومراجعة الطبيب حالاً:

- إذا ظهرت ردود فعل تحسسية شديدة مثل طفح وحكة، إنتفاخ الأظفار، الوجه، الشفتين، اللسان، الحنجرة الأمر الذي قد يسبب صعوبات في التنفس أو البلع.
- إذا ظهرت في أحيان نادرة، أمراض جلدية شديدة حيث أن علاماتها يمكن أن تكون: إحمرار، طفح، حويصلات، إصابة جلدية واسعة. أعراض جانبية جلدية شديدة قد تظهر أيضاً حتى لو تناولت في الماضي مستحضرات تحوي المركب الفعال پاراسيتامول بدون أي مشكلة. إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية، يجب التوقف عن العلاج ومراجعة الطبيب حالاً.
- إذا ظهرت علامات لتغيرات في جهاز مثل: أنزفة، سهولة ظهور الكدمات (أنزفة دموية)، إرهاب مستمر، تطور لإلتهابات بسهولة كبيرة (مثلاً آلام في الحنجرة) نتيجة إنخفاض خطير في عدد خلايا الدم البيضاء.
- إذا ظهر ضيق في التنفس (نادر).
- إذا ظهرت مشاكل في التنفس، من المرجح أكثر أن تحدث إذا قاسيت في الماضي من مشاكل في التنفس عند تناول مسكنات آلام أخرى مثل إيبوبروفين وأسبيرين.