

עלון לצרכן לפי תקנות הרווחהים (תקשיירם) התשמ"ג- 1986 התרופה משוקקת ללא מושם ורופה

סינוקלייר® סירופ

החומרים הפעילים וכמותם ביחידת מינון:

1 ml syrup contains: 417 mg extract (1:38.5) from 0.011 g of a mixture of gentian root, verbena herb, common sorrel herb, elder flower, primula flower with calyx (1:3:3:3:3); 1. extracting agent: ethanol 59% (V/V), 2. - 4. extracting agent: purified water.

מ"ל סירופ מכליל: 417 מ"ג מיצוי (1:38.5) המופק מ 0.011 גרם תערובת: שורש גנטיאן, צמח החומפה, צמח הסרבל, פרחי סמברגו שחור, פרחי בכור האביב (1:3:3:3:3); 1. נוזל המיצוי: 59% אתנול בפחמן, 2. - 4. נוזל המיצוי: מים.

לרשימת כל החמורים הבוטניים פעילים ואלרגניים בתרופה – ראה סעיף 6.
לomidur חשוב על חלק המרכיבים של התרופה – ראה סעיף 2.

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרטם תשתמש בתרופה.
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נסופות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה סינוקלייר® סירופ מיועדת למבוגרים ולילדים מעל גיל 12 שנים.
עלך ליטול את התרופה על פי ההוראות בסוף המינון בעلون זה.
היויעץ בזוק אם גור קזק למידע נסוף.
עליך לפנות לרופא אם תסמי כי מחלת (סימפטומים) מחקרים או אם משתפרים לאחר 14-7
ימים של שימוש בתרופה.

1. מה מיועדת התרופה?

התרופה סינוקלייר® סירופ מיועדת להקלת תסמיינים באף ובסינוסים המלווים להצטננות, במוגרומים ובילדים מעל גיל 12 שנים.

הסימנים האלה כוללים: גודש כף, נזהת, כאב בראש וכואב בפונס באזור הסינוסים.

কুকুজা ত্রিপুতি: ত্রিপুতি চমচিত লে টিপুল হাত্তেন্নত।

2. לפני השימוש בתרופה:

• אם אתה רגיש (אלרגי) לאחד או יותר מהחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הננספים לאין שימוש בתרופה.

אזורות מיוחדות הנוגעות בשימוש בתרופה:

- עליך לפנות לרופא אם תסמי כי מחלת (סימפטומים) מחקרים או אין משתפרים לאחר 7-14 ימים של שימוש בתרופה או במידה ותסמייני המחלת חזרדים ונשימים.
- עליך לפנות לרופא אם אתה חווה תסמיינים כדוגמת: חום גבוה, דימום מהחר, כאב חד, הפרשה דלקתית מוגלאת, הפעעה בראייה, אסימטריה בין חלקי הגוף או באזורי העיניים, או חסור תחושה באזורי הפנים.
- אם אתה סובל מללקת בלבב (סוטיטיס) או רגשות ידועה בדרכי העיכול, יש ליטול את התרופה סינוקלייר® סירופ לאחר האורורה בידך עם כוס מים.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק אם הרופא או הרוקח במידה ואינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
הריון המקבול בذرר כל הבא:

ס"ה"כ מנתה יומיית	מנת בודדת במ"ל (יש ליטול x 3 מד' יומם)	גיל	מבוגרים וילדים מגיל 12 שנים ומעלה
21 מ"ל	7 מ"ל	21	מבוגרים וילדים מגיל 12 שנים ומעלה

אין לעבר על המנה המומלצת.
אין מידע בוגע למין המודיק בחולים הסובלים مليקי בתפקודי הכליה או מהפרעה בתפקודי הכבב.

אין לעבר על המנה המומלצת.
אין מידע בוגע למין המודיק בחולים הסובלים مليקי בתפקודי הכליה או מהפרעה בתפקודי הכבב.

מישר הטיפול: ככל שלא קיבלת הנחיה אחרית מהרופא, מישר הטיפול בתרופה הינו 14-7 ימים. יש לפופות לרופא באם תסמיין המחלה (סימפטומים) מחקרים או אין מושג משליפים לאחר 14-7 ימים.

טורת הגנתילה: טורף בעזרת כסית המדידה המצוירת 3 פעמיים (בcock, צראים ורב) שיורט לפה. ככל שנדרש, ניתן לשנות מעט נזול שתיה (עדיף כוס ימים) ולא משקה אלכוהול, לאחר רטילת התרופה.

אם של רגשות ידועה במערכת העיכול, ממלץ ליטול את התרופה סינקליר[®] סיורף לאחר הארכוחות. יש לנער לפני השימוש.

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעליה! תרופה זו וככל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידים של ילדים / ואו תינוקות ועל ידי כך מנען העלה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת של הרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התופה (date. exp) המופיע על גבי אריזת הקרטון או הקבקוק. תאריך התופה מתיחה ליום האחרון של אותו חודש. תנאי אחסון: אין לאחסן מעל 30°C. חמ"ד מך לאחר פתיחה ראשונה: 6 חודשים.

תנאי אחסון לאחר פתיחה ראשונה: אין לאחסן מעל 30°C.

6. מידע נוספת

נסופ על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם את החומרים הבאים: Liquid maltitol, cherry flavour

כיצד נראית התרופה ומה תוכן הארייה: התרופה סינקליר[®] סיורף ניראית כנוזל שוקו וסמייך בעבוק חום בהרי.

בעת האחסון תתקנן הצבעות חלקיים ועכירות התמיסה. אין לクリ השפעה על עליות התרופה.

גודל הארייה: התרופה סינקליר[®] סיורף מספקת באריזת קרטון המכילה בקבוק צוכית בונפה 100 מ"ל בבעוק חום בצירוף כויסת מדידה.

בעל הרישום ובאונ': דר סמואלוב יבוא ושיווק בע"מ, ת.ד. 2486, רעננה 4365007, טלפונ: 09-7483769, כתובת מייל: info@drsamuelov.co.il, ייצר: בונרויקה אס.אי., רחוב קרנסטיטינגר 11-15, נימרקט 92318, גרמניה.

אושר בדצמבר 2022

מספר רישום התרופה בנקוק התרופות הממלכתי בממשרד הבריאות: 171-01-34683-00
שם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה: הפסקת הטיפול בדרך כלל אינה מזיקה.

אם ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה **בכל פעע** שהינך נוטל תרופה. הרוכב משקפיים אם הינך דזק להם. אם יש לך שאלות מסווג ב绷ג'ו לשימוש בתרופה, הייעוץ לרופא או ברוקה.

4. תופעות לוואי

כמו כל תרופה, השימוש בסינקליר[®] סיורף עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבטל למטריא רשותת תופעות הלואוי, תיכון וללא סובל מאף אחת מהן. אם הופעה אחת מטופעות לוואי הרשותת להלן, יש להפסיק את השימוש בתרופה סינקליר[®] סיורף ולהווער רפואי בהקדם האפשרי. הרופא יקבע את חומרת התופעת הלואוי ויחילט האם נחוץ לפעול באופן כלשהו.

טיפול לוואי הדורשנות שומת לב מיוחדת: יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא או לחדר מין בהופעתה הסימן הראשון של מגביה אלרגית ריריה המתאפיינת בהפחתה שפחתית, נזיפות בלבשן, נזיפות בלבשן, נזיפות בלבשן מלואה בהירות של דרכי הנשימה (אנגיידמתה), קוצר נשימה ונפיחות בפנים. השיכחות של תופעות לוואי דרשו טיפולם הלואוי אינו דינמי.

תופעות לוואי שאין שכיחות (uncommon) המופיעות ב- 1-10 משתמשים בתרופה מתרור: 1,000 חסור נוחות במערכת העיכול (כך בתsun).
חוואר נוחות במערכת העיכול (כך בתsun).