

## **نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986**

يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

# **سوليفيناسين تيقيع 5 ملغ أقراص**

## **التركيب**

يحتوي كل قرص على:

سوليفيناسين سوكسينات 5 ملغ  
(Solifenacin Succinate 5 mg)

# **سوليفيناسين تيقيع 10 ملغ أقراص**

## **التركيب**

يحتوي كل قرص على:

سوليفيناسين سوكسينات 10 ملغ  
(Solifenacin Succinate 10 mg)

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر  
- انظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات  
الدواء" والفقرة 6 - "معلومات إضافية".

يقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك  
للنوع. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن  
الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، توجه للطبيب  
أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين،  
 فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم/حالتهم  
الصحية مشابهة.

لا يجوز إستعمال الدواء لدى أطفال ومرأهقين دون  
عمر 18 سنة.

## **1) لأي غرض مخصص الدواء؟**

الدواء مخصص لعلاج قلة السيطرة على التبول و/أو  
في حالات زيادة التواتر والإلحاح على التبول لدى  
مرضى لديهم نشاط مفرط للمثانة البولية.

**الفصيلة العلاجية:** من مضادات الفعل الكوليوني.

## **2) قبل إستعمال الدواء**

### **لا يجوز إستعمال الدواء:**

- إذا كنت حساساً (أليرجي) لـ سوليفيناسين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء.
- في حالة إحتباس البول، إضطرابات خطيرة في الجهاز الهضمي (تضخم القولون السمي)، الوهن العضلي الوبيل (ضعف عضلي خطير)، ضغط داخل العين الذي يتزافق بضعف في الرؤية (چلوكوما).
- لدى مرضى الكلى المتعالجين بالدياليزا، ولدى مرضى لديهم قصور كبدي خطير.
- لدى مرضى لديهم مرض كلوي خطير أو لديهم مرض كبدي متوسط الذين يخضعون للعلاج في نفس الوقت بدواء آخر يؤدي إلى إنخفاض في طرح السوليفيناسين من الجسم، مثلًا كيتوكونازول.

**تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء**

قبل العلاج بـ سوليفيناسين تيقيع، إحك للطبيب إذا:  
وجدت لديك مشكلة في التبول (إنسداد جزئي)، تعاني من إمساك، معرضًا للخطورة حدوث تباطؤ في نشاط الجهاز الهضمي (حرکية المعدة والأمعاء)، تعاني من مرض كلوي حاد، تعاني من مرض كبدي متوسط، تعاني من فتق حجابي أو حرقان، تعاني من إضطراب في الجهاز العصبي (اعتلال عصبي مستقل).

### **الأطفال والمرأهقيون**

سوليفيناسين تيقيع لا يُستطب به لإستعمال لدى الأطفال والمرأهقين دون عمر 18 سنة.

### **التدخلات/التفاعلات بين الأدوية**

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

- أدوية أخرى مضادة للفعل الكوليوني - قد يزيد هذا الأمر من الأعراض الجانبية للكلا الدوائين.
- أدوية كوليnergic المفعول - قد تضعف من تأثير سوليفيناسين تيقيع.
- ميتوكلوپراميد، سيساپريد التي من المفترض أن تؤدي إلى أن يعمل الجهاز الهضمي بشكل أسرع - قد يعرقل سوليفيناسين من عملها.
- كيتوكونازول، ريتونافير، نيلفينافير، إيتراكونازول، فيрапاميل، ديلتيازم - تؤدي إلى تدلي في وتيرة طرح سوليفيناسين من الجسم.
- ريفاميبisin، فينيتوئين، كاربامازيبين - قد تؤدي إلى زيادة في وتيرة طرح سوليفيناسين من الجسم.
- بيسفوسفونات - قد تؤدي إلى حدوث إلتهاب في المريء أو إلى تفاقمه.

### **إستعمال الدواء والطعام**

بإلمكان تناول الدواء مع أو بدون طعام.

### **الحمل، الإرضاع والخصوبة**

يجب إستشارة الطبيب.

لا يجوز إستعمال سوليفيناسين تيقيع في فترة الحمل إلا إذا اتخذ الطبيب قراراً مغايراً.

لا يجوز الإرضاع خلال فترة إستعمال سوليفيناسين تيقيع لأن الدواء قد ينتقل إلى حليب الأم.

### **السيارة وإستعمال الماكنات**

إن إستعمال هذا الدواء قد يضعف من اليقظة و/أو يؤدي إلى تشوش في الرؤية وبالتالي يجب توخي الحذر عند سيارة المركبة، عند تشغيل ماكنات خطرة وفي أي نشاط يتطلب الياقة.

### **معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء**

يحتوي هذا الدواء على لكتوز. إذا علمت بوجود عدم تحمل لسكريات معينة، فيجب إستشارة الطبيب قبل تناول الدواء.

**3) كيفية إستعمال الدواء؟**

يجب إستعمال الدواء دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالدواء.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة:

قرص واحد من عيار 5 أو 10 ملغ للليوم. تحدد الجرعة الدوائية بشكل فردي من قبل الطبيب.

يُفضل تناول الدواء في نفس الساعة من كل يوم.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

يجب بلع الدواء بشكله الكامل مع الماء.

**السحق/الشطر/المضغ:** لا يجوز الشطر (لا يتوفّر خط للشطر). لا تتوفر معلومات عن مضغ أو هرس القرص.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

أعراض جانبية لف्रط الجرعة الدوائية: صداع، جفاف في الفم، دوار، تشوش الرؤية، نعاس، هذيان، إنفعال مفرط، إختلالات، صعوبات في التنفس، تسارع ضربات القلب، توسيع الحدقتين، إحتباس البول.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المخصص، لا يجوز تناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت المعتمد وإستشر الطبيب.

يجب المواطبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حاليك الصحية. إن التوقف عن العلاج قد يؤدي إلى عودة أو تفاقم أعراض فرط نشاط المثانة البولية.

يتبع

لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

#### (4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال سوليفيناسين تيُّقُّع قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تذهبش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًّا منها. يجب التوقف عن الإستعمال والتوجه للطبيب إذا: يظهر رد فعل تحسسي جلدي الذي يتجلّى بوذمات تحت سطح الجلد ويتراافق بصعوبات في الطرق التنفسية - عرض يسمى وذمة وعائية (Angioedema).

يجب مراجعة الطبيب حالاً إذا:

كنت تعاني من نوبة تحسسية أو رد فعل جلدي شديد (مثلاً حويصلات وتقشر للجلد).

**عرض جانبي شائع جداً (very common)** يظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة: جفاف في الفم.

**أعراض جانبية شائعة (common)** تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100: إمساك، تشوّش الرؤية، غثيان، عسر هضم مثل الشعور بإمتلاء البطن، آلام في البطن، تجشؤات، حرقان وإنزعاج في البطن.

**أعراض جانبية غير شائعة (uncommon)** تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000: إلتهاب في المسالك البولية أو في المثانة البولية، نعاس وإرهاق، تغيرات في حاسة التذوق، جفاف / تهيج في العينين، في الحنجرة، في الجلد أو في الأنف، صعوبة في التبول، حرقان، إرتداد مريري، وذمة في الجزء السفلي من الرجل.

**أعراض جانبية نادرة (rare)** تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000: إنسداد الأمعاء، إحتباس البول، إمساك شديد، دوار، صداع، تقيؤات، حكة، طفح.

**أعراض جانبية نادرة جداً (very rare)** تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000: هذيان، إرتباك، طفح تحسسي.

**أعراض جانبية شيوّعها غير معروفة:**

- تغيرات في التوصيل الكهربائي للقلب (تغير في ECG)، عدم إنتظام نظم القلب، ضربات قلب قوية، نبض سريع
- إنخفاض في الشهية للطعام، نسب مرتفعة للبوتاسيوم في الدم التي قد تؤدي إلى عدم سلامة نظم القلب
- ضغط مرتفع داخل العين
- إضطراب في الصوت
- إضطراب في الأداء الوظيفي للכבד
- ضعف عضلي
- إضطراب في الأداء الوظيفي للكلية

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

#### التبلیغ عن اعراض جانبية

بالإمكان التبلیغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلیغ عن اعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

#### (5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روئية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين في مكان جاف، دون 25 درجة مئوية.
- لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو النفايات. إسأل الصيدلي عن كيفية إتلاف أدوية ليست قيد الإستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

#### (6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

سوليفيناسين تيُّقُّع 5 ملغ:

Microcrystalline cellulose, lactose, crospovidone, povidone, magnesium stearate, silica colloidal anhydrous, polyvinyl alcohol, titanium dioxide, macrogol/PEG 3350, talc, carmine, iron oxide yellow, iron oxide red.

يحتوي كل قرص على 78 ملغ لكتوز.

سوليفيناسين تيُّقُّع 10 ملغ:

Microcrystalline cellulose, lactose, crospovidone, povidone, magnesium stearate, silica colloidal anhydrous, polyvinyl alcohol, titanium dioxide, macrogol/PEG 3350, talc, carmine, iron oxide yellow, iron oxide red.

يحتوي كل قرص على 78 ملغ لكتوز.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

سوليفيناسين تيُّقُّع 5 ملغ: قرص لونه مائل للزهري - وردي، دائري، مطلي. يظهر على جانب واحد 'S5' وعلى الجانب الثاني TEVA. تحتوي كل علبة على 30 قرصاً معبأة ضمن لوحيات.

سوليفيناسين تيُّقُّع 10 ملغ: قرص لونه مائل للزهري - وردي، دائري، مطلي. يظهر على جانب واحد 'S10' وعلى الجانب الثاني TEVA. تحتوي كل علبة على 30 قرصاً معبأة ضمن لوحيات.

اسم المنتج وصاحب الامتياز وعنوانه:

تيُّقُّع للأدوية والمستحضرات الطبية م.ض.، ص.ب. 3190، بيتح - تكفا.

تم إعداد هذه النشرة في كانون الأول 2020.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

سوليفيناسين تيُّقُّع 5 ملغ: 150.22.33626

سوليفيناسين تيُّقُّع 10 ملغ: 150.23.33620

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

SOLI TAB PL SH 110820

322K01930-02