

צפוויט 250, כמוסות

הרכב:

צפוויט 250:

כל כמוסה מכילה: צפלקסין (כמונוהידראט) 250 מ"ג
Cephalexin (as monohydrate) 250 mg
למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

צפוויט פורטה 500:

כל כמוסה מכילה: צפלקסין (כמונוהידראט) 500 מ"ג
Cephalexin (as monohydrate) 500 mg
למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

תרופה אנטיביוטית זו מיועדת לטיפול בזיהומים שנגרמים על ידי מיקרו-אורגניזמים הרגישים לצפלקסין.

קבוצה תרופוטית: צפלוספורינים מהדור הראשון.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (צפלקסין), לתרופות אנטיביוטיות אחרות מקבוצת הצפלוספורינים, או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף"). תגובה אלרגית עלולה לכלול: פריחה, גרד, קשיי נשימה, או נפיחות בפנים, בשפתיים, בגרון או בלשון.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בתרופה, ספר לרופא אם:

- אי פעם פיתחת פריחה עורית חמורה או קילוף עור, שלפוחיות ו/או פצעים בפה לאחר נטילת צפלקסין או תרופות אנטיביוטיות אחרות.
- הייתה לך תגובה אלרגית לצפלקסין, לצפלוספורינים, לפניצילינים, או לתרופות אחרות בעבר.
- אתה מפתח שלשול חמור או ממושך במהלך או לאחר נטילת צפלקסין.
- אתה סובל מהפרעה כלייתית חמורה (ייתכן שתצטרך מינון נמוך).

אזהרה מיוחדת נוספת

פוסטולוזיס תיפרחתית מפשטת חדה (AGEP) דווחה בשימוש בצפלקסין. AGEP מופיעה בתחילת הטיפול כפריחה אדומה קשקשית נרחבת עם בליטות מתחת לעור ושלפוחיות המלווה בחום. המיקום השכיח ביותר: בעיקר בקפלי העור, בגו ובגפיים העליונות. הסיכון הגבוה ביותר להתרחשות של תגובת עור חמורה זו הוא בשבוע הראשון לטיפול. אם אתה מפתח פריחה עורית חמורה או תסמיני עור נוספים אלו, הפסק ליטול את התרופה ופנה לרופא שלך או פנה מייד לקבלת טיפול רפואי.

בדיקות ומעקב

ספר לרופא שלך אם אתה עומד לעבור בבדיקות דם ו/או שתן. התרופה עלולה להפריע לבדיקות אלו.

תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- כל אנטיביוטיקה אחרת (כגון גנטמיצין, טטרביצין, צפרוקסטים).
- תרופות משתנות חזקות כגון פורוסמיד (לטיפול בלחץ דם גבוה או בבצקת-אצירת נוזלים).
- פרובנציד (לטיפול בשידון - גאון).
- מטפוריין (לטיפול בסוכרת).
- תרופות המשמשות לטיפול בלוקמיה.

גם אם אתה נוטל אחת או יותר מהתרופות הרשומות לעיל, ייתכן שהטיפול בצפוויט 250/צפוויט פורטה 500 עדיין נכון עבורך, על פי החלטת הרופא שלך.

שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול צפוויט 250/צפוויט פורטה 500 עם או ללא מזון.

היריון והנקה:

אם את בהיריון או מניקה, חושבת שאת עשויה להיות בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

נהיגה ושימוש במכונית:

התרופה לא צפויה להשפיע על היכולת לנהוג או להפעיל מכונית.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתרופה. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

למבוגרים ולמבוגרים מעל גיל 12 שנים:

המינון ליממה הוא 4-4 גרם, הניתן במנות מחולקות (2-8 כמוסות של צפוויט פורטה 500, או 4-16 כמוסות של צפוויט 250), בהתאם לסוג ולחומרת הזיהום.

מינון לילדים מתחת לגיל 12 שנים:

הרופא יחשב את המינון המדויק לילד לפי משקל הגוף. המינון המקובל הוא 25-50 מ"ג/ק"ג משקל גוף ליממה, הניתן במנות מחולקות כל 8 או 12 שעות. כמוסות של צפוויט 250/צפוויט פורטה 500 מיועדות לבלעיה. עבור מטופלים שאינם יכולים לבלוע או הזקוקים לטיפול במינונים נמוכים, קיימים תכשירים רשומים מותאמים בישראל (כגון תרחיף).

אין לעבור על המנה המומלצת.

משך הטיפול-

אם לא חל שיפור במצבך בתוך מספר ימים, פנה לרופא בשנית. יש להשתמש בתרופה במרווחי זמן קבועים, בהתאם להוראות הרופא.

צורת הנטילה:

אין ללעוס! יש ליטול את התרופה בשלמותה עם כוס מים, עם או ללא מזון.

אין מידע לגבי פתיחה ופיזור תכולת הכמוסה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש, יש ליטול מנה מייד כשנזכרת, אך אם כמעט הגיע הזמן ליטול את המנה הבאה; דלג על המנה שנשכחה והמשך בטיפול כרגיל. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

גם אם התסמינים נעלמו, חשוב להשלים את הטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. הפסקת הטיפול לפני הזמן המומלץ עלולה להוביל להתפתחות עמידות חיידקים לתרופה ולהחזרת הזיהום.

אין ליטול תרופות בחושך בודק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בתרופה זו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

פנה מייד לרופא שלך אם אתה סובל מצפופים פתאומיים, קושי בנשימה, התנפחות של העפעפיים, הפנים, או השפתיים, פריחה או גרד (במיוחד אם זה משפיע על כל הגוף שלך).

תופעות לוואי חמורות:

תופעות הלוואי הבאות הן חמורות. עלייך להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות לרופא באופן מיידי אם אתה חווה אחת או יותר מהתופעות הבאות:

- קילוף חמור או שלפוחיות על העור.
- שלשול חמור.
- פריחה אדומה וקשקשת נרחבת עם בליטות מתחת לעור ושלפוחיות המלוות בחום בתחילת הטיפול (פוסטולוזיס תיפרחתית ממושטת חדה - AGEP).
ראה גם בסעיף 2 "אזהרה מיוחדת נוספת".

תופעות לוואי נוספות:

- שלשול
- בחילה
- הקאה
- הפרעות עיכול
- כאבי בטן
- פריחה דמוית חצבת (ללא תסמינים נלווים)
- גירוד
- חבורות אדומות על העור (אורטיקריה) (ללא תסמינים נלווים)
- פריחה המלווה בכאבי מפרקים ממושטים ו/ או נוקשות מפרקים, בלוטות לימפה נפוחות, חום, וייתכן גם שתן עכור.
- שינויים בספירת תאי הדם, שעלולים להתבטא כחבורות על העור או תחושת עייפות קיצונית. יש צורך בבדיקות דם כדי לאשר זאת.
- פגיעה בכבד או בכליות, שניתן לגלות בבדיקת דם ו/ או שתן.
- צהבת (הצהבה של העור ושל הלחמיות בעיניים)
- חולשה
- עילפון
- התנהגות נרגשת מהרגיל
- אי שקט
- עייפות
- כאב ראש
- בלבול
- סחרחורת
- שמיעה או ראייה של דברים שאינם קיימים (הזיות)
- אנצפלופתיה (מחלת מוח לא דלקתית)
- פרכוסים
- מיקלונס- תנועות בלתי רצונית של השרירים
- גירוד של הנרתיק או פי הטבעת הנגרם כתוצאה מפטרת (קנדידה).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או אם כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא. דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/ או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** יש לאחסן במקום יבש מתחת ל- 25°C.
- אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:
תכולת הכמוסה:

Starch, Talc, Magnesium Stearate.

מעטפת הכמוסה:

Gelatine, Titanium Dioxide (E 171), Quinoline Yellow (E 104).

דיו על הכמוסה:

Shellac, Propylene Glycol, Strong Ammonia Solution, Potassium Hydroxide, Black Iron Oxide (E 172).

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

צפוייט 250: כמוסות בצבע צהוב, עליהן מוטבע כיתוב בשחור "CEFOVIT VITAMED".

צפוייט פורטה 500: כמוסות בצבע צהוב, עליהן מוטבע כיתוב בשחור "CEFOVIT FORTE VITAMED".

גודלי אריזה מאושרים:

צפוייט 250: 10, 12, 20, 250, 500, 1000 כמוסות.

צפוייט פורטה 500: 10, 12, 20, 250, 500, 1000 כמוסות.

ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווקים.

יצרן ובעל הרישום: ויטאמד תעשיות פרמצבטייות בע"מ, רח' הטחנה 6, ת"ד 114, בנימינה 3055002, ישראל.

נערך באוקטובר 2025 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

צפוייט 250: 026-84-25145-00

צפוייט פורטה 500: 026-85-25146-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.